

【急诊与急救: 呼吸系统】

结核病最重要的传染源是

- A. 原发性肺结核患者
- B. 血性播散型肺结核患者
- C. 干酪性肺结核患者
- D. 慢性纤维空洞性肺结核患者
- E. 浸润性肺结核患者

【正确答案】D

【答案解析】慢性纤维空洞性肺结核是肺结核的晚期类型,多系浸润肺结核发展恶化的结果。病程长,病情的好转与恶化,空洞的形成与纤维修补交替出现,病灶广泛纤维化。此类病人经常大量排菌,为社会的重要传染源。

【合理用药】

药理学配伍变化不包括

- A. 协同作用
- B. 拮抗作用
- C. 增加毒性
- D. 增加副作用
- E. 产生有毒物质

【正确答案】E

【答案解析】药理学的配伍变化是指药物合并使用后,发生协同作用、拮抗作用或毒副作用。E 选项属于化学配伍变化。

【常见病与多发病: 五官、皮肤及其他】

激活荨麻疹非变态反应途径的物质是

- A. 青霉素
- B. 真菌
- C. 蛇毒
- D. 血清制品
- E. 花粉

【正确答案】C

【答案解析】蛇毒属于动物毒素,可直接刺激肥大细胞释放组胺,导致荨麻疹,为非变态反应途径。

【常见病与多发病: 小儿疾病】

对麻疹前驱期诊断极有帮助的是

- A. 低中度发热
- B. Koplik 斑
- C. Pastia
- D. 皮疹
- E. 草莓舌

【正确答案】B

【答案解析】对麻疹前驱期诊断极有帮助的是 Koplik 斑,也称麻疹黏膜斑。在发疹前 2~3 天出现的直径约 1.0cm 灰白色小点外有红色晕圈,散布在下磨牙相对的颊黏膜上,量少,在皮疹出现后即逐渐消失。



乡村全科助理医师考试:《答疑周刊》2019年第31期(word版下载)
【医学教育网版权所有,转载务必注明出处,违者将追究法律责任】

