

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2022年第45期

问题索引：

- 1.【问题】重症肌无力的临床特点有哪些？
- 2.【问题】诊断糖尿病最有价值的检查是什么？
- 3.【问题】全身麻醉最常见的并发症是什么？
- 4.【问题】孕期诊断糖尿病的标准？1小时2小时的血糖如何变化？
- 5.【问题】肺结核的首选和确诊分别是什么？

具体解答：

- 1.【问题】重症肌无力的临床特点有哪些？

【解答】重症肌无力起病隐匿，症状呈波动性，早晨较轻，下午或晚上加重，肌无力在活动后明显加重，[医学教育网原创]经短时休息后可减轻。

- 2.【问题】诊断糖尿病最有价值的检查是什么？

【解答】空腹及餐后2小时血糖升高是诊断糖尿病的主要依据。餐后2小时血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 和（或）空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ ，即可诊断为糖尿病。[医学教育网原创]

葡萄糖耐量试验：适用于有糖尿病可疑而空腹或餐后血糖未达到糖尿病诊断标准者。

- 3.【问题】全身麻醉最常见的并发症是什么？

【解答】全身麻醉有很多并发症，常见的有呼吸暂停、上呼吸道梗阻、高血压、低血压等；其中最常见的是并发症是高血压。

- 4.【问题】孕期诊断糖尿病的标准？1小时2小时的血糖如何变化？

【解答】血糖测定：空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 者；此用于糖尿病合并妊娠的诊断。

葡萄糖耐量试验：[医学教育网原创]禁食12小时后，口服葡萄糖75g；血糖值诊断标准为：空腹 5.1mmol/L ，1小时 10.0mmol/L ，2小时 8.5mmol/L ，若任

何一项达到或超过上述血糖，即可诊断 GDM。

5.【问题】肺结核的首选和确诊分别是什么？

【解答】肺结核首选诊断是胸部 X 线检查；

肺结核确诊是结核菌检查，从痰、胃液、脑脊液等中找到结核菌是确诊的重要依据。



正保医学教育网

www.med66.com