

# 护士执业资格

## 基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著

## 《基础测评 50 题答案及解析》

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 直肠指检可了解癌肿的部位、大小、范围、距肛缘的距离、固定程度以及与周围组织的关系等。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 凡引起过度通气的因素均可导致呼吸性碱中毒。常见于癔症、高热、中枢神经系统疾病、疼痛、呼吸机辅助通气过度等。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 铁摄入不足是导致婴儿缺铁的主要原因，未及时添加含铁丰富的食物，年长儿偏食等。题干中患儿因为未添加辅食，所以重点是及时添加含铁辅食。

4. 【正确答案】 B

【答案解析】 中凹卧位要求：病人头胸抬高  $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$  角，下肢抬高  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$  角。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 输液所用时间=[液体的总量(ml) $\times$ 点滴系数(滴数/ml)]/[每分钟滴数(滴/分) $\times$ 60(min)]，将数字代入公式：

时间=1000 $\times$ 15 $\div$  (40 $\times$ 60) =6.25 小时=6 小时 15 分钟。

6. 【正确答案】 A

【答案解析】 白血病，化疗过程中因口腔溃烂需做咽拭子培养，采集标本部位应选口腔溃疡面。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 肾上腺素：为救治心脏骤停的首选药物。

8. 【正确答案】 D

【答案解析】 Osler 结节，为指和趾垫出现豌豆大的红或紫色痛性结节，较常见于亚急性感染性心内膜炎。

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 心房颤动发生于器质性心脏病，以风湿性心脏病二尖瓣狭窄为最常见的原因，其次为冠心病。风湿性心脏病二尖瓣狭窄血流动力学障碍的结果是左心房扩大，进而左心室扩大，左房压升高，常发生房性心律失常，尤以房颤最常见。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】 心绞痛呈憋闷或压迫感，常有明显的诱因，疼痛时限 3~5 分钟，很少超过 15 分钟；而急性心肌梗死的疼痛更剧烈，亦称压榨性痛，无明显诱因，疼痛时限在 20~30 分钟以上，常数小时至数日。心绞痛对硝酸甘油效果明显，而急性心肌梗死对硝酸甘油效果不明显。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】 某些降压药物可有直立性低血压不良反应，应指导病人在改变体位时要动作缓慢，当出现头晕、眼花、恶心、眩晕时，应立即平卧，以增加回心血量，改善脑部血液供应。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】 本题考察法洛四联症的临床表现。法洛四联症是一种常见的青紫型先天性心脏病。以肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚为主要临床特征。其中以肺动脉狭窄为重要畸形。青紫为主要临床表现，其程度和出现早晚与肺动脉狭窄程度有关。

13. 【正确答案】 E

【答案解析】 期前收缩 > 5 次/分钟称频发性期前收缩。

14. 【正确答案】 A

【答案解析】 左心衰患者急性肺水肿时，应给予高流量吸氧并给予 20%~30%乙醇湿化。

此题为记忆性题。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】 通过胃镜检查及组织活检直视胃部疾患，以确定病变的部位及性质。取活体组织检查，协助诊断胃部恶性肿瘤、慢性胃、十二指肠疾病及原因不明的上消化道出血、幽门梗阻等疾病。此题选 C.胃镜检查及组织活检。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性胰腺炎可用阿托品或盐酸消旋山莨菪碱注射液肌注，每天 2~3 次。疼痛剧烈病人可用哌替啶 50~100mg 肌内注射。因吗啡可引起 Oddi 括约肌痉挛，加重疼痛，因此禁用吗啡。

17. 【正确答案】 C

【答案解析】 典型的临床表现为 Charcot 三联症=腹痛+寒战高热+黄疸。


18. 【正确答案】 B

【答案解析】 病人为 8 岁女童，不考虑胆道系统结石，出现阵发性剑突下钻顶样痛半天，伴恶心呕吐，T37.5℃，剑突下深压痛，但无腹肌紧张，说明无腹部炎症，且以往有类似病史，因此首先考虑为胆道蛔虫病。而且，剑突下钻顶样痛就是胆道蛔虫病的特征性症状，要牢记。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据提示，此患者为急性梗阻性化脓性胆管炎引起的休克，应取休克体位，即中凹卧位。

20. 【正确答案】 C



【答案解析】 肝性脑病临床表现一期（前驱期）：轻度性格改变和行为失常，如欣快激动或淡漠、随地便溺。病人应答尚准确，但有时吐字不清且较缓慢。可有扑翼样震颤，脑电图多数正常。

21. 【正确答案】 E

【答案解析】 肝脏手术后易发生出血，术后避免过早活动的目的是预防肝断面出血。

22. 【正确答案】 D

【答案解析】 肝功能损害的患者，可呼出特殊性臭味，俗称肝臭。肝臭味表明肝功能受到严重损害，是病情危重的表现。

23. 【正确答案】 C

【答案解析】 已形成脓肿，应及时切开排脓。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 血栓性外痔是由于血液在肛缘皮下静脉丛形成血栓而成，表现为暗紫色、半球形的血凝块，形成硬结。血栓性外痔病人可有肛门剧痛，排便、坐、走和咳嗽时疼痛加重。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】 若曾进入疝囊的肠管缺血坏死，即可出现腹痛、腹膜刺激征。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】 阑尾炎手术后肠粘连的预防重点在于早下床、及早运动，使肠管处于活动的状态。根据不同的手术遵从医嘱下床或者在床上翻身或者做伸曲双腿的运动。这样可以促进胃肠蠕动，改善肠道的血液循环，使肠管尽快恢复功能，避免肠粘连的发生。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是肛门排便、排气，提示肠管恢复通畅，肠内容物可通过肠管排出。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】 因补钾的浓度不应超过 0.3%，设所需溶液为 Y。 $(10\%Y) \div 400 = 0.3\%$ ，得出  $Y = 12$ ，选 D。

29. 【正确答案】 E

【答案解析】 疲劳、饮酒、受凉和焦虑是消化性溃疡发作的常见诱因，消化性溃疡的疼痛节律常常不会改变，但癌变时可有疼痛节律的改变或消失。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 考察慢性胃炎的发病原因。目前认为多由幽门螺旋杆菌感染引起。

31. 【正确答案】 C



【答案解析】 肺性脑病临床表现为神志恍惚、谵妄、躁动、抽搐、生理反射迟钝等。题干所述符合肺性脑病的临床特点，再结合原有呼吸衰竭的病史，考虑患者出现了肺性脑病。故正确答案为 C。

32. 【正确答案】 A

【答案解析】 此题考查肺心病的诱因，引起肺心病急性发作的诱因主要是急性呼吸道感染，常导致肺、心功能的衰竭，故 A 选项正确。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】 奇脉指吸气时脉搏明显减弱甚至消失，呼气时又出现或恢复原状的现象。

34. 【正确答案】 A

【答案解析】 慢性支气管炎（简称慢支）是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症，临床上以咳嗽、咳痰、喘息及反复发生感染为特征，常可并发慢性阻塞性肺气肿。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 此题考查诊断相关知识，患者为青年男性，幼年发病，咳嗽、咳脓痰史 10 年，左下肺背部闻及湿啰音，表明存在反复发作的固定部位的肺部化脓性感染，且间断咯血，伴有杵状指，故符合支气管扩张的临床表现。肺结核患者应有低热、乏力、盗汗等全身中毒症状，该患者没有，所以不符合。慢性支气管炎患者一般有咳嗽、咳痰，伴有或不伴喘息，每年发作至少 3 个月，连续发作 2 年或更长，且一般不伴有咯血，故不符合。支气管哮喘

患者应有反复发作的可逆性呼气性呼吸困难，该患者不符。肺癌多发于老年患者，且早期主要是阵发性刺激干咳，可有咯血，晚期由于引流不畅才出现反复发作的肺部感染，该患者也不符合。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】 细菌性肺炎：最为常见，最常见的病原菌是肺炎链球菌，其次为葡萄球菌、肺炎杆菌。

37. 【正确答案】 E

【答案解析】 肺结核可通过被污染的食物、用具等传播，但最主要的传播途径是呼吸道，传染源是排菌的肺结核病人。

38. 【正确答案】 D

【答案解析】 孕产妇为不协调性宫缩乏力，应按医嘱给予哌替啶 100mg 肌内注射，以确保护产妇充分休息。

39. 【正确答案】 E

【答案解析】 糖筛查试验：用于糖尿病筛查，建议孕妇产于妊娠 24~28 周进行。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】 前置胎盘的主要症状是无诱因、无痛性反复阴道流血，阴道可见少量活动性出血符合前置胎盘的表现。故选择答案 C。

41. 【正确答案】 B

【答案解析】 新生儿硬肿症临床表现：皮肤发凉、硬肿，颜色暗红，不易捏起，按之如硬橡皮，硬肿发生顺序为：小腿-大腿外侧-下肢-臀部-面颊-上肢-全身，严重者可导致肺出血、循环和呼吸衰竭及肾脏等多脏器损害，合并弥漫性血管内凝血而危及生命。结合题干可以判断是 B。

42. 【正确答案】 A

【答案解析】 早产儿颅内出血以缺血缺氧引起多见，足月儿以分娩时产伤多见。

43. 【正确答案】 D

【答案解析】 滴虫性阴道炎阴道灌洗可选用 1%乳酸溶液或 0.1%~0.5%醋酸溶液。

44. 【正确答案】 D

【答案解析】 尿频是前列腺增生病人最初出现的症状。早期仅表现为夜尿次数明显增多，随梗阻加重，白天也可出现尿频。

45. 【正确答案】 E

【答案解析】 原发性肾病综合征患儿全身水肿，此时最重要的评估内容是水肿情况。

46. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者临床表现中明确指出患者觉得自己活着无用，且抑郁症患者对生命危险最大的行为是自杀行为，所以选择 B。

47. 【正确答案】 D

【答案解析】 中枢神经系统症状早期可有头晕、头痛、乏力，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。严重时可发生呼吸中枢衰竭或脑水肿而死亡。

48. 【正确答案】 C

【答案解析】 左上肢 9%、颈部 3%、胸腹部 13%、双足 7%、双小腿 13%为Ⅱ度烧伤。

49. 【正确答案】 D

【答案解析】 呼吸系统表现 咳嗽（中央型出现较早，阵发性、刺激性干咳为首发症状）、咯血（间断或持续痰中带血多见）、胸痛、呼吸困难。

50. 【正确答案】 E

【答案解析】 骨髓象检查是诊断急性白血病的最有价值的检查。

