



2024 初级护师《儿科护理学》教材变动情况汇总

章	节	2023 年教材变动（前）	2024 年教材变动（后）
		3-12 月龄：身高/高 (cm)=75	12 月龄：身高/高 (cm)=75
第二章 小儿保 健	第二节 生 长发育	1. 粗大运动 (1) 抬头…… (2) 坐…… (3) 匍匐、爬…… (4) 站、走、跳……	1. 粗大运动 (1) 抬头…… (2) 翻身：1~2 个月婴儿可伸展脊柱从侧卧位到仰卧位。4~5 个月可较有意识地以身体为一体从侧卧位到仰卧位，但无身体转动。5~6 个月时可由仰卧位翻身至侧卧位，或从俯卧位至仰卧位。7~8 个月可有意从仰卧位翻至俯卧位，再从俯卧位翻至仰卧位。 (3) 坐…… (4) 匍匐、爬…… (5) 站、走、跳……
		8~10 个月可用拇、示指取物	9~10 个月可用拇、示指取物
		1. 产能营养素 2. 非产能营养素	1. 宏量营养素 2. 微量营养素
		55%~65%	50%~65%
	第四节 小 儿营养与喂 养	110~150ml/kg	150ml/kg
		白蛋白和球蛋白	乳清蛋白
		故加热后易发生凝固	删除
2. 牛乳的改造		删除	
	表 5-2-1 添加辅食顺序	表 5-2-1 换乳期食物的引入	



	第五节 预防接种	整段	<p>替换为： 主动免疫制剂（主要指疫苗），是利用病原微生物（如病毒、细菌等）及其代谢产物，通过人工减毒、灭活或基因重组等方法制成，具有抗原性。疫苗接种后所产生的免疫应答反应是人工诱导宿主对特异性抗原所产生的特异性反应，与自然感染所引起的免疫应答反应是一致的。被动免疫制剂属于特异性免疫球蛋白，如抗毒素、抗血清等，具有抗体属性，可增加机体被动免疫力，主要用于应急预防和治疗。</p>
		一般接种活疫苗后需隔 4 周，接种死疫苗后需隔 2 周，再……。	一般需间隔 4 周后在接种其他疫苗。
第三章 新生儿 和患病 新生儿的 护理	第二节 足月新生儿的特点和护理	100~150 次/min	100~150 次/min，平均 120~140/min
	第三节 早产儿的特点及护理	“用 2.5%碘酊和 75%乙醇消毒局部皮肤”	删除
	第六节 新生儿颅内出血	遵医嘱服用吡拉西坦……脑功能恢复。	删除
	第七节 新生儿黄疸	新生儿黄疸概述	改为：新生儿黄疸是胆红素（大部分为未结合胆红素）在体内积聚而引起，变现为皮肤、巩膜、黏膜以及其他组织和体液发生黄染，
		一般 2 周内消退	5~7 天消退，最迟不超过 2 周
		临床表现 1. “出生后 2~3 日全身皮肤发黄……比较明显”	临床表现 1. “出生后 2~3 日出现黄疸”
		1. 新生儿溶血病 （1）ABO 血型不合 “产生相应的抗体……胎儿体内引起溶血”	1. 新生儿溶血病 （1）ABO 血型不合 “物质的抗原刺激……胎儿体内引起溶血”
	2%碘酊	0.2%~0.5%碘伏	
第四章 营养性	第一节 蛋白质-能量	又称蛋白质-热能营养不良	删除



疾病患儿的护理	营养不良		
	第四节 维生素D缺乏性手足搐搦症	以指间或叩诊锤	以指尖或叩诊锤
第五章 消化系统疾病患儿的护理	第三节 腹泻病	发病机制最后一句脱水、电解质紊乱	删除此句

