

2019 年口腔执业医师：《答疑周刊》第 11 期

【口腔组织病理学】

牙源性角化囊肿多发生于

- A. 以下颌第三磨牙区多见，其次为上颌单尖牙，上颌第三磨牙和下颌前牙区者
- B. 位于上颌恒侧切牙和单尖牙之间，呈倒置的梨形，相邻牙齿为活髓牙者
- C. 下颌磨牙及升支部
- D. 颈上部，下颌角附近，胸锁乳突肌上 1/3 前缘者
- E. 腭中线前部者

【正确答案】C

【答案解析】2005 年的 WHO 头颈部肿瘤分类中已将牙源性角化囊肿命名为牙源性角化囊性瘤，是一种良性、单囊或多囊、发生于颌骨内的牙源性肿瘤。临床上，牙源性角化囊肿患者的年龄分布较广，但好发在 10~29 岁之间。男性较女性多见，病变多累及下颌磨牙及升支部。

【口腔组织病理学】

以下肿瘤（或囊肿）生长方式特殊，主要沿颌骨前后方向生长的是

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性角化囊性瘤
- C. 牙源性钙化上皮瘤
- D. 成釉细胞纤维瘤
- E. 含牙囊肿

【正确答案】B

【答案解析】牙源性角化囊性瘤的生长方式特殊，主要沿颌骨前后方向生长，多数患者无明显症状，多在常规 X 线检查时偶然发现。

【药理学】

关于哌嗪药理作用不正确的叙述

- A. 是一种抗蛔虫和蛲虫药
- B. 低毒、高效
- C. 服药时间较长
- D. 偶见有胃肠道反应和荨麻疹
- E. 可用于癫痫患者

【正确答案】E

【答案解析】严重肝肾功能障碍、有癫痫病史及神经系统疾病患者禁用。

【药理学】

关于抗疟药，下列哪项叙述是正确的

- A. 氯喹对阿米巴痢疾有效
- B. 氯喹可根治间日疟
- C. 青蒿素治疗疟疾最大缺点是有一定的复发率
- D. 伯氨喹可用作疟疾病因性预防
- E. 乙胺嘧啶能引起急性溶血贫血

【正确答案】 C

【答案解析】 氯喹属于抗肠道外阿米巴病作用，其在肝脏中的浓度较高，可用于治疗阿米巴肝脓肿；氯喹对各种疟原虫的红细胞内裂殖体有较强的杀灭作用，但日间疟原虫对氯喹的耐药作用越来越明显；使用青蒿素治疗疟疾有一定的复发率；伯氨喹对日间疟和卵形疟肝脏中的休眠子有较强的杀灭作用，是防止疟疾远期复发的主要药物，并不做病因性预防；乙胺嘧啶不良反应可引起巨细胞性贫血、粒细胞减少、等干扰人体四氢叶酸代谢的症状。

