

1. 全科医生是指

- A. 已经跟患者签约的各类医生
- B. 在乡村一线长期执业的医生
- C. 主要执行公共卫生服务的医生
- D. 熟练处理临床各科疾病的医生
- E. 全方位连续性负责居民健康的医生

2. 下列不属于全科医疗基层医疗服务特点的是

- A. 服务手段简便，经济，有效
- B. 既服务于就医患者又关注未就医者
- C. 根据需要负责安排其他相关医疗服务
- D. 一种以门诊为主体的第一线医疗服务
- E. 主要任务是为行动不便的患者上门服务

3. 全科医疗服务的主体形式是

- A. 病房医疗
- B. 舒缓医疗
- C. 门诊医疗
- D. 临终医疗
- E. 入户医疗

4. 女，69 岁。患高血压 10 余年，一直服用尼群地平治疗。近两个月血压控制不佳。医生为其加用替米沙坦，另嘱其近 2 周内起身，起床动作需缓慢。医生此举在临床预防中属于

- A. 筛检
- B. 营养指导
- C. 健康教育
- D. 化学预防
- E. 免疫预防

5. 男，66 岁。咳嗽 2 周。到“大医院”就诊时发现肺部肿物，专科医生建议手术切除。既往有冠心病病史 10 年。患者担心不手术会耽误病情，又怕出现手术意外，遂向全科医生求助。全科医生正确的做法是

- A. 坚定地支持手术，立即开具转诊单
- B. 以手术有风险为由，要求到门诊治疗
- C. 不介入大医院诊疗的讨论，避免纠纷
- D. 分析各种疗法利弊，让患者自行抉择
- E. 推荐患者到某中医院接受特色保守治疗

6. 男，66 岁。咳嗽 2 周。到“大医院”就诊时发现肺部肿物，专科医生建议手术切除。既往有冠心病病史 10 年。患者术后病理诊断为肺癌。出院后全科医生与其签订了为期 1 年的家庭医生服务协议，还提供了冠心病和肺癌的一次性健康评价与建议。上述做法涉及的签约服务原则不包括

- A. 注重基本医疗
- B. 注重临床预防

- C. 强调医患互动 D. 强调个体化服务
E. 签约内容体现对患者出诊的优惠

7. 出现弛张热的常见疾病是

- A. 疟疾
B. 伤寒
C. 败血症
D. 淋巴瘤
E. 大叶性肺炎

8. 属于非感染性发热的疾病是

- A. 疟疾
B. 风湿热
C. 急性阑尾炎
D. 急性胆囊炎
E. 急性肾盂肾炎

9. 女，25 岁。间断发热 20 天，体温 37.8~39.3℃，查体面部蝶形红斑，肝脾大，此患者最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
B. 败血症
C. 急性肾盂肾炎
D. 疟疾
E. 军团菌肺炎

10. 脑出血引起的发热主要是因为

- A. 皮肤散热量的减少
B. 体温调节中枢的功能失常
C. 无菌性坏死物质的吸收
D. 自主神经功能紊乱
E. 食管钡餐透视

11. 体温调节中枢功能失常所致的发热见于

- A. 中暑
B. 感染
C. 大叶性肺炎
D. 脱水
E. 脑血栓形成

12. 属于原发性皮疹的是

- A. 萎缩
B. 鳞屑
C. 糜烂
D. 溃疡

E. 斑疹

13. 猩红热的皮疹特点，正确的是

- A. 淡红色斑丘疹
- B. 淡红色斑疹、斑丘疹
- C. 针头大小鲜红色点状红斑
- D. 紫红色瘀点或瘀斑
- E. 蝶形红斑

14. 在下列水肿类型中，不常出现凹陷性水肿的是

- A. 心源性水肿
- B. 肝源性水肿
- C. 肾源性水肿
- D. 黏液性水肿
- E. 营养不良性水肿

15. 下列关于水肿的临床表现说法，错误的是

- A. 特发性水肿多出现于颜面或下肢
- B. 肝源性水肿不是凹陷性水肿
- C. 肾源性水肿伴随高血压，尿量减少
- D. 心源性水肿从足部开始，下垂部位明显
- E. 营养不良性水肿发生前先出现体重下降表现

16. 鉴别肝源性水肿和心源性水肿，最有价值的项目是

- A. 脾大
- B. 腹壁静脉曲张
- C. 肝大
- D. 肝功能异常
- E. 心尖区收缩期杂音

17. 男，45 岁。误食富含亚硝酸盐的食物出现全身皮肤黏膜发绀伴胸闷、头晕、恶心半天。既往体健，该患者发绀最可能的原因是

- A. 支气管哮喘
- B. 高铁血红蛋白血症
- C. 体循环淤血
- D. 急性肺栓塞
- E. 急性呼吸衰竭

18. 临床上观察发绀的常见部位是

- A. 眼睑
- B. 颈部
- C. 胫前
- D. 四肢近端
- E. 口唇、指端（甲床）

19. 结膜充血最常见的疾病是

- A. 青光眼
- B. 睑裂斑
- C. 结膜炎
- D. 结膜皮样脂肪瘤
- E. 结膜血管瘤

20. 男，17 岁。双耳聋 4 年。诉出生后至 12 岁时听力、说话正常。12 岁时因患急性扁桃体炎，在当地医疗机构接受庆大霉素治疗。此后，患者听力逐渐下降至完全不能与人交流。该患者最可能的诊断是

- A. 药物性聋
- B. 突发性聋
- C. 遗传性聋
- D. 感染性聋
- E. 功能性聋

21. 男童，7 岁。右侧鼻腔反复出血 2 个月，量少，无其他不适。平时不爱喝水，喜挖鼻。既往体健，无家族遗传病史。该患者鼻出血时的最佳应急处理措施是

- A. 输血
- B. 口服止血药
- C. 静脉输止血药
- D. 手指按压鼻翼止血
- E. 鼻腔填塞法止血

22. 儿童和青少年的鼻出血部位多数在

- A. 鼻腔
- B. 鼻窦
- C. 鼻中隔前下方
- D. 鼻中隔前方
- E. 鼻中隔

23. 女，18 岁。2 个月内 4 次出现进食时口腔疼痛。检查发现唇、颊、舌黏膜有多个直径小于 5mm 的溃疡，呈圆形或椭圆形，散在分布。最可能的诊断是

- A. 口腔癌
- B. 慢性口炎
- C. 复发性口疮
- D. 口腔黏膜白斑
- E. 念珠菌性口炎

24. 引起咽痛的最常见病因是

- A. 恶性肿瘤
- B. 全身性疾病
- C. 咽部炎症性疾病
- D. 咽部创伤、异物
- E. 咽部邻近器官疾病

25. 咽痛转诊的处理错误的是

- A. 咽部细菌感染性炎症主要应用抗生素治疗
- B. 咽部各种脓肿严重者行脓肿切开引流

- C. 咽部异物者要取出异物
D. 急性会厌炎者要应用抗生素和糖皮质激素联合治疗
E. 咽痛不需转诊治疗

26. 食管癌的典型症状为

- A. 反酸
B. 进食哽咽
C. 恶心、呕吐
D. 进行性吞咽困难
E. 乏力

27. 下面关于进食哽咽、疼痛、吞咽困难的发病机制叙述错误的是

- A. 反流性食管炎出现胃内酸性液体反流可造成
B. 食管平滑肌瘤，肿瘤增大阻塞管腔
C. 胃癌不会导致食管狭窄
D. 食管结核增殖性病变可阻塞食管
E. 主动脉瘤可压迫食管引起吞咽困难

28. 痰的性状与其对应疾病的描述，不正确的是

- A. 果酱样痰—肺血吸虫病
B. 脓性泡沫痰—支气管扩张
C. 铁锈色痰—肺炎链球菌肺炎
D. 粉红色泡沫痰—肺炎支原体肺炎
E. 红色胶冻样痰—肺炎克雷伯杆菌肺炎

29. 女，21岁。间断咳嗽、咳痰3个月，偶有午后低热，咳少量黄色黏痰，偶有痰中带血，查体右肺闻及局限性干鸣音。提示最可能的病因是

- A. 支气管扩张
B. 急性支气管炎
C. 肺结核合并支气管内膜结核
D. 慢性支气管炎
E. 肺脓肿

30. 老年患者突然发生寒战高热、咳嗽咳痰，痰呈红色胶冻状，引起肺部感染最可能的病原菌是

- A. 表皮葡萄球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 肺炎球菌
D. 嗜肺军团菌
E. 肺炎克雷伯杆菌

31. 男，45岁。反复咳嗽、咳痰伴痰中带血丝8年。1小时前突发大咯血，总量约150ml，有血块，此后仍继续咯血。既往有左下肺支气管扩张症病史。患者应采取的体位是

- A. 右侧卧位
B. 左侧卧位

- C. 仰卧位
D. 半卧位
E. 坐位

32. 大咯血的直接危险主要是

- A. 窒息和血块堵塞支气管引起肺不张
B. 血块堵塞支气管引起肺不张和失血性休克
C. 继发肺部感染或血块堵塞支气管引起肺不张
D. 窒息和继发肺部感染
E. 窒息和失血性休克

33. 出现“三凹征”的常见临床情况是

- A. 胸腔积液
B. 支气管哮喘
C. 自发性气胸
D. 支气管异物
E. 阻塞性肺气肿

34. 女，80岁。急性结石性胆囊炎术后，因伤口疼痛肌注哌替啶1支，半小时后昏睡，呼吸10次/分，可能原因是

- A. 术后伤口感染
B. 腹腔感染
C. 严重鼓肠
D. 麻醉剂过量
E. 休克

35. 女，23岁。生气后突发呼吸困难，呼吸50次/分，伴手足抽搐，最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘
B. 气胸
C. 心源性哮喘
D. 肺梗死
E. 分离（转换）性障碍

36. 骤然发生呼吸困难最多见于

- A. 肺炎
B. 尿毒症
C. 大块肺栓塞
D. 慢性支气管炎
E. 急性渗出性胸膜炎

37. 以下与呼吸困难无明显关系的疾病为

- A. 肺炎
B. 急性胃炎
C. 大量胸腔积液
D. 急性一氧化碳中毒

E. 脑出血

38. 吸气性呼吸困难常见于

- A. 慢性支气管炎
- B. 气管异物
- C. 支气管哮喘
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 气胸

39. 夜间阵发性呼吸困难常见于

- A. 胸腔积液
- B. 支气管哮喘
- C. 急性右心衰竭
- D. 急性左心衰竭
- E. 肺气肿

40. 慢性充血性心力衰竭的特征性表现为

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 混合型呼吸困难
- C. 夜间阵发性呼吸困难
- D. 吸气性呼吸困难
- E. 呼气性呼吸困难

41. 下列不符合急性心肌梗死疼痛特点的是

- A. 疼痛多在劳累时发生
- B. 疼痛位于胸骨后或心前区
- C. 疼痛可放射到左肩、左臂
- D. 疼痛时间一般超过 30 分钟
- E. 口含硝酸甘油能缓解疼痛

42. 女，70 岁。长途飞行 12 小时后突发右侧胸痛伴咳嗽、咯血。既往有双下肢静脉曲张病史 20 年。最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 心绞痛
- C. 主动脉夹层
- D. 急性肺栓塞
- E. 急性心肌梗死

43. 室性期前收缩引起心悸的感觉，正确的是

- A. 恐惧感
- B. 紧缩感
- C. 停跳感
- D. 饥饿感
- E. 灼热感

44. 引起恶心、呕吐的常见病因不包括

- A. 急性胃炎
- B. 结肠息肉
- C. 脑出血
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性胰腺炎

45. 贫血伴黄疸最可能的诊断是

- A. 溶血性贫血
- B. 急性失血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 营养不良性贫血

46. 黄疸、畏寒、发热、右上腹绞痛伴呕血，最可能是

- A. 消化性溃疡
- B. 急性胃黏膜病变
- C. 急性胰腺炎
- D. 胃癌
- E. 胆道结石伴梗阻

47. 男，17岁。旅游中出现腹泻、脐周痛2天，发热1天。大便5~10次/日，有排便不尽感，粪便中混有脓液。查体：T 38.2℃，P 90次/分，BP 96/60mmHg。腹软，脐周及左下腹压痛阳性，无反跳痛。该患者首选的进一步检查是

- A. 直肠指检
- B. 血培养
- C. 结肠镜
- D. 粪常规
- E. X线钡剂灌肠

48. 男，71岁。上腹部疼痛、不适、消瘦2个月，伴皮肤瘙痒，粪便颜色变浅。实验室检查：尿胆红素阳性，尿胆原阴性，血总胆红素及直接胆红素明显升高。最可能的诊断是

- A. 胰头癌
- B. 肾结石
- C. 胆囊炎
- D. 慢性肝炎
- E. 肝内胆管结石

49. 胃、十二指肠溃疡穿孔的腹痛性质为

- A. 中上腹持续性剧痛或阵发性加剧
- B. 阵发性绞痛，相当剧烈，病人辗转不安
- C. 突发的中上腹剧烈刀割样痛、烧灼样痛
- D. 阵发性剑突下钻顶样疼痛
- E. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹壁肌紧张或板样强直

50. 男，67岁。近2个月出现中上腹持续性隐痛，伴腰背部痛，前倾位或俯卧位时疼痛减轻，最可能的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 胃黏膜脱垂
- C. 胰腺癌
- D. 胆囊炎
- E. 慢性胃炎

51. 黏液脓血便见于

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 阿米巴痢疾
- C. 急性胃肠炎
- D. 急性出血坏死性肠炎
- E. 上消化道出血

52. 下列呕血患者中，能提示胃癌或胰腺癌的是

- A. 伴明显贫血
- B. 伴蜘蛛痣
- C. 伴明显腹胀
- D. 伴左锁骨上淋巴结肿大
- E. 伴黑便

53. 关于尿频的判断正确的是

- A. 单位时间内排尿次数增多，每日排尿 >8 次
- B. 单位时间内排尿次数增多，每日排尿 ≥ 8 次
- C. 单位时间内排尿次数增多，每日排尿 >7 次
- D. 单位时间内排尿次数增多，每日排尿 ≥ 7 次
- E. 单位时间内排尿次数增多，每日排尿 <8 次

54. 男，56岁。反复血尿3个月，血尿多在排尿结束前出现，为鲜红色，无血块排出，伴有轻微尿痛。引起该患者血尿的病变部位最可能在

- A. 肾脏
- B. 输尿管
- C. 前尿道
- D. 膀胱顶部
- E. 膀胱三角区或后尿道

55. 泌尿系肿瘤血尿是

- A. 无痛性肉眼血尿
- B. 终末血尿伴膀胱刺激症状
- C. 初始血尿
- D. 疼痛伴血尿
- E. 血尿+蛋白尿

56. 阴道出血的表现错误的是

- A. 经量增多

- B. 周期不规则
- C. 持续阴道流血
- D. 停经后阴道流血
- E. 月经期阴道流血

57. 女, 40 岁。上个月腰部抬重物时出现隐痛, 疼痛沿右腿后方放射至右足, 活动后加重, 休息后可减轻。查体: T 36.5°C, 腰部活动受限, 右侧直腿抬高试验(+), 右跟腱反射减弱。最可能的诊断是

- A. 腰肌扭伤
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎结核
- D. 腰椎管狭窄症
- E. 腰椎间盘突出症

58. 男, 45 岁。因突然剧烈头痛伴恶心、呕吐 2 小时就诊。查体: 心、肺和腹部未见异常, 四肢肌力正常, 脑膜刺激征阳性, 最可能的诊断是

- A. 偏头痛
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 三叉神经痛
- E. 蛛网膜下腔出血

59. 临床最常见的头痛伴剧烈呕吐多提示为

- A. 偏头痛
- B. 颅内高压
- C. 颅低压性头痛
- D. 脑膜炎
- E. 癫痫

60. 女, 30 岁。近 3 年来多次于情绪激动或生气后出现四肢抽搐, 伴颈后仰。双眼紧闭、咬牙及过度换气, 每次抽搐持续数分钟至数小时不等。发作时无舌咬伤、大小便失禁。头颅 CT 及脑电图检查未发现异常。最可能的诊断是

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 低血糖症
- C. 癫痫发作
- D. 低钙血症
- E. 癔症

61. 有意识的抽搐见于

- A. 低血钙
- B. 破伤风
- C. 癫痫
- D. 低血镁
- E. 碱中毒

62. 抽搐患者转诊前应检查下列哪项指标后立即转诊

- A. 呼吸
- B. 血压

- C. 血糖
- D. 脉率
- E. 意识

63. 引起眩晕发作的因素不包括

- A. 梅尼埃病
- B. 迷路炎
- C. 药物中毒
- D. 椎-基底动脉供血不足
- E. 腹泻

64. 患者处于熟睡状态，不易唤醒。在强烈刺激下（如用力摇动其身体或压眼眶）能被唤醒，但很快又入睡，醒时答非所问或答话含糊不清。其意识障碍的程度应于

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊

65. 意识障碍伴瞳孔散大的疾病是

- A. 癫痫
- B. 肺炎
- C. 吗啡中毒
- D. 有机磷农药中毒
- E. 巴比妥中毒

66. 女童，10 岁。流涕、咽喉痛伴咳嗽 3 天。查体：T 37℃，鼻腔黏膜充血、水肿、有分泌物，咽部轻度充血，无脓性分泌物。心肺未见异常。最可能的诊断是

- A. 普通感冒
- B. 支气管炎
- C. 流行性感
- D. 支气管哮喘
- E. 急性过敏性鼻炎

67. 女，20 岁。受凉后发热伴鼻塞、流涕、咽痛 3 天。既往反复发作，经治疗后可好转。该患者今后预防措施的建议中不正确的是

- A. 加强锻炼
- B. 避免受凉
- C. 避免劳累过度
- D. 生活饮食规律
- E. 长期口服小剂量抗生素

68. 有关急性上呼吸道感染下列描述正确的是

- A. 婴幼儿全身症状轻
- B. 婴幼儿不易出现并发症
- C. 多由细菌感染引起
- D. 年长儿症状重，而婴幼儿较轻
- E. 特殊类型的上感包括疱疹性咽峡炎和咽结合膜热

69. 引起咽结合膜热的病毒是

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 腺病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 麻疹病毒
- E. 偏肺病毒

(70~71 共用题干) 男, 45 岁。反复咳嗽、咳痰 6 年。每逢冬季加重。近半个月来上述症状加重, 咳黄痰, 量不多。查体: 两肺底可闻及湿啰音。

70. 最可能的诊断是

- A. 支气管扩张症
- B. 急性支气管炎
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 支气管哮喘急性发作
- E. 慢性支气管炎急性发作

71. 若该患者逐渐出现呼吸困难、活动后加重的症状, 对确诊慢性呼吸衰竭最有意义的检查结果是

- A. 心电图示低电压、肺型 P 波
- B. 动脉血气分析示氧分压降低
- C. 肺泡呼吸音减弱, 呼气相延长
- D. 桶状胸, 叩诊过清音, 肺肝界下移
- E. 胸部 X 线片示肺透亮度增加, 心影狭小

72. 慢性阻塞性肺疾病治疗中不宜采用

- A. 戒烟
- B. 增强体质
- C. 流感疫苗
- D. 肺炎链球菌疫苗
- E. 预防性使用抗生素

73. 慢性阻塞性肺气肿发病的最主要因素是

- A. 感染
- B. 吸烟
- C. 大气污染
- D. 过敏反应
- E. 副交感神经功能亢进

74. 男, 67 岁。反复咳嗽、咳痰 10 余年, 活动后气短 3 年, 有吸烟史 30 余年。下列对诊断最有意义的检查是

- A. 血气分析
- B. 肺部 CT
- C. 心电图

- D. 肺通气灌注扫描
E. 肺功能检查

75. 支气管哮喘急性发作期禁用

- A. 地塞米松
B. 氨茶碱
C. 沙丁胺醇
D. 肾上腺素
E. 吗啡

76. 控制支气管哮喘气道炎症的首选药物是

- A. 糖皮质激素
B. 抗组胺药物
C. 抗胆碱药物
D. β 受体激动药
E. 乙酰半胱氨酸

77. 当支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，为缓解症状可使用的药物为

- A. 毛花苷丙
B. 肾上腺素
C. 氨茶碱
D. 吗啡
E. 呋塞米

78. 男，66 岁。咳嗽、气短伴发热 3 天。咳黄痰，痰中带血且量较多，呈胶冻状。给予头孢菌素抗感染治疗 3 天效果不佳。查体：T 39℃，口唇发绀。乡村医生目前应采取的措施

- A. 加用激素类药物
B. 复查胸部 X 线片
C. 换用喹诺酮类药物
D. 转至上级医院诊治
E. 行痰培养和药敏试验

79. 男婴，7 月龄。因受凉后低热、咳嗽、气促 4 天来诊。查体：T 37.8℃，R 52 次/分，两下肺可闻及细湿啰音。化实验室：WBC $7.1 \times 10^9/L$ ，N 0.78，胸部 X 线片显示双下肺斑片状阴影。最可能的诊断是

- A. 肺结核
B. 肺水肿
C. 胸腔积液
D. 支气管肺炎
E. 支气管异物

80. 肺炎球菌肺炎患者若对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

- A. 庆大霉素
B. 阿米卡星
C. 链霉素
D. 阿莫西林
E. 左氧氟沙星

81. 男，32 岁。3 天前淋雨，次日出现寒战、高热，继之咳嗽，咳少量黏液脓性痰，伴右侧胸痛。查体：体温 39℃，急性病容，口角和鼻周有疱疹。心率 110 次/分，律齐。血 WBC $11 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

- A. 急性肺脓肿
- B. 干酪性肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

(82~84 共用题干)

男，41 岁。淋雨后发热、咳嗽 2 天，右上腹痛伴气急、恶心 1 天。

82. 除考虑急腹症外，重点鉴别的疾病是

- A. 自发性气胸
- B. 肺梗死
- C. 膈神经麻痹
- D. 肺结核
- E. 肺炎链球菌肺炎

83. 体检应注意有无

- A. 肠鸣音
- B. 上腹部压痛
- C. 肺肝浊音界
- D. 肺部异常呼吸音
- E. 右上腹肌紧张

84. 治疗首选药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 庆大霉素
- C. 青霉素
- D. 头孢他啶
- E. 胃肠道解痉剂

(85~87 共用题干)

女，30 岁。乏力、低热伴痰中带血丝 2 个月。查体：浅表淋巴结无肿大，双肺未闻及干湿性啰音。胸部 X 线片检查可见右上肺密度不均匀片状影。

85. 最可能的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 右上肺大叶性肺炎

86. 判断肺结核传染性最主要的依据是

- A. 红细胞沉降率增快
- B. 反复痰中带血
- C. 结核菌素试验阳性
- D. 痰涂片找到抗酸杆菌
- E. 胸部 X 线片显示空洞性病变

87. 肺结核原发综合征的临床表现是

- A. 病灶常为多结节性
- B. 肺内常见结核球
- C. 肺内可有一个或多个空洞
- D. 病灶位于锁骨上、下
- E. 原发病灶、淋巴管炎及肺门淋巴结结核

88. 女，28 岁，工人。发热，干咳 1 个月，发病时胸部 X 线片示肺纹理增多，先后使用“青霉素”“头孢菌素”抗感染治疗半个月余症状未见好转。查体：T 39.8℃，消瘦，双侧颈部可触及多个成串小淋巴结，双肺未闻及干湿性啰音，PPD 试验(-)，胸部 X 线片示双肺弥漫分布直径约 2mm 的小结节影。该患者最可能的诊断是

- A. 真菌性肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 过敏性肺炎
- D. 细菌性肺炎
- E. 急性粟粒性肺结核

89. 男，45 岁。高血压病史 5 年，一直接受正规治疗，日常活动不受限，体检无异常发现。心电图正常。该患者目前心功能临床分期属于

- A. A 期
- B. B 期
- C. C 期
- D. D 期
- E. 无法分期

90. 男，22 岁。因急性病毒性心肌炎 5 天住院，近 2 天出现心慌，气短，不能平卧。查体：心脏扩大，心率 132 次/分，律齐，心尖部可闻及舒张期奔马律，肝肋下未触及，下肢无水肿，最可能诊断是

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性右心衰竭
- C. 慢性左心衰竭
- D. 慢性右心衰竭
- E. 慢性全心衰竭

91. 左心衰竭患者合并右心衰竭后，可能减轻的临床症状是

- A. 恶心
- B. 喘憋
- C. 肝大
- D. 颈静脉充盈
- E. 下肢水肿

92. 男，66 岁。心悸 3 天来医院就诊。既往高血压病史 20 年。查体：P 90 次/分，BP 140/66mmHg，双肺听诊未见异常。心率 130 次/分，第一心音强弱不等、心律绝对不规整。导致患者心悸最可能的原因是

- A. 房性早搏
- B. 室性早搏
- C. 心房颤动
- D. 心动过速
- E. 房室传导阻滞

93. 女，51 岁。妇科手术前接受常规心电图检查示窦性心动过缓（46 次/分），有频发房性早搏。既往无慢性病史，近 2 年快走或上楼时感轻度乏力、头晕。正确的处理是

- A. 口服阿托品治疗
- B. 建议进一步检查
- C. 安置永久性起搏器
- D. 暂不需治疗，定期复查心电图
- E. 口服 β 受体拮抗剂治疗房性早搏

94. 男，45 岁。发现血压高 2 周，连续 3 天门诊测量均为 180/110mmHg 左右，无不适感觉。既往无慢性病史。下述处理中不正确的是

- A. 做心电图
- B. 查尿常规
- C. 全身体格检查
- D. 查血电解质、肾功能
- E. 暂时不使用降压药物

（95~97 共用题干）男，45 岁。高血压病史 6 年，最高血压达 160/100mmHg。糖尿病 3 年。

95. 该患者血压的控制目标是

- A. 140/90mmHg 以下
- B. 140/80mmHg 以下
- C. 130/90mmHg 以下
- D. 130/80mmHg 以下
- E. 120/80mmHg 以下

96. 首选的降压药物是

- A. 美托洛尔
- B. 比索洛尔
- C. 氨氯地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 依那普利

97. 治疗 2 个月后血压未达标，建议优先加用的药物是

- A. 美托洛尔
- B. 比索洛尔
- C. 氨氯地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 依那普利

98. 男，56 岁。2 年前因急性心肌梗死接受冠脉介入治疗术后活动时无不适。近 2 周出现快步行走时心前区憋闷，活动终止后 1~2 分钟症状消失。心电图检查提示 II、aVL 导联 QR 型，ST 段无偏移。最可能的诊断是

- A. 急性心包炎
- B. 稳定型心绞痛
- C. 急性心肌梗死
- D. 不稳定型心绞痛
- E. 陈旧性心梗再发急性心梗

(99~100 共用题干)男,40 岁。突发胸骨后疼痛 2 小时来诊。查体:右上肢血压 150/80mmHg,左上肢血压 140/72mmHg。肺听诊无啰音,心率 52 次/分,律齐。心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段水平抬高 0.3mV。

99. 最可能的诊断是

- A. 急性心包炎
- B. 急性心肌梗死
- C. 稳定型心绞痛
- D. 不稳定型心绞痛
- E. 急性主动脉夹层

100. 下述处理中不正确的是

- A. 吸氧
- B. 心电监护
- C. 注射杜冷丁
- D. 口服美托洛尔
- E. 嚼服阿司匹林

101. 女,60 岁。间断上腹胀痛 5 年,进食凉、辣等刺激性食物后明显,有时伴暖气、上腹部烧灼感,发病以来食欲欠佳。尿色及尿量正常,体重稳定。既往曾诊断为胆石病。最可能的诊断是

- A. 胆管结石
- B. 慢性胃炎
- C. 胃溃疡癌变
- D. 十二指肠溃疡
- E. 反流性食管炎

(102~103 共用题干)女,51 岁。2 个月来反复出现夜间入睡时胸骨下段疼痛,性质呈刺痛、烧灼样,有时向后背、胸部放射,坐起或喝水后症状可减轻,偶尔在饱餐后 1 小时左右发生,口含硝酸甘油无效。既往有高血压、十二指肠溃疡史,否认糖尿病病史。

102. 最可能的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 胆囊炎
- C. 慢性胃炎
- D. 主动脉夹层
- E. 胃食管反流病

103. 最有效的治疗措施是

- A. 介入治疗
- B. 静注抗菌药物
- C. 口服胃肠动力药
- D. 口服质子泵抑制剂
- E. 口服抗血小板药物

104. 男,59 岁。胸骨后疼痛伴烧心、反酸 2 个月,餐后及卧位时加重,伴轻度间歇性吞咽困难,服用奥美拉唑可以减轻,有长期吸烟饮酒史,最可能的诊断是

- A. 食管癌
- B. 贲门癌
- C. 食管憩室
- D. 食管结核
- E. 胃食管反流病

(105~106 共用题干)男,40 岁。3 小时前饱餐后突发上腹痛,疼痛迅速向全腹蔓延。查体:T 37.8℃,心肺查体无异常。腹肌紧张,全腹有压痛、反跳痛,肝浊音界缩小。

105. 最可能的诊断是

- A. 急性胃穿孔
- B. 急性肠梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肝破裂

E. 急性化脓性阑尾炎

106. 应避免采取的诊断措施是

- A. 血常规
- B. 立位腹平片
- C. X 线钡餐造影
- D. 血淀粉酶检测
- E. 诊断性腹腔穿刺

107. 男，56 岁。2 年前因上腹隐痛反复发作于当地医院就诊，胃镜检查后诊断为“慢性萎缩性胃炎伴重度不典型增生”。该病发展最严重的结局是

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 恶性贫血
- D. 胃泌素瘤
- E. 消化不良

108. 女，30 岁。半个月前因上腹痛就诊，被诊断为：十二指肠溃疡伴幽门螺杆菌感染，已经口服法莫替丁半个月，进一步治疗建议中错误的是

- A. 可配合口服胃黏膜保护剂
- B. 持续抗幽门螺杆菌治疗 1 个月
- C. 抑酸剂治疗疗程可为 1 个半月
- D. 无论溃疡是否愈合均需抗幽门螺杆菌治疗
- E. 若法莫替丁疗效欠佳，可改用 PPI 治疗

(109~110 共用题干) 女，60 岁。反复呕血伴黑便 4 小时。呕吐 3 次，每次量约 300ml，为暗红色伴血块，混有少量胃内容物；排暗红色血便 2 次，每次量约 150ml，不伴腹痛。查体：P 120 次/分，BP 86/50mmHg。皮肤苍白，巩膜略黄染，腹软无压痛，肝肋下未触及，脾肋下 3cm，腹水征 (+)。

109. 导致该患者消化道出血最可能的病因是

- A. 胃癌
- B. 脾肿瘤
- C. 十二指肠溃疡
- D. 肝硬化（失代偿期）
- E. 急性糜烂出血性胃炎

110. 应立即采取的治疗措施是

- A. 迅速补充血容量
- B. 口服雷尼替丁
- C. 输新鲜冰冻血浆
- D. 静脉注射肾上腺素
- E. 不予处理，立即转诊

(111~112 共用题干) 女，30 岁。2 天前饱餐后出现脐周疼痛不适，伴恶心，未呕吐，半天后右下腹明显疼痛，阵发加重，1 天前开始发热。既往曾行剖宫产，末次月经为 2 周前。查体：T 38.5℃，P 100 次/分，BP 110/70mmHg。麦氏点有压痛、反跳痛，右下腹肌紧张，肠鸣音 2 次/分，移动性浊音阴性。

111. 最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肠梗阻
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胆囊炎
- E. 十二指肠溃疡

112. 首选的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 甘油灌肠
- C. 口服抗菌药物
- D. 应用生长抑素

E. 给予胃黏膜保护剂

113. 女，40 岁。上腹部疼痛伴恶心、呕吐 7 小时，1 小时前疼痛转移至右下腹，查体：右下腹压痛，反跳痛 (+)。化验：血 WBC $14.6 \times 10^9/L$ ，N 0.80。最可能的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性肠梗阻