

2020 年中西医助理医师

内科串讲 3

主讲：姜逸

一、A1

1. 预防腔隙性梗死的关键是

- A. 应用抑制血小板聚集药物（阿司匹林等）
- B. 应用扩血管药物
- C. 钙离子拮抗剂（尼莫地平、氟桂利嗪等）
- D. 有效控制高血压病及防治各种类型脑动脉硬化
- E. 控制可干预危险因素如吸烟、糖尿病、高脂血症等

2. 类风湿关节炎的中医证型阴虚内热证所适用的方药是

- A. 四妙丸
- B. 丁氏清络饮
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 独活寄生汤

3. 咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿，为

- A. 水肿
- B. 痰饮
- C. 悬饮
- D. 溢饮
- E. 支饮

4. 治疗快速性心律失常心脉瘀阻证，应首选

- A. 归脾汤加减
- B. 天王补心丹加减
- C. 生脉散加减
- D. 黄连温胆汤加减
- E. 桃仁红花煎加减

5. 类风湿关节炎湿热痹阻证选用

- A. 四妙丸
- B. 丁氏清络饮
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 独活寄生汤
- E. 身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸

6. 重型再障感染时常合并的疾病是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 慢性胃炎
- C. 败血症
- D. 肺炎

E. 肾炎

7. 下列哪项增高的程度能较准确地反映梗死的范围,其高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功

- A. 肌钙蛋白 I
- B. 肌钙蛋白 T
- C. LDH
- D. AST
- E. CK-MB

8. 窦性心动过缓的患者出现头晕、乏力,则心率为

- A.  $\geq 40$  次/分
- B.  $< 40$  次/分
- C.  $> 50$  次/分
- D.  $< 50$  次/分
- E.  $\leq 50$  次/分

9. 下列哪项可出现下垂性水肿

- A. 心脏病
- B. 肾脏病
- C. 肝脏病
- D. 营养不良
- E. 上腔静脉回流受阻

10. 幽门螺杆菌根除治疗后复查,应首选的辅助检查是

- A. 组织学检查
- B. 黏膜涂片染色
- C. 多聚酶链反应
- D. 快速尿素酶试验
- E.  $^{13}\text{C}$  或  $^{14}\text{C}$  尿素呼气试验

11. 下列哪项不是鼓胀的病因

- A. 酒食不节
- B. 情志刺激
- C. 外感六淫
- D. 病后续发
- E. 虫毒感染

12. 血证由外邪所致者多是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 热邪
- D. 暑邪
- E. 燥邪

13. 小青龙汤治疗溢饮，其治法为

- A. 温阳化饮
- B. 发表化饮
- C. 分消水饮
- D. 宣肺化饮
- E. 散寒平喘化饮

14. 下列除哪项外均是咯血的治疗方法

- A. 凉血止血
- B. 清泄肺热
- C. 滋阴润肺
- D. 清热润肺
- E. 清肝泻火

15. 治疗原发性免疫性血小板减少症的首选药物是

- A. 富马酸亚铁
- B. 肾上腺素
- C. 糖皮质激素
- D. 达那唑
- E. 羟基脲

16. 治疗慢性肺源性心脏病痰热郁肺证首选方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 苏子降气汤
- C. 越婢加半夏汤
- D. 真武汤合五苓散
- E. 沙参麦冬汤合五味消毒饮

17. 普通感冒的主要临床表现是

- A. 扁桃体肿大，表面有黄色点状渗出物
- B. 咽部及结膜充血，淋巴结肿大
- C. 咽部发痒，有灼热感
- D. 鼻腔黏膜充血、水肿，有分泌物
- E. 颈部淋巴结肿大

18. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 肺源性心脏病
- B. 支气管肺炎
- C. 急性上呼吸道感染
- D. 支气管扩张症
- E. 阻塞性肺气肿

19. 下列哪项不是针对低危骨髓增生异常综合征的治疗方案

- A. 支持疗法
- B. 造血干细胞移植
- C. 使用去甲基化药物
- D. 使用生物反应调节剂
- E. 促造血治疗

20. 胃癌最常见的转移途径是

- A. 淋巴结转移
- B. 直接蔓延
- C. 血行播散
- D. 腹腔种植
- E. 盆腔种植

21. 上行感染常见的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 链球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 结核杆菌

22. 哪项不是慢性肾小球肾炎的基本临床表现

- A. 水肿
- B. 高血压
- C. 少尿
- D. 血尿
- E. 蛋白尿

23. 肾周围脓肿致病菌多为

- A. 革兰阴性杆菌
- B. 革兰阳性杆菌
- C. 革兰阴性球菌
- D. 革兰阳性球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

24. 系统性红斑狼疮的多发人群是

- A. 儿童
- B. 孕妇
- C. 老年人
- D. 男性
- E. 女性

二、A2

25. 患者，男，33岁，诊断为胃癌。近日来胸膈满闷作胀或痛，胃纳减退，厌食肉食，吞咽梗噎不顺，呕吐痰涎，苔白腻，脉弦滑。治疗方剂首选的是

- A. 玉女煎  
B. 柴胡疏肝散  
C. 海藻玉壶汤  
D. 开郁二陈汤  
E. 理中汤合四君子汤

26. 患者，女，50岁，日渐消瘦，胸部压痛剧烈，咳嗽而且是刺激性干咳，声音嘶哑，大致可推断患者属于

- A. 支原体肺炎  
B. 军团菌肺炎  
C. 肺结核  
D. 原发性支气管肺癌  
E. 克雷白杆菌肺炎

27. 患者，男，60岁，Ccr75ml/min，Scr150 $\mu$ mol/L，诊断为慢性肾衰竭，现症见：口干口苦，口臭，恶心频频，舌苔黄腻，治疗当

- A. 清化和中  
B. 清利湿热  
C. 利尿消肿  
D. 化湿泄浊  
E. 活血化瘀

28. 某女，发作性气喘伴喉间痰鸣多年，近两天气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高肋胀，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，面赤口苦，咳痰色黄，黏浊稠厚，咳吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为哮喘，其中医证型及首选治疗方剂是

- A. 脾虚证，六君子汤加味  
B. 肺虚证，玉屏风散加味  
C. 热哮证，定喘汤加减  
D. 寒哮证，射干麻黄汤加减  
E. 肾虚证，肾气丸或七味都气丸加减

29. 李某，女，24岁。突发寒战高热，咳嗽咯痰，右胸痛3天，予退热剂后出现大汗淋漓，头晕，眼花，心悸，速来急诊。查体：神志清楚，血压70/45mmHg，心率130次/分，呼吸急促，口唇发绀，右下肺叩浊音，可闻及管状呼吸音。血白细胞 $25.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.86。X线示：右下肺大片炎症浸润阴影。其诊断及治疗措施是

- A. 支原体肺炎；应用糖皮质激素  
B. 肺炎球菌肺炎；针对病原菌选用有效抗生素  
C. 肺脓肿；畅通气道，祛痰，止咳，吸氧  
D. 葡萄球菌肺炎；纠正水、电解质和酸碱紊乱  
E. 休克型肺炎；控制感染，补充血容量

30. 患者，男，23岁，痼病日久，神疲乏力，眩晕时作，面色不华，胸闷痰多，纳少便溏，舌淡胖，苔白腻，脉濡弱。治疗首选

- A. 涤痰汤  
B. 醒脾汤  
C. 通窍活血汤  
D. 定痫丸  
E. 参苓白术散

31. 张某，女，45 岁，因胃脘痞闷不适 3 月就诊，患者近 3 月来经常脘腹痞闷，重时满闷如塞，但不疼痛，饮食减少，恶心嗳气，大便不爽，喜长叹息，有时心烦易怒，胸胁胀满，每因生气恼怒而使症状加重，苔薄白，脉弦。治宜选用

- A. 保和丸
- B. 二陈汤
- C. 补中益气汤
- D. 泻心汤合连朴饮
- E. 越鞠丸合枳术丸

32. 患者，男，52 岁。近来肋肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。治法宜选用

- A. 疏肝理气
- B. 祛瘀通络
- C. 清热利湿
- D. 养阴柔肝
- E. 疏肝解郁

33. 患者，女，40 岁，水肿多年，腰以下为甚，按之不易复起，脘腹胀闷，纳减便溏，面色萎黄，神倦肢冷，小便短少。舌淡胖，边有齿痕，舌苔白腻，脉沉弱，治疗宜选用方剂是

- A. 实脾饮
- B. 济生肾气丸合真武汤
- C. 胃苓汤合五皮饮
- D. 参苓白术散
- E. 越婢加术汤

34. 患者，女，43 岁，被诊断为高血压病肝阳上亢证（以天麻钩藤饮加减治疗），采用的治法为

- A. 平肝潜阳
- B. 滋养肝肾
- C. 镇肝息风
- D. 清肝泻火
- E. 疏肝理气

35. 某女，22 岁，喘逆上气，息粗鼻扇。咳而不爽，痰吐稠黏，形寒身热，身痛无汗，口渴，苔薄白或黄、质红，脉浮数。治疗方剂宜首选

- A. 麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 桑白皮汤
- E. 三子养亲汤

36. 患者，女，33 岁。性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，目赤，耳鸣，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。治疗应选用

- A. 归脾汤
- B. 柴胡疏肝散
- C. 丹栀逍遥散
- D. 半夏厚朴汤



E. 甘麦大枣汤

37. 患者，男，70 岁。症见：咳嗽，咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，其属于

- A. 痰饮
- B. 悬饮
- C. 溢饮
- D. 支饮
- E. 风水

38. 患者，女，20 岁，自诉与家人争吵后口服“鼠药”1 包，半小时后独自来诊，服药量不详。体检：神清，生命体征稳定，双侧瞳孔约 2.0mm，口无分泌物，无大汗，双肺未闻及干湿性啰音，未见肌纤维颤动。门诊立即予以清水洗胃近 1 小时（患者不合作），洗胃液无特殊气味。洗胃后患者出现大汗，双侧瞳孔缩小，口吐白沫，双肺满布湿啰音。初步诊断

- A. CO 中毒
- B. 酒精中毒
- C. 安定中毒
- D. 阿托品中毒
- E. 有机磷杀虫药中毒

39. 李某，女，高热 5 天，不恶寒，满面红赤，皮肤红斑，咽干，口渴，喜冷饮，尿赤而少，关节疼痛，舌红绛，苔黄，脉滑数。其中医证型是

- A. 热郁积饮证
- B. 气营热盛证
- C. 阴虚内热证
- D. 气分热盛证
- E. 瘀热痹阻证

40. 患者，男，28 岁，持续性上腹隐痛 3 个月，多次查大便隐血试验阳性，食欲不振，消瘦。体检：面色苍白，上腹部有压痛，未触及包块，肝、脾肋下未及。下述哪项检查对确诊有帮助

- A. 胃酸测定
- B. 血清胃泌素测定
- C. 纤维胃镜加活检
- D. 肝放射性核素扫描
- E. B 型超声检查

三、A3/A4

41. 患者，男，59 岁。3 月前左肩胛骨及左上肢内侧疼痛，逐渐加重，伴有低热。现症见：咳嗽，痰多，气憋胸闷，纳差便溏，身热尿黄，舌质暗，苔厚腻，脉滑数。查体：左眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷。X 线胸片示：左前第 2 肋以上至肺尖有高密度阴影。

1) 其病证结合诊断是

- A. 肺门淋巴结结核，气滞血瘀证
- B. 肺炎，气阴两虚证
- C. 急性粟粒型肺结核，痰湿毒蕴证
- D. 支气管肺癌，痰湿毒蕴证
- E. 肺炎，阴虚毒热证

2) 中医治法为

- A. 解毒散结
- B. 化痰散结

- C. 活血散瘀
- D. 祛湿化痰
- E. 行气化痰

3) 应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤
- C. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- D. 沙参麦冬汤
- E. 生脉饮

42. 缺铁性贫血患者，女，36 岁。表现为面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。

1) 中医治法是

- A. 益气补血，养心安神
- B. 健脾和胃，益气养血
- C. 温补脾肾
- D. 杀虫消积
- E. 补益气血

2) 首选方药是

- A. 香砂六君子汤合当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤
- D. 无比山药丸
- E. 化虫丸合八珍汤

3) 若日久失治，表现为面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸软，神倦耳鸣，唇甲淡白，大便溏薄，小便清长，舌质淡，脉沉细。此时当首选的方剂是

- A. 八珍汤合无比山药丸
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤
- D. 化虫丸
- E. 当归补血汤

43. 患者，女，50 岁。咳嗽无力，伴痰中带血，持续体重下降。午后潮热，手足心热，纳呆腕胀，舌质红苔薄，脉细数无力。X 线示左肺门类圆形阴影，边缘毛糙。

1) 应首先考虑的诊断是

- A. 肺脓肿
- B. 肺气肿
- C. 肺良性肿瘤
- D. 肺癌
- E. 结核球

2) 中医治法是

- A. 活血散瘀，行气化滞
- B. 祛湿化痰，清热解毒
- C. 疏肝理气，化瘀止痛



- D. 养阴清热，解毒散结
- E. 益气养阴，化痰散结

3) 首选方药是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤
- C. 导痰汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 四君子汤

44. 患者，男，50岁。乙型肝炎12年，现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，乏力，食欲不振。查体：营养不良，腹部结块。舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦。

1) 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 慢性迁延性肝炎
- D. 肝血管瘤
- E. 肝癌

2) 中医证型是

- A. 气滞血瘀证
- B. 湿热瘀毒证
- C. 肝胃不和证
- D. 气血两虚证
- E. 脾胃虚寒证

3) 治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- B. 逍遥散合桃红四物汤
- C. 滋水清肝饮
- D. 鳖甲煎丸
- E. 秦艽鳖甲散

四、B

- 45. A. 脾不统血证
- B. 肾气不固证
- C. 血热妄行证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气虚不摄证

1) 久病尿血，血色淡红，头晕耳鸣，精神困倦，腰膝酸软，舌质淡，脉沉弱。其证型为

2) 便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。其证型为

46. A. 补中益气汤

- B. 金匱肾气丸
- C. 丹梔逍遥散
- D. 黄连温胆汤
- E. 归脾汤

- 1) 治疗血虚发热选用
- 2) 治疗气虚发热选用

47. A. 肝郁脾虚证  
B. 阴血亏虚证  
C. 湿热内蕴证  
D. 脾胃虚弱证  
E. 脾肾阳虚证

- 1) 溃疡性结肠炎用白头翁汤治疗的证型是
- 2) 溃疡性结肠炎用参苓白术散治疗的证型是

48. A. 解表清里，化痰平喘  
B. 清热化痰，宣肺平喘  
C. 痰浊阻肺，宣肺平喘  
D. 扶阳固脱，镇摄肾气  
E. 补肾纳气

- 1) 喘证正虚喘脱证的治法宜选用
- 2) 喘证肾虚不纳证的治法宜选用

49. A. 0 级  
B. I 级  
C. II 级  
D. III 级  
E. IV 级

- 1) 类风湿关节炎关节功能障碍的分级中，能照常进行日常生活和工作的为
- 2) 类风湿关节炎关节功能障碍的分级中，仅能生活自理，不能参加工作和其他活动的为

50. A. 清热凉血  
B. 活血化瘀止血  
C. 滋阴补肾，益气养血  
D. 滋阴降火，清热止血  
E. 益气摄血，健脾养血

- 1) 原发免疫性血小板减少症阴虚火旺证选用的治法是
- 2) 原发免疫性血小板减少症气不摄血证选用的治法是

51. A. 独参汤  
B. 泻心汤合十灰散  
C. 龙胆泻肝汤  
D. 当归补血汤  
E. 归脾汤

- 1) 患者吐血紫暗，常混有食物残渣，大便黑如漆，口臭，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是
- 2) 患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌淡，脉细弱。治疗应首选的方剂是

52. A. 益气救阴  
B. 回阳固脱  
C. 祛痰降浊  
D. 豁痰活血，开窍醒神  
E. 滋补肝肾，平潜肝阳
- 1) 心脏性猝死元阳暴脱证选用的治法为  
2) 心脏性猝死气阴两脱证选用的治法为

53. A. 六磨汤加减  
B. 润肠丸加减  
C. 增液汤加减  
D. 麻子仁丸加减  
E. 温脾汤合半硫丸加减
- 1) 治疗热秘应首选的药物是  
2) 治疗冷秘应首选的药物是