

医学教育网护士考前冲刺模考试卷

一、A1

1.心脏复苏首选的药物是

A.阿托品

B.利多卡因

C.肾上腺素

D.异丙肾上腺素

E.氯化钙

2.滴虫性阴道炎典型的白带特征是

A.干酪样

B.豆渣样

C.稀薄泡沫样

D.血性

E.脓性

3.可出现反常呼吸运动的是

A.脓胸

B.桶状胸

C.漏斗胸

D.连枷胸

E.血气胸

4.下列护患沟通中,属于开放式提问的是

A.“您今天早上吃过药了吗?”

B.“您为什么不愿意选择手术治疗呢?”

C.“您的学历是本科吧?”

D.“您现在有疼痛的感觉吗?”

E.“您每天运动时间有1小时吗?”

5.治疗猩红热的首选抗生素是

A.青霉素

B.头孢曲松

C.红霉素

D.阿米卡星

E.庆大霉素

6.PDCA 循环中的“A”代表

A.管理


B.计划

C.实施

D.检查

E.处理

7.为成人进行心肺复苏(CPR),心脏按压的按压点应位于图示的



A.A

B.B



C.C

D.D



E.E

8.系统性红斑狼疮最常见的死亡原因是



A.心肌炎

B.肾衰竭


C.消化道大出血



D.颅内高压

E.肺炎

9.人际沟通包括的两种形式是



A.语言性沟通和非语言性沟通

B.口头沟通和语言性沟通

C.书面沟通和非语言性沟通



D.口头沟通和书面沟通

E.语言性沟通和书面沟通

10.破伤风阵发性痉挛最先累及的肌肉是

A.背腹肌

B.四肢肌

C.肋间肌

D.颈项肌

E.咀嚼肌

11.人际交往过程中对一个人某种人格特征形成印象后，以此来推测此人其他方面的特征，属于人际认知理论的哪种效应

A.首因效应

B.近因效应

C.晕轮效应

D.先礼效应

E.免疫效应

12.进行单人施救心肺复苏时，按压与呼吸的比例为

A.30:1

B.15:1

C.60:4

D.30:2

E.15:2

13.在下列患者中，护士在书写交班报告时首先应写

- A.4床，患者甲，上午10时转呼吸科
- B.18床，患者乙，上午9时入院
- C.21床，患者丙，上午8时手术
- D.85岁，患者丁，下午1时死亡
- E.41床，患者戊，医嘱特级护理

14.膀胱癌最主要的症状是

- A.排尿困难
- B.膀胱刺激征
- C.无痛性肉眼血尿
- D.下腹部肿块
- E.尿潴留

15.胸痛伴随咯血最可能见于的下列疾病是

- A.大叶性肺炎
- B.自发性气胸
- C.支气管肺癌
- D.心肌梗死
- E.气管炎

16.我国的传染病历史上，采取过甲类传染病的预防、控制措施的乙类传染病，下列不包括的是

A.人感染高致病性禽流感

B.伤寒

C.肺炭疽

D.新型冠状病毒肺炎

E.甲型 H1N1 流感

17.对无并发症的急性腮腺炎患儿，正确的隔离方式是

A.保护性隔离

B.接触隔离

C.血液隔离

D.消化道隔离

E.家中隔离

18.脓性指头炎典型的临床表现是

A.搏动性跳痛

B.手指关节肿胀

C.手指头刺痛

D.晚期疼痛加剧

E.晚期指头明显发红、肿胀

19.与新冠肺炎患者密切接触者，一般需要隔离

A.3 天

B.7 天 

 医学教育网
www.med66.com

C.10 天

D.14 天

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

E.21 天

 医学教育网
www.med66.com

20.溃疡性结肠炎的好发部位

 医学教育网
www.med66.com

A.升结肠

B.横结肠

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

C.降结肠

D.乙状结肠

E.盲肠

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

21.急慢性胃炎患者有少量出血，为中和胃酸可给予

A.米汤

B.肉汤

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

C.绿色蔬菜

D.温开水

E.冷开水

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com


22.人类维生素 D 的最主要来源是

- A.来自阳光照射皮肤
- B.食入动物肝脏提供
- C.食入蔬菜类提供
- D.食入水果类提供
- E.食入蛋类提供

23.尿毒症晚期患者的呼气中可有

- A.尿味
- B.樱桃味
- C.大蒜味
- D.甜味
- E.烂苹果味

24.对急性胆囊炎患者进行腹部触诊，最常见的压痛点



- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

E.E

25. 护士为使用呼吸机的患者吸痰，发现痰液黏稠不易吸出，错误的处理是

A. 叩拍胸背部

B. 增加负压吸引力

C. 滴入化痰药物

D. 滴入生理盐水

E. 雾化吸入

26. 产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是

A. 孕妇体重

B. 胎方位

C. 宫高和腹围

D. 胎动

E. 胎心率

27. 某社区护士拟向社区居民宣传乙脑的预防知识，在强调接种乙脑疫苗的同时，还应动员社区居民做好

A. 家禽管理

B. 家畜管理

C. 灭蝇工作

D.灭蚊工作

E.灭鼠工作



28.纯母乳喂养多长时间最好

A.2个月




B.4个月

C.6个月



D.9个月

E.12个月



29.胸部 X 线检查左房增大, 后前位左缘变直, 右缘双心房影提示

A.心包积液

B.二尖瓣狭窄

C.二尖瓣关闭不全

D.三尖瓣关闭不全

E.主动脉瓣狭窄



30.关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育, 正确的叙述是

A.关闭门窗

B.煤气淋浴器安装在浴室里

C.定期检查管道安全

D.使用不带有自动熄火装置的煤灶



E.通气开关可长期开放

31.新型冠状病毒最主要的传播途径是

A.飞沫传播

B.粪口传播

C.血液传播

D.水源传播

E.昆虫传播

二、A2

32.孕妇，23岁，妊娠33周，近10天来自感头痛，头晕。突然头痛加重，眼花、恶心、呕吐，急送医院。查体示BP170/105mmHg。尿蛋白(++)，水肿(++++)。入院后1小时，该孕妇出现腹痛伴大量阴道出血。最有可能的情况是

A.胎盘早剥

B.自然临产

C.DIC


D.前置胎盘

E.先兆子宫破裂

33.患者男，22岁。在田间喷洒有机磷农药时防护不当造成中毒，其瞳孔可见

- A. 双侧散大
- B. 双侧同向偏斜
- C. 单侧散大固定
- D. 双侧缩小
- E. 双侧瞳孔大小不等

34. 某急腹症的患者，病情平稳，可采用如图所示哪种卧位



- A. ④
- B. ⑤
- C. ②
- D. ③
- E. ①

35. 患者，男性，29岁，行甲状腺大部切除术。护士观察到患者术后发音时音调低钝，但饮水时并不出现误咽、呛咳，该护士怀疑术中可

能损伤了患者的

A.喉上神经内侧支

B.喉头水肿

C.喉上神经外侧支

D.单侧喉返神经

E.声带损伤

36.患者男, 79岁。因患 ARDS 入住 ICU。病情缓解后, 患者对护士说“我见不到孩子、老伴, 心里不舒服”。这表明该患者存在

A.生理需要

B.安全需要

C.爱与归属的需要

D.尊重的需要

E.自我价值实现的需要

37.患者, 男性, 21岁。大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤。若患者为铜绿假单胞菌感染, 则口腔护理应选用的溶液是

A.0.1%醋酸溶液

B.复方硼砂溶液

C.0.2%呋喃西林溶液


D.0.2%~0.3%硼酸溶液

E.1%~4%碳酸氢钠溶液

38. 孕妇, 38 岁, G3P2 孕 38 周, 今突感剧烈腹痛伴有少量阴道流血, 查体: 血压 150/110mmHg, 子宫似足月妊娠大小, 硬如木板, 宫缩间歇时宫体不能松弛, 胎心 90 次/分, 胎位不清, 其最可能发生了

- A. 临产
- B. 先兆子宫破裂
- C. 早产
- D. 胎盘早期剥离
- E. 前置胎盘

39. 患者男, 79 岁, 因伤寒入院, 需做大量不保留灌肠, 操作方法如图示, 操作中错误的是



- A. 患者体位

- B. 肛管插入直肠的深度
- C. 灌肠溶液的名称
- D. 桶内液面距离肛门的距离
- E. 灌肠溶液的用量

40. 男性，26岁，民工，在作业中不慎从高空坠落，头痛，呕吐急诊入院，诊断为脑挫裂伤，为预防脑水肿，降低颅内压，护士应让患者采取的体位为

- A. 仰卧位
- B. 头高脚低位
- C. 半坐卧位
- D. 端坐位
- E. 俯卧位

41. 患者，女，45岁，近来因皮肤总是出现青一块，紫一块的现象来院就诊，查体结果如图所示：皮肤黏膜出血直径大于5mm，称为



- A. 瘀点
- B. 瘀斑

C.紫癜

D.紫斑

E.出血点

42.患者，男性，62岁，肝癌晚期。入院后患者神志恍惚，躁动。正确的安全措施是

A.持续胃肠减压

B.加床档、约束带约束患者

C.纱布包裹压舌板，放于上、下臼齿之间

D.给予地西洋（安定）镇静

E.减少外界刺激

43.患者，男性，37岁，行腰麻术后5小时，烦躁不安，测血压、脉搏、呼吸均正常。护士查体见：下腹部膨隆，叩诊浊音，首先考虑

A.肠扭转

B.急性幽门梗阻

C.腹腔内出血

D.急性腹膜炎

E.尿潴留

44.患者，女性，57岁，诊断为尿毒症，患者精神萎靡，食欲差，24小时尿量80ml，下腹部无胀满，无胀痛，护士判断患者目前的排尿

状况是

A.尿潴留

B.蛋白尿

C.少尿

D.尿闭

E.多尿

45.患者，男性，55岁，口舌干燥。查体：皮肤弹性差，眼窝凹陷，尿比重 1.029，血清钠浓度为 157mmol/L，应首先补充

A.3%~5%的氯化钠注射液

B.11.2%乳酸钠注射液

C.5%葡萄糖注射液

D.低分子右旋糖酐注射液

E.林格液

46.患者，女性，66岁，诊断为风湿性心脏病，昨日夜间患者突然从睡梦中憋醒，坐在床边，咳嗽气促，烦躁不安，当班护士听诊患者双肺布满湿啰音，血压 180/95mmHg，心率 125 次/分，该护士为患者采取的护理措施中应除外

A.立即通知值班医生

B.给予氧气吸入

C.备好急救物品和药品

D.协助患者取双腿下垂端坐位

E.补充水分稀释痰液

47.患儿，2岁，室间隔缺损，发热、咳嗽、呼吸困难1天，以“肺炎”收入院。查体：患儿全身发绀、精神差。其发绀的主要原因是

A.肺炎致气体交换受损

B.体循环血流量减少

C.肺炎致肺循环血流量增多

D.肺动脉高压致血液右向左分流

E.室间隔缺损致血液左向右分流

48.患者，男性，72岁，患有原发性高血压病（2期），一日因情绪激动突然血压升至230/130mmHg伴剧烈头痛、恶心、呕吐、抽搐及嗜睡，分诊护士考虑患者发生了

A.高血压危象

B.高血压脑病

C.蛛网膜下腔出血

D.脑血栓

E.脑出血

49.患者，女性，25岁。初产妇，孕37+2周，患有妊娠高血压综合征，临产3小时，出现胎儿窘迫，其原因可能为

- A. 胎盘老化
- B. 羊水栓塞
- C. 脐带血运受阻
- D. 胎儿先天性心脏病
- E. 母体血氧含量不足

50. 患者，男性，60岁。高血压病史4年，今以广泛前壁急性心肌梗死3小时入院。能提示患者禁忌溶栓治疗的情况是

- A. 频发室性期前收缩（室早）二联律
- B. 血压 185/110mmHg
- C. 1年前做过胆囊手术
- D. 左心室肥大
- E. 年龄偏大

51. 患者，女性，55岁。高血压病史10年，因未规律用药，血压控制不理想，多在160/105mmHg。4小时前患者心前区持续疼痛、出冷汗来院急诊，诊断为急性心肌梗死。半小时前患者呼吸困难伴喘息，两肺布满湿啰音和哮鸣音，心率108次/分，律齐。首先考虑该患者的病情变化是

- A. 肺部感染
- B. 肺动脉高压
- C. 急性左心衰竭

D.急性右心衰竭

E.肺气肿

52.患者，女性，64岁。慢性支气管炎20年，劳力性心悸、呼吸困难3年。3天前肺部感染，昨晚突然呼吸困难，端坐床边，咳大量粉红色泡沫痰。查体：口唇发绀，心尖区触及震颤，听诊心尖区闻及舒张期隆隆样杂音，第一心音增强，两肺布满哮鸣音和湿啰音，考虑可能为

A.主动脉瓣关闭不全伴肺部感染

B.主动脉瓣关闭不全伴心力衰竭

C.二尖瓣关闭不全伴肺部感染

D.二尖瓣狭窄伴急性左心衰竭

E.二尖瓣狭窄伴急性肺水肿

53.患者，女性，42岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴心房颤动10年，半身麻木、活动不便3天，来院就诊。脱落栓子最可能栓塞的部位是

A.肺动脉

B.腹主动脉

C.脑动脉

D.下肢动脉

E.股动脉

54.患者，男性，56岁，大隐静脉高位结扎剥脱术后，护士对弹力绷带使用的宣教正确的是

- A.包扎前应下垂患肢
- B.以夜晚睡觉前进行包扎为好
- C.弹力绷带越紧越好
- D.由肢体的近端向远端包扎
- E.包扎后应能扪及足背动脉搏动

55.患者，男性，35岁。施工时不小心触高压电，导致心跳呼吸骤停。心肺初期复苏成功后，最重要的是恢复

- A.消化功能
- B.泌尿系统功能
- C.循环功能
- D.呼吸功能
- E.中枢神经功能

56.患儿，2岁。肺炎，抗生素治疗3周。口腔护理发现黏膜有点状灰白色乳凝块样物质，局部无痛，无全身症状，应考虑为

- A.维生素A缺乏
- B.鹅口疮
- C.卡他性口炎
- D.疱疹性咽峡炎

E.腮腺炎

57.患者,女性,63岁。2天前突然右侧肢体瘫痪,讲话不清;昨日清晨呕血1次,排黑便2次。既往无腹痛史。上消化道出血最可能的病因是

A.急性腐蚀性胃炎

B.胃黏膜脱垂症

C.胃溃疡活动期

D.急性糜烂出血性胃炎

E.食管胃底静脉曲张破裂出血

58.患者,女性,25岁。餐后跳绳时,突发脐周剧烈绞痛。查体:中腹部触及局限性压痛包块,全腹腹膜刺激征阳性。首先考虑的情况是

A.肠套叠

B.肠扭转

C.急性阑尾炎

D.急性胆囊炎

E.急性胰腺炎

59.患者,男性,8小时前剧烈咳嗽时,右侧腹股沟斜疝被嵌顿。护士如果观察到下列哪项说明疝发生绞窄,应做好急诊手术前准备

A.疝块增大,不能回纳

- B.腹胀明显、恶心、呕吐
- C.疝块紧张发硬，有触痛
- D.阵发性腹痛伴停止排便、排气
- E.局部有压痛，肌紧张

60.患者，女性，47岁。近年大便干硬难排，排便时肛门疼痛，便后疼痛减轻，过数分钟再次剧痛，长达数小时，诊断为肛裂，下列不宜采用的是

- A.热水坐浴
- B.保持大便通畅
- C.局部涂消炎止痛药膏
- D.及早手术治疗
- E.溃疡基底封闭注射

61.患者女，60岁。诊断为“有机磷农药中毒”，已经给予洗胃等处理，遵医嘱给予阿托品药物治疗。当患者出现下列哪种情况时及时通知医师给予停药

- A.颜面潮红
- B.皮肤干燥，口干
- C.体温 37.2℃
- D.心率 110 次/分
- E.烦躁不安，抽搐

62. 护士在为社区人群进行健康宣教，在下列人群中，可以指导其应

用口服避孕药进行避孕的是

A. 患有严重心血管疾病者

B. 乳房有肿块者

C. 甲状腺功能亢进者

D. 患有慢性肝炎者

E. 子宫畸形者

63. 患者男，40岁。行血栓闭塞性脉管炎术后，为了解反映肢体远端
血运情况，护士应观察的体征不包括的是

A. 双侧足背动脉搏动

B. 皮肤温度

C. 皮肤颜色

D. 皮肤出血

E. 皮肤感觉

64. 患者男，45岁。因车祸致伤急诊入院。初步检查拟诊骨盆骨折合
并腹腔内脏损伤，有休克征象。护士应首先给予

A. 建立静脉通道

B. 准备骨盆兜，行悬吊牵引

C. 准备腹腔手术止血

D.准备髌部石膏固定

E.准备骨牵引器材

65.孕 38 周孕妇，因先兆子痫入院。目前患者轻微头痛，血压为 140/90mmHg，尿蛋白（++），呼吸，脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中，护士应报告医师停药的情况是

A.呼吸 18 次/分

B.膝反射消失

C.头痛缓解

D.血压 130/90mmHg

E.尿量 800ml/24 小时

66.患者男，40 岁。因酒精性肝硬化入院，护士对其生活方式和行为的指导中，最重要的是

A.注意保暖

B.保持呼吸道通畅

C.戒酒

D.安全防护

E.低脂饮食

67.患者女，55 岁，因发作性胸闷，咳嗽就诊，诊为支气管哮喘。医嘱予糖皮质激素吸入治疗。下列用药指导中正确的是

- A.“吸入激素的主要作用是快速缓解”
- B.“如果哮喘症状缓解，即可停止用药”
- C.“吸入激素不会有任何副作用”
- D.“吸入激素后要漱口”
- E.“如果您要进行运动，可在此前预防性吸入激素”

68.患者男，66岁。患慢性阻塞性肺疾病多年，护士在指导进行呼吸训练时，吸气与呼气时间比最好是

- A.吸气:呼气=1:2
- B.吸气:呼气=1:1
- C.吸气:呼气=1.5:1
- D.吸气:呼气=2:1
- E.吸气:呼气=2.5:1

69.患者女，69岁，慢性肺心病急性发作。患者出现头痛、昼眠夜醒，神志恍惚时应考虑

- A.窒息先兆
- B.呼吸性酸中毒
- C.休克早期
- D.肺性脑病
- E.DIC

70.患者男, 69 岁, 以“肺心病”而入院治疗, 护士对患者进行身体评估发现下列症状, 其中提示其右心功能不全的是

A.口唇发绀

B.呼吸急促

C.表情痛苦

D.肝静脉回流征阳性

E.双肺底可闻及散在湿啰音

71.患者男, 53 岁。心脏病入院。某日患者出现心悸, 心率 30~40 次/分, 律齐, 首选的措施是

A.加强巡视

B.心电监护

C.安慰病人

D.立即报告医生

E.绝对卧床

72.患者女, 43 岁。以广泛性焦虑障碍入院, 广泛性焦虑障碍的症状不包括

A.坐卧不宁

B.出汗, 心跳加快

C.尿频、尿急

D.莫名恐惧

E.濒死感

73.患者男, 49 岁。因突发左侧肢体活动不利伴恶心。呕吐及头痛来诊, 以“脑栓塞”收入院。今晨护士进行肌力评估时其左侧肢体可轻微收缩, 但不能产生动作。按肌力记录法, 该患者的肌力为

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.4 级

E.5 级

74.患者男, 62 岁。诊断 2 型糖尿病坚持口服降糖药治疗, 血糖控制较好。患者拟计划春游, 出发前血糖低于哪个值时应注意低血糖

A.2.8mmol/L

B.3.9mmol/L

C.5.8mmol/L

D.6.9mmol/L

E.7.9mmol/L

75.患者男, 38 岁, 胃穿孔合并腹膜炎手术后第 7 天, 体温 39 度, 伤口无红肿, 大便次数频多, 有黏液, 伴里急后重, 该患者可能并发了

A.肠炎

B.肠粘连

C.盆腔脓肿

D.膈下脓肿

E.细菌性痢疾

76.8 个月男婴，在社区准备接种麻疹疫苗，护士在为其消毒时，应采用的消毒剂是

A.2% 碘酊

B.0.5% 碘伏

C.0.9% 生理盐水

D.75% 乙醇

E.90% 乙醇

77.4 个月患儿，低热，咳嗽，呼吸急促，呼气延长，双肺可闻及大量哮鸣音及中小水泡音，胸部 X 线检查见不同程度的肺充气过度或肺不张，最可能的诊断为

A.支气管肺炎

B.急性支气管肺炎

C.腺病毒肺炎

D.毛细支气管炎

E.金黄色葡萄球菌肺炎

78.患者女, 29岁, 口服安定 100 片, 家人发现时呼之不应, 意识昏迷, 急诊来医院, 错误的护理措施是

A.立即洗胃

B.立即催吐

C.硫酸镁导泻

D.0.9%生理盐水洗胃

E.监测生命体征

79.患儿, 女, 3岁半, 在门诊诊断为“房间隔缺损”, 拟择期手术治疗。

门诊护士对家属的健康教育要点, 错误的是

A.本病为一种先天性心脏病

B.经过治疗, 大多数情况下, 预后良好

C.治疗方案以手术为主

D.术前最重要的是防止皮肤破损

E.注意保护性隔离, 不要去人多拥挤的地方

80.患者女, 32岁。因“乏力、纳差 5 天, 尿黄 1 天”来诊, 经实验室检查诊断为急性病毒性肝炎 (甲型)。对于其 5 岁的儿子, 适宜的做法是

A.不需要采取任何措施

B.预防性服用抗病毒药物

C.进行相关检查, 若未感染可不做处理

D.进行相关检查,若未感染可注射人丙球蛋白

E.进行相关检查,若未感染可注射高价特异性免疫球蛋白

81.患者女,60岁,肝硬化10年,大量腹水,深昏迷急诊平车入院,该患者应该选择的体位是

A.中凹卧位,头偏向一侧

B.平卧位,头下加枕

C.侧卧位,膝下给枕

D.左侧卧位,头下加枕

E.仰卧位,头偏向一侧

82.28岁孕妇。平素月经规律,末次月经为2012年1月6日,其预产期是

A.2012年9月6日

B.2012年9月13日

C.2012年10月6日

D.2012年10月13日

E.2013年1月6日

83.患者女,72岁。患扩张型心肌病伴慢性右心衰竭5年,长期卧床。皮肤护理时,应着重预防压疮发生的部位是

A.肩胛部

B.枕部

C.腰骶部

D.胫前部

E.足踝部

84.患者男, 42岁。码头搬运工人。安装永久性起搏器 10 天后出院。

正确的出院指导是

A.可以恢复正常工作

B.可以行磁共振检查

C.学会每天自测脉搏

D.术侧上肢只能下垂, 不能抬起

E.1年内无心律失常可取出永久起搏器

85.患者男, 70岁。冠心病史 15 年。活动后出现心前区疼痛, 烧灼感。

首选的治疗措施是

A.口服安体舒通

B.嚼服达喜

C.肌肉注射杜冷丁

D.舌下含服硝酸甘油

E.口服扑尔敏

86.患者女, 18岁。失足落入水中, 15 分钟后被救出, 呼之不应, 胸

廓无起伏。抢救该患者首要的步骤是

A.倒水处理

B.通畅气道

C.人工呼吸

D.心脏按压

E.紧急呼救

87.患者男, 60岁。由于严重恶心呕吐导致急性消化液大量丢失。医生开具以下医嘱, 应首先为该患者输入的是

A.5%NaHCO₃溶液

B.平衡盐溶液

C.3%氯化钠溶液

D.5%葡萄糖溶液

E.10%葡萄糖溶液

88.患者女, 50岁。最近血压波动在(160~170)/(90~95) mmHg,

诊断为高血压, 属于

A.舒张期高血压

B.收缩期高血压

C. I级高血压

D. II级高血压

E. III级高血压

89.患者女, 45 岁。因餐后腹痛住院, 拟诊为急性水肿性胰腺炎行保守治疗。护士告知患者行胃肠减压的主要目的是

- A.减轻腹胀
- B.防止恶心, 呕吐
- C.减少胰液分泌
- D.预防感染
- E.防止胰液逆流

90.患儿, 8 岁。被诊断为“胆道蛔虫病”, 经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗 (每天 1 次)。该患儿服用驱虫药的时间应是

- A.早餐后
- B.午餐前
- C.午餐后
- D.晚餐后
- E.晚上睡前

91.患者男, 75 岁, 因“呼吸衰竭”入院, 住院期间应用呼吸兴奋剂。

患者出现了何种情况时提示药物过量

- A.烦躁不安
- B.面色苍白

C.呼吸深快

D.四肢湿冷

E.高热不退

92.患者男, 28岁。精神分裂症。第2次复发住院治疗后拟于明日出院。护士在对患者进行出院指导时, 应首先重点强调的是

A.规律生活

B.锻炼身体

C.加强营养

D.维持药物治疗

E.参与社会工作

93.患者男, 70岁。慢性阻塞性肺疾病, 出院后拟进行长期家庭氧疗, 护士应告知患者每日吸氧的时间是不少于

A.5小时

B.8小时

C.10小时

D.12小时

E.15小时

94.患儿, 3岁。出生4个月后发现发绀, 剧烈哭闹时有抽搐史。发育比同龄儿童稍差, 平时经常感冒。查体: 杵状指, 口唇发绀明显: 心

前区闻及III级收缩期喷射样杂音。X线胸片提示肺血少、右心室增大。

最可能的临床诊断是

A.房间隔缺损

B.室间隔缺损

C.动脉导管未闭

D.法洛三联症

E.肺动脉狭窄

95.患者女, 35岁。已婚, 主诉今日白带增多, 外阴瘙痒伴灼痛1周。

妇科检查: 阴道内多量灰白泡沫状分泌物, 阴道壁散在红斑点, 有助于诊断的检查是

A.阴道分泌物涂片检查

B.宫颈刮片

C.盆腔B超

D.诊断性刮宫

E.阴道镜检查

96.患者女, 48岁。哮喘持续发作, 呼吸36次/分, 吸气时脉搏明显

减弱, 此时该患者的脉搏属于

A.奇脉

B.短绌脉

C.洪脉

D.交替脉

E.水冲脉

97.患者男, 53 岁, 饮酒时发生言语不清, 呕吐, 随即昏迷, 右侧肢体瘫痪, 血压 230/120mmHg, 诊断为脑出血。为防止出血加重, 应首先采取的措施是

A.控制血压

B.保护性约束

C.手术治疗

D.止血处理

E.给予脱水剂、镇静止痛剂

98.患者男, 57 岁, 既往体健, 因确诊为新冠肺炎入院治疗, 现突然出现进行性呼吸困难、发绀, 自感胸廓紧束、严重憋气, 常规氧疗无法改善症状, 其可能出现了

A.心力衰竭

B.ARDS

C.休克

D.肾衰竭

E.肺心病

99.精神科患者林某说: “我脑子里乱哄哄的, 都是因为我太聪明了。”

我的血液里全是聪明，又浓又稠。我必须生个孩子，把我的聪明分给他一半，我才能好。要不然我就得喝芬达汽水，把我的聪明冲淡一点.....，我想喝汽水。”请问该患者的情况属于精神分裂症哪种表现类型

- A.情感障碍
- B.感知觉障碍
- C.思维联想障碍
- D.意志与行为障碍
- E.类神经症症状

三、A3/A4

患者，女性，64岁。反复咳嗽、咳痰25年。近2周来除上述症状加重，并伴气促、双下肢水肿。自服氢氯噻嗪25mg，bid，双下肢水肿稍好转，但气促加重，并出现心悸、烦躁不安、四肢抽搐，被家人送入急诊室。

100.患者急需的辅助检查是

- A.肾功能
- B.肝功能
- C.心电图
- D.血气分析
- E.脑CT

101.经吸氧 5L/min、抗炎、解痉治疗 1 天后，护士发现患者白天嗜睡。

估计出现该现象最可能的原因是

A.氧浓度不足

B.低氧血症加重

C.二氧化碳潴留加重

D.并发代谢性酸中毒

E.感染未控制住

患者，女性，26 岁。左胸刺伤 1 小时。患者呼吸困难，烦躁不安。

查体：脉搏 99 次/分，血压 75/55mmHg，口唇发绀，气管右移。胸骨

左缘第 5 肋间有一伤口，随呼吸有气体进出的“嘶嘶”声，左胸叩诊鼓

音，呼吸音消失。送医院行清创及闭式胸膜腔引流术。

102.以下连接不正确的是

A.妥善固定引流瓶，避免意外踢到

B.长玻璃管一端插入液面下 3~4cm，另一端与胸腔引流管连接

C.短玻璃管下端以穿出瓶塞为度

D.胸腔引流管与短玻璃管上端相接

E.水封瓶低于胸腔出口 60cm

103.闭式胸膜腔引流期间，水封瓶不慎被打破，护士此时首先应采取的措施是

A.安慰患者

- B.重新更换水封瓶
- C.将胸腔导管反折捏紧
- D.嘱患者深呼吸
- E.拔除胸腔导管

初产妇，产后 10 天，一切正常。

104.判断其宫底的高度应在

- A.平脐
- B.脐下两横指
- C.脐耻连线中点
- D.耻骨联合上 1 横指
- E.耻骨联合下

105.护士观察其恶露，正常颜色应该是

- A.鲜红色
- B.淡红色
- C.白色
- D.巧克力色
- E.铁锈红

患者，男性，38 岁。焦虑症。患者惶恐不安，头晕、胸闷、心悸，失眠、梦魇，有自杀企图，服用地西洋治疗。

106.该患者的主要护理问题是

A.焦虑

B.恐惧

C.预感性悲哀

D.社交障碍

E.思维异常

107.指导患者用药时应提示患者

A.长期坚持服用

B.小剂量服用

C.易出现成瘾

D.症状控制后可立即停药

E.症状控制后服 6~8 周

患者，女性，67岁，胃大部切除术后3周。患者进食10~20分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。

108.护士判断该患者出现的并发症为

A.碱性反流性胃炎

B.输入段口梗阻

C.倾倒综合征

D.低钾血症

E.溃疡复发

109. 护士为了预防此并发症发生, 应采取的措施是

A. 少食多餐

B. 流质饮食

C. 高盐饮食

D. 高糖类、低蛋白饮食

E. 进食时多喝水

患者男, 55 岁。慢性肾小球肾炎 10 年, 1 周前受凉后出现食欲减退, 恶心, 呕吐, 晨起明显, 夜尿增多。内生肌酐清除率为 30ml/min。

110. 患者饮食中蛋白质的选择正确的是

A. 大量动物蛋白

B. 大量植物蛋白

C. 少量动物蛋白

D. 少量植物蛋白

E. 禁食蛋白质

111. 为了维持水电解质、酸碱平衡, 下列护理措施不正确的是

A. 食用含钾高的食物

B. 限制磷的摄入

C. 补充活性维生素 D3

D. 限制钠、水摄入

E. 补充钙、铁

患者，男，40岁。冬季用蜂窝煤取暖后意识障碍8h入当地医院，诊断为一氧化碳中毒。

112. 为治疗一氧化碳中毒，最有效措施为

- A. 应用呼吸机
- B. 高压氧舱治疗
- C. 间断高浓度给氧
- D. 持续低流量给氧
- E. 应用呼吸兴奋剂

113. 此时护士应将患者安置的体位是

- A. 端坐位
- B. 侧卧位
- C. 中凹卧位
- D. 头低足高位
- E. 平卧位头偏一侧

患者男，62岁。高血压10年。夜间睡眠中突然憋醒，大汗淋漓，被迫坐起。喘息，咳粉红色泡沫痰。双肺闻及广泛哮鸣音。给予乙醇湿化吸氧。

114. 采用乙醇湿化吸氧的目的是

- A.湿化气道
- B.净化气道
- C.降低通气阻力
- D.降低肺泡表面张力
- E.降低肺泡内泡沫的表面张力

115.乙醇的浓度是

- A.20%~30%
- B.30%~40%
- C.40%~50%
- D.50%~60%
- E.60%~80%

患者男性，53岁。既往有高血压病史，某日参加朋友聚会大量饮酒后，突发头晕，呕吐，头痛剧烈，步态不稳，不能站立。左侧肢体出现活动障碍。

116.考虑该患者可能发生了

- A.脑栓塞
- B.脑血栓形成
- C.高血压危象
- D.内囊出血
- E.短暂性脑缺血发作

117.此时首先处理措施为

A.止血

B.纠正缺氧

C.降低血压

D.降低颅内压

E.纠正水电解质紊乱

118.若患者频繁呕吐，意识障碍突然加重，呼吸慢而不规则，瞳孔两侧大小不等。在通知医生的同时，应

A.高流量吸氧

B.通畅呼吸道

C.置高枕位

D.遵医嘱静脉滴注甘露醇

E.静脉滴注 5% 葡萄糖液

患者，男，51岁，消瘦。近三个月来咳嗽、咳痰，可见血丝。午后低热，两颧潮红，盗汗，疲乏无力。查体：锁骨上下可闻及少量湿啰音。

119.首先考虑该患者为

A.肺脓肿

B.肺结核

C.支气管肺炎

D.支气管扩张症

E.支原体肺炎

120.为确诊,最特异的检查是

A.X线片

B.肺部CT

C.血常规

D.痰液涂片

E.纤维支气管镜