

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 49 期

1. 【问题】心肺复苏常用的药物？

【解答】①肾上腺素：为救治心脏骤停的首选药物。主要效力为增加全身循环阻力，升高收缩压和舒张压，增加冠状动脉灌注和心脏血流量。

②利多卡因：心肺复苏时除肾上腺素外，利多卡因是最有效的药物之一。能抑制缺血心肌由折返激动所引起的室性心律失常。是治疗和预防心室颤动的首选药物。

③碳酸氢钠：纠正酸碱失衡必须保证充分的通气，在血气监测下使用更安全。

④阿托品：提高窦房结和房室结的自律性和传导性，可以抑制腺体分泌有助于改善通气。

2. 【问题】有乳突部淤血不是应该是颅后窝骨折吗？

【解答】

①颅前窝骨折：表现为眼睑青紫，眼结膜下出血，俗称“熊猫眼征”、“兔眼征”，鼻和口腔出血性脑脊液，可合并嗅神经和视神经损伤。

②颅中窝骨折：在耳后乳突区皮下出现淤血。脑脊液漏从外耳道流出，如鼓膜未破，则可沿咽鼓管入鼻腔形成鼻漏；有时骨折累及蝶骨也会出现脑脊液鼻漏。可损伤面神经和听神经。

③颅后窝骨折：在耳后及枕下部出现皮下瘀斑，脑脊液漏至胸锁乳突肌和乳突后皮下，偶有第 9~12 对脑神经损伤。

3. 【问题】破伤风抗毒素脱敏注射法？

【解答】脱敏注射法是给过敏试验阳性者分多次少剂量注射药液，以达到脱敏目的的方法。具体方法为：分 4 次，小剂量并逐渐增加，每隔 20 分钟肌肉注射 1 次，每次注射后均应密切观察。

破伤风抗毒素脱敏注射法

次数	TAT (ml)	加 0.9%氯化钠溶液 (ml)	注射法
1	0.1	0.9	肌肉注射
2	0.2	0.8	肌肉注射
3	0.3	0.7	肌肉注射
4	余量	稀释至 1ml	肌肉注射

4. 【问题】药液不足一毫升时如何取药？

【解答】药液不足 1ml、油剂、按滴计算的药液：应用滴管吸取药液。药杯内应先倒入少量

温开水，以免药液附着杯壁，影响剂量准确；滴药时应稍倾斜滴管，以保证药量准确，1ml 按 15 滴计算。

5. 【问题】护士与病人之间的距离有哪些？

【解答】1) 亲密区：指沟通双方距离小于 50cm，当护士在进行查体、治疗、安慰、爱抚时，与患者之间的距离。

2) 个人区：指沟通双方距离在 50~120cm 之间，人们与亲友交谈、护士与病人进行交谈时主要使用此区距离。

3) 社会区：指沟通双方距离在 120cm~4m 之间，在工作单位和社会活动时常用，如护士同事一起工作时或护士通知病人吃饭等。

4) 公众区：指沟通双方距离在 4m 以上，一般用于正式公开讲话中，如上课、开会等。