

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 53 期

1. 【问题】T 型管拔管指征？

【解答】T 型管拔管指征：置管时间一般为术后 2~3 周，在病人体温持续正常，饮食情况恢复，T 型管造影无异物，无残石，无狭窄，胆肠吻合口通畅，胆汁培养基本正常的情况下拔除 T 型管。拔管前应先间断夹闭 T 型管观察腹部体征与进食情况。拔管后要注意腹部及伤口敷料渗液情况。

2. 【问题】矢状缝与右斜颈一致，不应该是枕右前或者枕左后吗？

【解答】胎方位的左右方向，是按照母亲方向的左和右算的，不是您的左方和右方。胎头矢状缝与母体骨盆入口右斜径一致，说明胎方位为枕左前或枕右后位。

3. 【问题】原发性肾病综合征水肿的主要原因是什么？

【解答】水肿往往是肾病综合征病人最明显的体征。严重水肿的病人还可出现胸腔、腹腔、心包腔积液。低蛋白血症、浆胶体渗透压下降，使水分从血管腔内进入组织间隙，是病人出现水肿的主要原因。某些原发于肾内的钠、水潴留因素在水肿发生机制中也起一定作用。

4. 【问题】为什么甲亢手术患者出现手足抽搐时给予低磷饮食？

【解答】手足抽搐多发生在甲状腺手术后 1~3 天，由于甲状旁腺误伤、切除、或其血液供应受累所致，钙浓度下降（降至 2.0mmol/L）神经肌肉的应激性增高而出现此症状，发生此症状后，应限制含磷较高食物的摄入，以免影响钙的吸收。

5. 【问题】营养不良患儿皮下脂肪消耗顺序是？

【解答】皮下脂肪减少的顺序为：最先为腹部（皮下脂肪层厚度可作为判断营养不良程度的重要指标之一），其次为躯干、臀部、四肢，最后为面颊部。