



2020 年临床执业/助理医师二试点题密训班，新锐名师直播授课，[以题带点冲刺拔高>>](#)
班次方案地址：<https://m.med66.com/yishizigekaoshi/kaoshijingyan/mu2010121879.shtm>



临床执业医师全真模考试卷第一套第四单元

一、A1 题型

1. 过期流产致严重出血的原因不包括

- A. 胚胎组织机化粘连
- B. 发生凝血功能障碍
- C. 刮宫困难易穿孔
- D. 雌激素不足，子宫对缩宫素不敏感
- E. 绒促性素（hCG）缺乏

【正确答案】E

【答案解析】过期流产处理较困难。胎盘组织机化与子宫壁紧密粘连，致使刮宫困难。稽留时间过长，可能发生凝血功能障碍，导致弥散性血管内凝血，造成严重出血。另外处理前可

先给予雌激素以提高子宫肌层对缩宫素的敏感性。

本题知识点：病理妊娠-流产，

2.

关于流产，下列哪项是正确的

- A. 完全流产，有腹痛，宫口松
- B. 先兆流产，出血量少，宫口闭
- C. 不全流产，宫口闭，无出血
- D. 难免流产，宫口闭，出血少
- E. 稽留流产，胚胎死亡达 4 周以上未自然排出

【正确答案】B

【答案解析】完全流产无下腹痛，宫口闭；不全流产出血量多，宫口扩张或闭，扩张伴物体阻塞；稽留流产，又称过期流产，指胚胎或胎儿已死亡滞留宫腔内，未能及时自然排出。B 是正确的。

本题知识点：病理妊娠-流产，

3.

下列有关前置胎盘的发生的说法中，与之无关的是

- A. 妊娠高血压综合征
- B. 双胎妊娠
- C. 多次刮宫
- D. 胎盘面积过大
- E. 受精卵滋养层发育迟缓

【正确答案】A

【答案解析】前置胎盘病因目前尚不清楚，可能的因素有：子宫内膜病变或损伤（多次刮宫、分娩、子宫手术史等），是前置胎盘的高危因素；双胎妊娠时胎盘面积过大，前置胎盘发生率较单胎妊娠高 1 倍；受精卵滋养层发育迟缓等。

本题知识点：病理妊娠-前置胎盘，

4.

可以诊断胎儿窘迫的是

- A. 宫缩过强
- B. 胎动减弱
- C. 胎心监护见到早期减速
- D. 宫缩高峰时胎心 110 次/分
- E. 胎儿头皮血 pH 值为 7.18

【正确答案】 E

【答案解析】 A 选项：宫缩过强的表现对胎儿窘迫诊断特异性不强；B 选项：胎动减弱只是胎儿宫内缺氧的自测指标，需进一步行监护，甚至 OCT 检查，不能作为诊断依据；C 选项：早期减速见于宫缩时胎头被压；D 选项：不能说明为晚期减速，早期减速也可以出现；只有 E 选项为诊断依据，酸中毒：胎儿头皮血 PH < 7.35（正常值 7.25~7.35）。

本题知识点：病理妊娠-胎儿窘迫，

5.

下列哪项不是治疗先兆早产的药物

- A. β 肾上腺素能受体兴奋剂
- B. 前列腺素抑制剂
- C. 硫酸镁静脉滴注
- D. 大剂量盐酸哌替啶肌注
- E. 肌注苯甲酸雌二醇

【正确答案】 E

【答案解析】 先兆早产症状较轻，经去除原因和治疗后，妊娠尚可继续进行，治疗原则：卧床休息、抑制宫缩、镇静、促进胎肺成熟；抑制宫缩的药物有 β 肾上腺素能受体兴奋剂、硫酸镁、前列腺素抑制剂，盐酸哌替啶是较强的镇静剂，可在孕妇精神紧张时作为辅助用药，但临产后可能抑制新生儿呼吸，故临产后应忌用；苯甲酸雌二醇没有抑制宫缩的作用，反而增加子宫对催产素的敏感性。此外，外源性的雌激素对胎儿可能导致不良影响。

本题知识点：病理妊娠-早产，

6.

最易引发病理性缩复环的是

- A. 双胎妊娠
- B. 前置胎盘
- C. 重度胎盘早剥
- D. 重度子痫前期
- E. 嵌顿性肩先露

【正确答案】 E

【答案解析】病理性缩复环为先兆子宫破裂的临床表现之一。引起子宫破裂最常见的原因是梗阻性难产。故选 E。

本题知识点：分娩期并发症-子宫破裂，

7.

最常见的子宫肌瘤类型是

- A. 肌壁间肌瘤
- B. 浆膜下肌瘤
- C. 宫颈肌瘤
- D. 黏膜下肌瘤
- E. 阔韧带肌瘤

【正确答案】 A

【答案解析】肌壁间肌瘤最常见，占 60%~70%，浆膜下肌瘤约占 20%，黏膜下肌瘤约占 10%~15%。

本题知识点：女性生殖器官肿瘤-子宫肌瘤，

8.

下列关于黄体的说法错误的是

- A. 排卵后形成黄体

- B. 月经来潮后，黄体萎缩
- C. 受精后，月经黄体转变为妊娠黄体
- D. 黄体分泌雌激素和孕激素
- E. 黄体成熟后，循环中会出现孕激素的高峰

【正确答案】B

【答案解析】排卵后，黄体逐渐形成并成熟，循环中的雌、孕激素会随黄体的成熟出现分泌高峰。如果卵子没有受精，黄体会逐渐萎缩，循环中孕激素水平明显下降，从而月经来潮。如果受精，黄体会在 hCG 的刺激下发育成妊娠黄体，继续分泌甾体类激素，维持妊娠。

本题知识点：女性生殖系统生理，

9.

滴虫阴道炎的白带性状呈

- A. 黄绿色黏稠液
- B. 血性
- C. 稠厚豆渣样
- D. 稀薄黄绿色泡沫状
- E. 白色均匀稀薄

【正确答案】D

【答案解析】滴虫阴道炎白带增多，呈黄绿色稀薄泡沫状有臭味的分泌物。

本题知识点：女性生殖系统炎症-滴虫阴道炎，

10.

下列关于胎盘分泌激素的叙述，错误的是

- A. 在妊娠 8~10 周绒毛膜促性腺激素分泌达高峰
- B. 绒毛膜促性腺激素是一种糖蛋白激素
- C. 胎盘可分泌绒毛膜促性腺激素
- D. 胎盘分泌的雌激素主要为雌二醇
- E. 胎盘分泌的人绒毛膜生长素可促进胎儿生长

【正确答案】D

【答案解析】胎盘是妊娠期间重要的内分泌器官，可分泌多种激素。其中，人绒毛膜促性腺激素是一种糖蛋白，在妊娠 8~10 周分泌达高峰。人绒毛膜生长素可促进胎儿生长。雌激素中 90% 是雌三醇，雌酮和雌二醇很少。

本题知识点：妊娠生理，

11.

关于妊娠滋养细胞疾病，下列哪项是不恰当的

- A. 绒癌易发生肺转移
- B. 侵蚀性葡萄胎多发生在葡萄胎清除术后 6 个月内
- C. 侵蚀性葡萄胎和绒癌对化疗敏感
- D. 葡萄胎 2 次刮宫标本中，镜下见到蜕变绒毛即可诊断为侵蚀性葡萄胎
- E. 妊娠滋养细胞肿瘤不包括葡萄胎

【正确答案】D

【答案解析】侵蚀性葡萄胎镜检：子宫肌层内（侵蚀性葡萄胎和葡萄胎最重要的鉴别点为病变是否侵入肌层）查见绒毛结构或退化的绒毛阴影，滋养细胞增生、分化不良，故 D 不正确。

本题知识点：妊娠滋养细胞疾病-妊娠滋养细胞肿瘤，

12.

可以诊断子宫性闭经的检查项目是

- A. 雌激素试验阳性
- B. 孕激素试验阳性
- C. 垂体兴奋试验阴性
- D. 雌、孕激素序贯试验阴性
- E. 孕激素试验阴性

【正确答案】D

【答案解析】雌孕激素序贯试验仍无阴道流血，提示子宫内膜有缺陷或被破坏，可诊断为子宫性闭经。

本题知识点：生殖内分泌疾病-闭经，

13.

初产妇活跃期停滞是指进入活跃期后，宫颈口不再扩张超过

- A. 3 小时
- B. 3.5 小时
- C. 4 小时
- D. 4.5 小时
- E. 5 小时

【正确答案】C

【答案解析】活跃期停滞是指进入活跃期后，宫口不再扩张达 4 小时以上。

本题知识点：异常分娩-产力异常，

14.

反映胎儿皮肤成熟度的是

- A. 卵磷脂/鞘磷脂比值
- B. 淀粉酶值
- C. 胆红素类物质
- D. 含脂肪细胞出现率
- E. 肌酐值

【正确答案】D

【答案解析】羊水肌酐值 $>176.8 \mu\text{mol/L}$ ，提示胎儿肾成熟。羊水淀粉酶值 $>450\text{U/L}$ ，提示胎儿唾液腺成熟。羊水胆红素类物质 <0.02 ，提示肝成熟。羊水含脂肪细胞出现率达 20%，提示胎儿皮肤成熟。羊水卵磷脂/鞘磷脂比值 >2 ，提示胎儿肺成熟。

本题知识点：孕期监护与孕期保健，

15.

有关分娩机转的概念中，下列哪项是正确的

- A. 俯屈: 前囟位置下降最低
- B. 内旋转: 前囟转向母体前方
- C. 仰伸: 颈部紧贴胸部
- D. 外旋转: 胎头随肩胛的内旋转而外旋转以保持胎头与胎肩的垂直关系
- E. 衔接: 无论初产妇经产妇均在临产后衔接

【正确答案】D

【答案解析】俯屈时, 位置最低的不是前囟, 故 A 错; 内旋转是后囟转至母体前方, 故 B 错; 仰伸是颈部与胸部分开, 故 C 错; 经产妇多在分娩开始后胎头衔接, 部分初产妇在预产期前 1~2 周内抬头衔接, 故 E 错。

本题知识点: 正常分娩,

16.

关于卵巢性激素正确的是

- A. 孕激素使宫颈粘液分泌增加, 性状变稀薄
- B. 雄激素主要由颗粒细胞分泌, 促进乳房发育
- C. 孕激素有促进水钠储留作用, 雌激素则促进水钠排泄
- D. 雌激素使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜
- E. 孕激素可使基础体温在排卵后升高 0.3~0.5℃

【正确答案】E

【答案解析】孕激素可使基础体温在排卵后升高 0.3~0.5℃。

本题知识点: 女性生殖系统生理,

17.

妊娠合并心脏病常见的并发症不包括

- A. 心力衰竭
- B. 亚急性感染性心内膜炎
- C. 动脉栓塞
- D. 缺氧与发绀

E. 恶性心律失常

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠合并心脏病最常见的并发症包括: 心力衰竭、亚急性感染性心内膜炎、缺氧与发绀、恶性心律失常、静脉栓塞和肺栓塞。

本题知识点: 妊娠合并症-妊娠合并心脏病,

18.

应用高效孕激素和假孕疗法治疗子宫内膜异位症效果较差的是

A. 卵巢巧克力囊肿

B. 子宫直肠陷凹病灶

C. 膀胱的子宫内膜异位

D. 远处转移的子宫内膜

E. 子宫肌腺病

【正确答案】 E

【答案解析】 A、B、C、D 四项均为子宫内膜异位症, 药物治疗可以口服避孕药, 避孕药为低剂量高效孕激素和炔雌醇的复合片。长期连续服用避孕药 9 个月造成类似妊娠的人工闭经, 称假孕疗法。当子宫内膜腺体及间质侵入子宫肌层时, 称为子宫腺肌病。一般认为多次妊娠和分娩时子宫壁创伤和慢性子宫内膜炎可能是导致此病的主要原因。应用高效孕激素和假孕疗法效果较差。

本题知识点: 子宫内膜异位症和子宫腺肌病-子宫内膜异位症,

19.

下列不属于宫颈癌相关危险因素的是

A. 多个性伴侣

B. 吸烟

C. 未生育

D. 不洁性行为

E. 过早性生活

【正确答案】C

【答案解析】多产属于危险因素，未生育不属于。吸烟可增加感染 HPV 效应。

本题知识点：女性生殖器官肿瘤—子宫颈癌，

20.

新生儿期是指从出生脐带结扎至

- A. 足 7 天
- B. 足 16 天
- C. 足 28 天
- D. 足 33 天
- E. 足 60 天

【正确答案】C

【答案解析】自胎儿娩出脐带结扎开始至生后 28 天，称为新生儿期。发病率及死亡率高，尤以早期新生儿（生后第一周）最高。

本题知识点：儿科疾病绪论，

21.

脊髓灰质炎完成计划免疫后，第一次复种的时间为

- A. 7 岁
- B. 5 岁
- C. 2 岁
- D. 4 岁
- E. 6 岁

【正确答案】D

【答案解析】脊髓灰质炎计划免疫时间，2、3、4 月，复种时间为 4 岁。

本题知识点：儿童保健，

22.

关于小儿语言发育三个阶段, 正确的顺序是

- A. 发音、理解、表达
- B. 表达、理解、发音
- C. 理解、表达、发音
- D. 听觉、发音、理解
- E. 模仿、表达、理解

【正确答案】A

【答案解析】语言的发育要经过发音、理解、表达三个阶段。

本题知识点: 生长发育,

23.

萌出第一颗恒牙的时间一般为

- A. 5 岁左右
- B. 6 岁左右
- C. 7 岁左右
- D. 8 岁左右
- E. 9 岁左右

【正确答案】B

【答案解析】萌出第一颗恒牙的时间一般为 6 岁左右。

本题知识点: 生长发育,

24.

低出生体重新生儿的出生体重低于

- A. 1500g
- B. 1000g
- C. 2000g
- D. 2500g
- E. 800g

【正确答案】D

【答案解析】低出生体重儿：是指出生体重 $<2500\text{g}$ 的新生儿。极低出生体重儿（VLBW）是指出生体重 $<1500\text{g}$ 的新生儿。超低出生体重儿（ELBW）是指出生体重 $<1000\text{g}$ 的新生儿。

本题知识点：新生儿与新生儿疾病-概述，

25.

新生儿生理性黄疸的原因与以下哪项无关

- A. 红细胞量多，寿命短
- B. 肝脏 Y、Z 蛋白含量少
- C. 肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低下
- D. 肠道葡萄糖醛酸苷酶活性增高
- E. 胆道排泄胆红素的能力低下

【正确答案】E

【答案解析】红细胞量多，寿命短、肝脏 Y、Z 蛋白含量少、肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低下、肠道葡萄糖醛酸苷酶活性增高都会导致新生儿生理性黄疸。

本题知识点：新生儿与新生儿疾病-概述，

26.

小儿生理性贫血发生的时期是出生后

- A. 6 月内
- B. 2~3 月
- C. 4~5 月
- D. 7~8 月
- E. 1 个月内

【正确答案】B

【答案解析】胎儿红细胞寿限较短，红细胞破坏较多（生理性溶血）；加之婴儿生长发育迅速，血循环量迅速增加等因素，红细胞数和血红蛋白量逐渐减低，至生后 2~3 个月时红细胞数降至 $3.0 \times 10^{12}/\text{L}$ 左右，血红蛋白量降至 $100\text{g}/\text{L}$ 左右，出现轻度贫血，称为“生理性

贫血”。

本题知识点：新生儿与新生儿疾病-新生儿特点及护理，

27.

诊断缺铁性贫血铁减少期的敏感指标是

- A. 转铁蛋白饱和度
- B. 血清铁
- C. 血清铁蛋白
- D. 血红蛋白
- E. 总铁结合力

【正确答案】C

【答案解析】铁减少期（ID）：此阶段体内储存铁已减少，但供红细胞合成血红蛋白的铁尚未减少。血清铁蛋白（SF）：反映体内储铁情况，在缺铁 ID 期即已降低，是诊断缺铁 ID 期的敏感指标。

本题知识点：血液系统疾病-缺铁性贫血，

28.

观察铁剂治疗缺铁性贫血最先开始恢复

- A. 细胞内含铁酶活性
- B. 血清铁蛋白增加
- C. 血红蛋白上升
- D. 红细胞数上升
- E. 网织红细胞上升

【正确答案】A

【答案解析】给予铁剂治疗后如有效，则于 12~24 小时后细胞内含铁酶活性开始恢复，精神症状减轻，食欲好转。网织红细胞数于用药 2~3 天后开始升高，5~7 天达高峰，2~3 周后下降至正常。

本题知识点：血液系统疾病-缺铁性贫血，

29.

苯丙酮尿症最特殊的表现为

- A. 惊厥
- B. 湿疹性皮炎
- C. 智力落后
- D. 鼠尿味
- E. 毛发、皮肤变浅

【正确答案】D

【答案解析】苯丙酮尿症的临床表现主要是智能发育落后，最特殊的表现是尿液和汗液有鼠尿味。

本题知识点：遗传性疾病-苯丙酮尿症，

30.

最能反映小儿远期营养状态变化的指标是

- A. 体重
- B. 头围
- C. 身高
- D. 胸围
- E. 腹围

【正确答案】C

【答案解析】反映小儿近期营养状态的指标是体重，而远期用来描述营养状态的指标是身高。

本题知识点：营养和营养障碍疾病-蛋白质能量营养不良，

31.

蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪消失最后的部位是

- A. 腹部
- B. 自躯干

C. 面颊部

D. 臀部

E. 四肢

【正确答案】C

【答案解析】蛋白质-能量营养不良皮下脂肪减少或消失, 首选为腹部, 其次为躯干、臀部、四肢, 最后为面颊部。

本题知识点: 营养和营养障碍疾病-蛋白质能量营养不良,

32.

以下营养物质每克供能最高的是

A. 糖类

B. 脂类

C. 矿物质

D. 蛋白质

E. 膳食纤维

【正确答案】B

【答案解析】能量主要来源于糖类、脂类和蛋白质三大产能营养素, 每克可供能量分为 4、9、4。脂类供能最高。

本题知识点: 营养和营养障碍疾病-儿童营养基础,

33.

维生素 D 缺乏性佝偻病后遗症期的临床特征是

A. 血碱性磷酸酶升高

B. 易激惹、烦闹、多汗

C. 骨骼畸形

D. 长骨干骺端异常

E. 血磷、钙降低

【正确答案】C

【答案解析】佝偻病后遗症期多见于 3 岁以后小儿，临床症状消失，血生化及骨骼 X 线检查正常，仅遗留不同程度的骨骼畸形，轻、中度佝偻病治疗后很少留有骨骼改变。

本题知识点：营养和营养障碍疾病-维生素 D 缺乏性佝偻病，

34.

维生素 D 缺乏性手足搐搦症发生惊厥是由于血清中

- A. 钾离子浓度降低
- B. 钠离子浓度降低
- C. 氯离子浓度降低
- D. 钙离子浓度降低
- E. 磷离子浓度降低

【正确答案】D

【答案解析】多见于 1 岁内小儿，尤以 6 个月以内发病率最高，冬春季多见。主要由于维生素 D 缺乏，甲状旁腺代偿功能不足或其它多种因素的影响，致血中游离钙降低，使神经兴奋性增高，引起局部或全身肌肉抽搐。

本题知识点：营养和营养障碍疾病-维生素 D 缺乏性手足搐搦症，

35.

高位截瘫病人排尿障碍表现为

- A. 尿潴留
- B. 无尿
- C. 少尿
- D. 尿失禁
- E. 尿崩症

【正确答案】D

【答案解析】一般将第二胸椎以上的脊髓横贯性病变引起的截瘫称为高位截瘫，并有二便失禁现象—截瘫患者，脊髓排尿中枢受损，人的尿意不能传入，大脑对排尿的控制信息不能传出，于是出现患者自己不感到有尿，而出现不择时间和地点的排尿。

本题知识点：脊髓病变-脊髓压迫症，

36.

视神经脊髓炎急性期的主要药物治疗为

- A. 甲基强的松龙
- B. 阿司匹林
- C. 布洛芬
- D. 头孢曲松
- E. 巴氯芬

【正确答案】A

【答案解析】视神经脊髓炎急性期药物治疗以大剂量甲基强的松龙冲击治疗（每日 1000~1500mg，3~5 日）为主，之后依据患者情况逐渐减量，不推荐长期小剂量维持。皮质激素治疗效果差者，可考虑使用血浆置换（3~5 次）或静脉用免疫球蛋白 [IVIg，0.4g/（kg·d），5 日]。有效防治感染、发热、疼痛、尿潴留、压疮及坠积性肺炎。

本题知识点：脊髓病变-视神经脊髓炎，

37.

下列关于颅内压增高的临床表现不正确的是

- A. 头痛、呕吐、视盘水肿是颅内压增高的典型表现，称之为颅内压增高“三主征”
- B. 颅内压增高的三主征各自出现的时间一致
- C. 颅内压增高的三主征各自出现的时间并不一致，可以其中一项为首发症状
- D. 颅内压增高可引起一侧展神经麻痹和复视
- E. 颅内压增高可引起双侧展神经麻痹和复视

【正确答案】B

【答案解析】头痛、呕吐、视盘水肿是颅内压增高的典型表现，称之为颅内压增高“三主征”。颅内压增高的三主征各自出现的时间并不一致，可以其中一项为首发症状。颅内压增高还可引起一侧或双侧展神经麻痹和复视。

本题知识点：颅内压增高，

38.

枕骨大孔疝的临床表现不包括

- A. 尿崩
- B. 颈强直
- C. 呕吐
- D. 昏迷
- E. 双侧瞳孔大小多变

【正确答案】 A

【答案解析】枕骨大孔疝由于颅内压增高，可有剧烈头痛、喷射性呕吐，晚期可有意识障碍、昏迷等。脑疝时由于延髓下移，颈神经根受到牵拉，可出现颈强直。因脑干缺氧，瞳孔可忽大忽小。枕骨大孔疝不会出现尿崩，尿崩是下丘脑受损的表现。所以选 A。

本题知识点：脑疝-枕骨大孔疝，

39.

普通型和典型偏头痛二者的区别之一，在于后者一定有

- A. 神经系统检查无异常
- B. 畏光、畏声
- C. 恶心、呕吐
- D. 搏动性头痛
- E. 10~40 分钟先兆症状

【正确答案】 E

【答案解析】普通型偏头痛现已改称无先兆偏头痛，常表现为反复发作的一侧或双侧额颞部疼痛，可伴恶心呕吐、畏光、畏声、出汗等不适，但无先兆症状。典型偏头痛现已改称有先兆偏头痛，常表现为先兆症状→头痛+伴随症状→缓解。因此普通型和典型偏头痛的主要区别在于后者有先兆症状。除了 E 选项，其他症状，普通型和典型偏头痛均可有，故错误。

本题知识点：偏头痛，

40.

一种虚幻的知觉体验是

- A. 错觉
- B. 非真实感
- C. 幻觉
- D. 虚构
- E. 人格解体

【正确答案】C

【答案解析】虚幻的知觉体验首先提示这种症状属于知觉的异常。非真实感是患者感到周围环境不真实,属于感知综合障碍。人格解体属于患者的自我意识障碍,感到自己不存在或丧失了某种能力。虚构是一种记忆障碍。在这几个选项中,属于知觉障碍的症状只有错觉和幻觉。错觉是指对客观事物的歪曲知觉,即患者感知到的事物是客观存在的,有客观事物作用于患者的感官,这是对事物的感知出现了错误。而幻觉是患者所感知到的事物是客观不存在的,没有客观事物作用于患者的感官,是虚幻的知觉体验。

本题知识点: 神经病学概论-感觉系统,

41.1

岁以下正常婴儿可能出现的体征是

- A. 屈颈试验阳性
- B. Babinski 征阳性
- C. Kerning 征阳性
- D. 分离性感觉障碍
- E. 共济失调

【正确答案】B

【答案解析】Babinski 征属于病理反射,是最重要的锥体束受损害的体征,1岁以下的婴儿由于锥体束未发育成熟,因此 Babinski 征阳性。

本题知识点: 神经病学概论-脑神经,

42.

神经系统检查 Chaddock 征阳性提示

- A. 薄束损害
- B. 锥体束损害
- C. 脊髓丘脑束损害
- D. 楔束损害
- E. 皮质脑干束损害

【正确答案】 B

【答案解析】 Chaddock 征指的是用竹签由外踝下方向前轻划至足背外侧，阳性表现为踇趾背伸，余趾呈扇形展开。Chaddock 征属于病理反射，阳性提示锥体束损害。

本题知识点：神经病学概论-脑神经，

43.

侧卧位颅内压增高的临界值为

- A. 100mmHg
- B. 150mmHg
- C. 200mmHg
- D. 250mmHg
- E. 300mmHg

【正确答案】 C

【答案解析】 侧卧位脑脊液压力超过 200mmHg 称为颅内压增高。

本题知识点：神经病学概论-脑室系统与脑脊液，

44.

下列哪项不是分离（转换）性障碍的转换症状

- A. 分离（转换）性障碍性抽搐
- B. 分离（转换）性障碍性失明
- C. 分离（转换）性障碍性瘫痪
- D. 分离（转换）性障碍性失音
- E. 分离（转换）性障碍性遗忘

【正确答案】E

【答案解析】分离（转换）性障碍转换症状主要表现为躯体的功能障碍，可表现为运动、感觉、反射及自主神经功能障碍。常见表现有痉挛发作、肢体震颤、瘫痪、起立不能和步行不能、不言症和失音症、感觉过敏、感觉减弱或消失，以及特殊感官障碍，如分离（转换）性障碍性耳聋、失明和分离（转换）性障碍性呕吐、呃逆、过度换气等自主神经功能障碍。分离（转换）性障碍性遗忘属于分离症状，而非转换症状。

本题知识点：神经症性及分离（转换）性障碍-分离（转换）性障碍，

45.

强迫症的核心症状是

- A. 强迫性恐惧
- B. 强迫观念
- C. 强迫表象
- D. 强迫行为
- E. 强迫意向

【正确答案】B

【答案解析】强迫观念是强迫症表现的核心症状，最为常见。明知某些想法和表现，如强迫疑虑、强迫对立观念和穷思竭虑的出现是不恰当和不必要的，却引起紧张不安和痛苦，又无法摆脱。

本题知识点：神经症性及分离（转换）性障碍-强迫障碍，

46.

明显与心理因素相关的躯体疾病是

- A. 癔病
- B. 反应性精神病
- C. 疑病性神经症
- D. 疼痛
- E. 心身疾病

【正确答案】E

【答案解析】是一组发生发展与心理社会因素密切相关，但以躯体症状表现为主的疾病，主要特点包括：①心理社会因素在疾病的发生与发展过程中起重要作用；②表现为躯体症状，有器质性病理改变或已知的病理生理过程；③不属于躯体形式障碍。

本题知识点：应激相关障碍-急性应激障碍，

47.

吉兰-巴雷综合征危及患者生命的最主要的临床情况是

- A. 心肌炎
- B. 电解质紊乱
- C. 呼吸肌瘫痪
- D. 误吸
- E. 肺部感染

【正确答案】C

【答案解析】吉兰-巴雷综合征是一种自身免疫介导的周围神经病，主要损害脊神经根和周围神经，也常累及脑神经。首发症状多为肢体对称性迟缓性肌无力，严重病例可累及肋间肌和膈肌致呼吸肌麻痹，危及患者生命。

本题知识点：周围神经病-急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，

48.

急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病起病 1 周必有的症状是

- A. 四肢弛缓性瘫痪
- B. 肌肉萎缩
- C. 尿潴留
- D. 四肢手套袜套型感觉减退
- E. 脑脊液蛋白-细胞分离现象

【正确答案】A

【答案解析】多数患者病前 1~4 周可追溯到胃肠道或呼吸道感染症状以及疫苗接种史。急性或亚急性起病，出现肢体对称性弛缓性瘫痪，通常自双下肢开始，近端常较远端明显，多于数日至 2 周达到高峰。病情危重者在 1~2 日内迅速加重，出现四肢完全性瘫、呼吸肌和

吞咽肌麻痹，危及生命。如对称性瘫痪在数日内自下肢上升至上肢并累及脑神经，称为 Landry 上升性麻痹，腱反射减低或消失，发生轴索变性可见肌萎缩。

本题知识点：周围神经病-急性炎症性脱髓鞘性多发性神经痛，

二、A2 题型

1. 女，28 岁。停经 68 天，阵发腹痛伴多量阴道流血 1 天。妇科检查：子宫 6 周妊娠大小，宫口开，有血液不断流出，处理首选的是

- A. 立即清宫
- B. 按摩子宫
- C. 立即抗感染
- D. 输血
- E. 静点缩宫素待妊娠物自然排出

【正确答案】 A

【答案解析】根据题干信息，考虑不全流产的可能性较大，推测理由：已停经 68 天，至少 9 周+5 天，子宫才孕 6 周大小明显小于孕周，符合不全流产特点，其妊娠产物可能已部分排出体外，尚有部分残留于宫颈内。由于宫颈内残留部分妊娠产物，影响子宫收缩，致使流血持续不止，流血过多可发生休克。妇科检查发现宫颈口已扩张，不断有血液自宫颈口内流出，有时可见胎盘组织堵塞于宫颈口或部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内。一般子宫小于停经月份。处理：一经确诊，应及时行吸宫术或钳刮术，以清除宫腔内残留组织。流血多有休克者应同时输血输液，出血时间较长者，应给以抗生素预防感染。

本题知识点：病理妊娠-流产，

2.

患者女，30 岁，停经 40 天。阴道少量不规则出血一周。平素月经规则 5/28 天。已婚未孕。查体一般情况好，妇科检查：左附件压痛，余查体 (-)。尿妊娠试验 (+)，B 超检查示：子宫正常大，宫腔线清晰，宫内未见胎囊，子宫左后方包块 (3.2cm×3.5cm×2.0cm)，应如何处理

- A. 化疗
- B. 中医治疗

- C. 暂观察，待有明显腹腔内出血时急诊剖腹探查
- D. 腹腔镜下手术
- E. 剖腹探查，切除右附件

【正确答案】D

【答案解析】宫外孕的治疗原则：手术治疗为主，其次是非手术治疗。手术方式有切除患侧输卵管和保留输卵管的保守性手术。后者适用于有生育要求的年轻妇女，而经腹腔镜进行手术，可减少粘连，效果更好。因此，D 处理更合适。

本题知识点：病理妊娠-异位妊娠，

3.

女，29 岁，结婚 5 年未孕，经量减少 2 年，伴下腹坠胀，既往肺结核史，妇科检查子宫后倾屈，活动受限，形状不规则。双附件区可触及形状不规则包块，质硬，表面不平，下列哪项无助于诊断

- A. 腹部 X 线摄片
- B. 诊断性刮宫
- C. 宫腔分泌物结核菌素培养
- D. 子宫输卵管碘油造影
- E. 基础体温测定

【正确答案】E

【答案解析】基础体温测定是用于判断有无排卵的一项指标，对病进一步评估和病因诊断没有帮助。

本题知识点：不孕症与辅助生殖技术，

4.47

岁，妇女，患 II 度子宫脱垂伴阴道前后壁明显膨出，2 个月前患乙型肝炎住院治疗 50 天，现来院咨询避孕方法，应选用

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药

- C. 安全期避孕
- D. 外用避孕药膜
- E. 男用阴茎套

【正确答案】E

【答案解析】患Ⅱ度子宫脱垂伴阴道前后壁明显膨出，故不能用宫内节育器。患乙型肝炎，故不能用口服避孕药，也不能用输卵管结扎。安全期避孕失败率高，不提倡。外用避孕药膜不作为避孕首选。故选E，既能避孕，又能防止疾病传播。

本题知识点：计划生育-计划生育方法的知情选择，

5.

女，65岁，绝经10年，阴道流血伴流液3个月就诊，行分段诊刮，诊断为子宫内膜癌Ⅰ期，首选治疗方案为

- A. 放射治疗
- B. 化疗
- C. 筋膜外全子宫切除加双侧附件切除术
- D. 扩大子宫全切术及双附件切除术
- E. 子宫广泛切除术及盆腔淋巴结清扫术

【正确答案】C

【答案解析】子宫内膜癌Ⅰ期患者应行筋膜外子宫切除加双侧附件切除术，记忆题。

本题知识点：女性生殖器官肿瘤-子宫内膜癌，

6.24

岁初孕妇，末次月经2000年3月10日。于2000年10月13日就诊，检查宫底在脐上2横指，枕右前位，胎心率正常。现在应是

- A. 妊娠满30周，宫底高度低于正常
- B. 妊娠满30周，宫底高度符合正常
- C. 妊娠满31周，宫底高度低于正常
- D. 妊娠满31周，宫底高度高于正常

E. 妊娠满 35 周, 宫底高度低于正常

【正确答案】C

【答案解析】妊娠时间通常以孕妇末次月经第一日计算, 全过程约为 280 日, 以 4 周 (28 日) 为一个妊娠月。三月份是 31 天, 孕妇末次月经 3 月 10 日, 三月份 21 天, 四月份 30 天, 五月 31 天, 六月 30 天, 七月 31 天, 八月 31 天, 九月 30 天, 十月 13 天, 总共 217 天, 除以 7, 得出 31 周。28 周末应该是脐上三横指, 本题孕 31 周才脐上两横指, 是宫底低于正常。

本题知识点: 妊娠诊断,

7.

女, 29 岁。体型肥胖, 婚后 2 年未孕, 月经周期 45~60 天, 月经量少, 血 LH/FSH>2, 该患者的内分泌特征不包括

- A. 高雄激素血症
- B. 胰岛素抵抗
- C. 雌酮/雌二醇比例倒置
- D. 高孕激素血症
- E. 高胰岛素血症

【正确答案】D

【答案解析】多囊卵巢综合征的内分泌特征包括: LH 与 FSH 分泌异常、高雄激素血症、胰岛素抵抗与高胰岛素血症、雌酮/雌二醇比例倒置。

本题知识点: 生殖内分泌疾病-多囊卵巢综合征,

8.30

岁, 女性, 产后 8 个月, 月经周期缩短, 妇科检查无异常。基础体温曲线呈双向型, 考虑其月经紊乱为

- A. 早期妊娠
- B. 无排卵型功血
- C. 黄体功能不足
- D. 子宫内膜不规则脱落

E. 不能确定诊断

【正确答案】C

【答案解析】基础体温曲线呈双向型表明存在排卵。患者产后，易有神经内分泌调节功能紊乱，结合其表现为月经周期缩短、月经频发，考虑为黄体功能不全。黄体功能不足指有卵泡发育及排卵，但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退，导致子宫内膜分泌反应不良。病理表现为子宫内膜受孕激素的影响不足，分泌期内膜腺体呈分泌不良，间质水肿不明显，或腺体与间质发育不同步。子宫内膜活检显示分泌反应落后 2 日以上。

本题知识点：生殖内分泌疾病-功能失调性子宫出血，

9.

女，15 岁，12 岁月经初潮。月经周期紊乱，经期长短不一已有 1 年。肛门检查：子宫发育正常，双侧附件 (+)，最可能的诊断是

- A. 黄体功能不全
- B. 黄体萎缩不全
- C. 无排卵性功能失调性子宫出血
- D. 子宫黏膜下肌瘤
- E. 子宫内膜息肉

【正确答案】C

【答案解析】月经周期紊乱，经期长短不一已有 1 年，双侧附件 (-)，考虑患者为青春期末排卵性功血。

本题知识点：生殖内分泌疾病-功能失调性子宫出血，

10.

初产妇，30 岁，妊娠 39 周，分娩过程中自觉下腹部持续剧痛，拒按，烦躁不安。产科检查下腹部压痛，胎位触不清，胎心不规律，宫口停止扩张，胎先露部下降停止。诊断为“高张性宫缩乏力”。下列处置不正确的是

- A. 处理原则是调节子宫收缩，恢复正常节律及其极性
- B. 立即静脉注射缩宫素
- C. 若无胎儿窘迫征象，可给予强镇静剂

- D. 若不协调宫缩已被控制，但宫缩仍弱，可静脉滴注缩宫素
- E. 经上述处理未能得到纠正者，均应行剖宫产术

【正确答案】B

【答案解析】首先应停止一切阴道内操作及停用缩宫素，且在宫缩恢复协调性之前，严禁应用缩宫素。

本题知识点：异常分娩-产力异常，

11.

初产妇，26岁。会阴侧切分娩体重3400g健康男婴，其正常产褥期的临床表现是产后

- A. 24小时体温38.2℃
- B. 第1天宫底达脐下3指
- C. 白细胞总数一般于5周后恢复正常
- D. 浆液性恶露持续5日
- E. 产后72小时内，产妇循环血量增加15%~25%

【正确答案】E

【答案解析】产妇产后体温一般不升高，如产程延长致过度疲劳时，在产后24小时内体温可略升高，但不超过38℃，故A错误；产后第1日子宫底稍上升平脐，故B错误；白细胞总数一般于1~2周恢复正常，故C错误；浆液性恶露持续10日左右，故D错误；产后72小时内，产妇循环血量增加15%~25%，应注意预防心衰的发生，故E正确。

本题知识点：正常产褥，

12.

女，30岁，人工流产术后闭经7个月，无腹痛，既往月经规律，尿妊娠试验阴性，基础体温双相型，最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. Sheehan 综合征
- C. 闭经-溢乳综合征
- D. 空蝶鞍综合征

E. 多囊卵巢综合征

【正确答案】A

【答案解析】人工流产后宫颈或宫腔黏连称为 Asherman 综合征,是由于刮宫时损伤宫颈管黏膜或子宫内膜基底层,肌层,局部创面形成而致黏连。

本题知识点: 生殖内分泌疾病-闭经,

13.

初孕妇, 25 岁。妊娠 14 周, 少量阴道流血 1 天。妇科检查: 阴道少量暗红色血液, 宫口未开, 子宫大小与孕周相符。该患者最可能的诊断是

A. 早期流产

B. 难免流产

C. 先兆流产

D. 稽留流产

E. 不全流产

【正确答案】C

【答案解析】先兆流产: 妊娠 28 周前先出现少量阴道流血, 无妊娠物排出, 随后出现阵发性下腹痛。妇科检查宫口未开, 胎膜未破, 子宫大小与停经周数相符。妊娠早期出现的阴道少量出血, 时下时止, 伴有轻微下腹痛和腰酸的一种疾病。可能导致流产, 也有可能经过适当治疗后继续妊娠。

本题知识点: 病理妊娠-流产,

14.

女, 25 岁阴道分泌物增多 5 天, G₂P₂, 妇科检查: 阴道分泌物呈灰白色, 稀薄状, 有腥臭味, 阴道黏膜无明显充血, 支持该疾病诊断的检查结果是

A. 阴道分泌物 pH < 4.5

B. 胺臭味试验阴性

C. 阴道分泌物镜检可见阴道毛滴虫

D. 线索细胞阳性

E. 阴道分泌物镜检白细胞较多

【正确答案】D

【答案解析】线索细胞是指阴道脱落上皮细胞上粘附大量加特纳杆菌等厌氧菌的一种形态表现, 阴道分泌物中出现大量线索细胞, 一般预示患了细菌性阴道病。

本题知识点: 女性生殖系统炎症-细菌性阴道病,

15.60

岁妇女, 孕3产3, 阴道脱出一物3年, 腰骶部疼痛半年, 妇科检查: 宫颈及宫体全部脱出阴道口, 阴道前后壁有小溃疡, 有效的治疗办法是

A. 继续观察

B. 补充雌激素

C. 手术治疗

D. 卧床休息

E. 应用子宫托

【正确答案】C

【答案解析】患者腰骶部疼痛, 且有溃疡形成, 应行手术治疗: 目的是消除症状, 修复盆底支持组织。应根据患者年龄、脱垂分度、生育要求、全身健康状况选择手术方式, 主要包括盆底重建手术(自身组织或网片置入手术)和阴道封闭手术。

本题知识点: 女性生殖器损伤性疾病-子宫脱垂,

16.

女, 30岁。月经不规律, 自测基础体温高温相已持续22天, 宫颈黏液涂片结果显示典型椭圆小体。该患者处于

A. 月经前期

B. 排卵后期

C. 接近排卵期

D. 早孕期

E. 月经期

【正确答案】D

【答案解析】宫颈黏液检查：宫颈黏液量少、黏稠，涂片干燥后光镜下见排列成行的椭圆体，高温相已持续 2 天，早期妊娠的可能性大。

本题知识点：女性生殖系统生理，

17.

男婴，11 个月。发热 4 天，体温持续在 38℃~39.6℃，1 天前手掌发现疱疹，今晨脚掌也发现疱疹，随后就诊来院。住院医师根据临床表现，初步判断手足口病。关于小儿重症手足口病的病原体多为

- A. 轮状病毒
- B. 人疱疹病毒 6 型
- C. 肠道病毒 71 型
- D. 柯萨奇病毒 A 组 16 型
- E. 埃可病毒

【正确答案】C

【答案解析】手足口病是由多种肠道病毒（EV）感染引起的急性发疹性传染病，常见的病原包括肠道病毒 71 型（EV71）、柯萨奇病毒 A 组 16 型以及埃可病毒的某些血清型。由 EV71 型感染引起的重症病例比例较大。

本题知识点：感染性疾病—常见发疹性疾病，

18.

男孩，9 岁。眼睑水肿伴少尿 3 天。茶色尿 1 天。病前 3 周曾患皮肤脓肿，疮疮。查体 P 110 次/分，BP 130/90mmHg。肝右肋下 1cm，压痛（+），双下肢明显非凹陷性水肿。针对该疾病多见的病原体，下列疾病跟该患儿同病原体的疾病为

- A. 疱疹性咽峡炎
- B. 咽结合膜热
- C. 猩红热
- D. 假膜性小肠结肠炎
- E. 幼儿急疹

【正确答案】C

【答案解析】患者有皮肤感染的征象，然后出现出现眼睑水肿，少尿，下肢水肿，考虑是急性肾小球肾炎，绝大多数是A组乙型溶血性链球菌。风湿热和猩红热的常见病原体都为该病原体。

本题知识点：感染性疾病-常见发疹性疾病，

19.

男孩，4岁。发热2天，皮疹1天，伴咽部疼痛。查体：T 39.2℃，全身皮肤弥漫性充血，伴密集针尖大小丘疹，咽红，扁桃体Ⅱ度肿大，可见少许渗出。血常规：Hb 135g/L，WBC $12.6 \times 10^9/L$ ，N 0.65，Plt $250 \times 10^9/mg/L$ ，CRP 15mg/L。最可能的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 水痘
- C. 猩红热
- D. 麻疹
- E. 丘疹样荨麻疹

【正确答案】C

【答案解析】猩红热临床表现 1. 发热多为高热，伴头痛、乏力、全身不适等。2. 咽峡炎咽部、扁桃体充血、肿胀，表面有脓性渗出物。3. 皮疹多在发热后第2日出现，始于耳后、颈部及上胸部，迅速波及全身。皮疹特点为针尖大小的充血性皮疹，压之褪色，触之有砂纸感，疹间无正常皮肤，有痒感。肘窝、腹股沟等处皮疹密集，易摩擦出血呈紫红色线状，称为帕氏线。面部仅有充血而无皮疹，口鼻周围充血不明显，相比之下略显苍白，称为“口周苍白圈”。病初舌被覆白苔，3~4日后白苔脱落，舌乳头红肿突起，称为“杨梅舌”。皮疹于48小时达高峰，持续一周左右，按出疹顺序消退伴脱皮。躯干为糠皮样脱屑，手掌足底可见大片状脱皮，呈“手套”、“袜套”状，无色素沉着。

本题知识点：感染性疾病-常见发疹性疾病，

20.

女孩，5岁。发热伴咳嗽2天，加重伴呼吸困难1天。自服抗生素治疗。查体：T 39℃，嗜睡，精神反应差，躯干可见散在脓疱疹，呼吸急促，双肺可闻及散在中、小水泡音。实验室

检查：血 WBC $20 \times 10^9/L$ ，N 0.80，L 0.12。该患儿最可能的诊断是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 肺炎衣原体肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

【正确答案】A

【答案解析】患儿全身中毒症状严重，伴有呼吸困难，皮肤有散在的脓疱疹，白细胞高，考虑是金黄色葡萄球菌肺炎。肺炎支原体肺炎以刺激性咳嗽为主。呼吸道合胞病毒肺炎主要以喘憋为主。

本题知识点：呼吸系统疾病-肺炎

21.

患儿，男性，2岁，出现发热，咽部红肿，两侧滤泡性眼结膜炎，颈部淋巴结肿大。就诊医院考虑是咽结合膜热。关于咽-结合膜热的叙述错误的是

- A. 秋冬季节发病
- B. 在幼托机构流行
- C. 发热、咽炎、结合膜炎
- D. 病程 1~2 周
- E. 腺病毒 3, 7 型所致

【正确答案】A

【答案解析】咽结合膜热：病原为腺病毒 3、7 型，常发生于春夏季。以发热、咽炎、结膜炎为特征，可散发或发生小流行。多呈高热，咽痛，眼部刺痛，咽部充血，一侧或两侧滤泡性眼结膜炎，可伴球结膜出血。颈部、耳后淋巴结肿大，有时有胃肠道症状。病程 1~2 周。

本题知识点：呼吸系统疾病-急性上呼吸道感染

22.

女孩，10岁。反复呕吐4天，突发抽搐1次，食欲差，精神萎靡，肾病综合征病史半年余，长期低盐饮食。该患儿可能合并

- A. 颅内感染
- B. 脑血栓形成
- C. 低钙血症
- D. 肾静脉血栓
- E. 低钠血症

【正确答案】 E

【答案解析】 肾病综合征患儿除少数显著的水肿、严重高血压有时需要短期限盐外，应鼓励尽量正常饮食，不可长时间低盐、甚至无盐饮食，以防出现低钠血症。

本题知识点：泌尿系统疾病-肾病综合征，

23.

新生儿，23天。发热3天，查体：T39℃，精神差，前囟饱满，脐部可见脓性分泌物。对诊断最有意义的检查是

- A. 血常规+CRP
- B. 头颅CT
- C. 血电解质
- D. 血降钙素原
- E. 血培养+脑脊液

【正确答案】 E

【答案解析】 脐部少许脓性分泌物，考虑该患儿由于脐部感染，细菌血行播散，引起化脓性脑膜炎，检查最有意义的是脑脊液检查（可找到致病菌）。

本题知识点：神经系统疾病-化脓性脑膜炎，

24.

女孩，1岁，因为正常体格检查，发现该小儿，身高为75cm。关于小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 婴儿期
- B. 胚胎期

C. 学龄前期

D. 学龄期

E. 青春期

【正确答案】A

【答案解析】小儿生长发育有两个高峰 婴儿期和青春期。其中以婴儿期生长发育最为迅速。

本题知识点: 生长发育,

25.

婴儿体重 4kg, 前囟 $1.5 \times 1.5\text{cm}$, 后囟 0.2cm , 能微笑, 头不能竖立, 最可能的月龄是

A. 7 天内

B. 1~2 个月

C. 3~4 个月

D. 4~5 个月

E. 5~6 个月

【正确答案】B

【答案解析】体重 4kg, 头不能竖立, 考虑小于 3 个月, 且能微笑, 最可能的月龄为 1~2 个月。

本题知识点: 生长发育,

26.

女, 3 个周。生后 1 周后间断呕吐, 呕吐物为奶液, 体重增长不满意。查体 可见胃蠕动波, 右上腹触及包块。最可能的诊断是

A. 先天性巨结肠

B. 胃食管反流

C. 幽门痉挛

D. 胃扭转

E. 先天性肥厚性幽门狭窄

【正确答案】E

【答案解析】患儿生后 1 周出现呕吐，可见胃蠕动波，右上腹触及包块，这是先天性肥厚性幽门狭窄的特有体征。

本题知识点：消化系统疾病-先天性巨结肠，

27.

女婴，10 个月。腹泻 5 天，约 9 次/日，呈稀水样，伴呕吐，每天 2~3 次，尿量减少。查体：皮肤干，弹性差，眼窝、前囟凹陷，心音低钝。最重要的处理措施是

A. 纠正水电解质紊乱

B. 给予止吐药

C. 控制感染

D. 使用止泻药物

E. 给予肠道微生态制剂

【正确答案】A

【答案解析】患儿诊断为小儿腹泻病，出现腹泻、呕吐，会导致电解质紊乱，最重要的处理措施是补充液体，纠正水电解质紊乱。

本题知识点：消化系统疾病-小儿腹泻病，

28.

女婴，9 个月，腹泻 3、4 天，大便每天 10 余次，呈稀水样，伴呕吐，每天 2~3 次。查体：皮肤稍干，弹性差，心音低钝，入院时最重要的处理是

A. 控制感染

B. 纠正水、电解质紊乱

C. 给肠道微生态制剂

D. 给止吐药

E. 给肠黏膜保护剂

【正确答案】B

【答案解析】患儿已经出现轻度脱水的表现，所以入院后最重要的就是纠正水电解质紊乱。

本题知识点：消化系统疾病-小儿腹泻病，

29.

男孩，2岁。生长落后，智能发育落后，刚会站立，不会走。查体：身长70cm，表情呆滞，眼距宽，鼻梁低平，眼外眦上斜，四肢短，手指粗短，小指内弯，四肢肌张力低下，最可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 苯丙酮尿症
- C. 21-三体综合征
- D. 蛋白质-能量营养不良
- E. 维生素D缺乏性佝偻病

【正确答案】C

【答案解析】21-三体综合征患儿的主要特征为智能低下，特殊面容和生长发育迟缓，并可伴有多种畸形。

本题知识点：遗传性疾病-21-三体综合征，

30.2

岁小儿，智力发育落后，曾有惊厥发作5次，皮肤白，头发色浅，汗液有鼠尿臭味，考虑诊断为苯丙酮尿症。典型苯丙酮尿症体内苯丙氨酸积聚是由于

- A. 四氢生物蝶呤缺乏
- B. 酪氨酸羟化酶缺乏
- C. 谷氨酸羟化酶缺乏
- D. 羟苯丙酮酸氧化酶缺乏
- E. 苯丙氨酸羟化酶缺陷

【正确答案】E

【答案解析】典型PKU（绝大多数PKU为此型）由于肝细胞缺乏苯丙氨酸-4-羟化酶（PAH）不能将苯丙氨酸转化为酪氨酸，因此，苯丙氨酸在血、脑脊液、各种组织和尿液中的浓度极高，同时产生大量苯丙酮酸、苯乙酸、苯乳酸和对羟基苯乙酸等旁路代谢产物自尿中排出，高浓度的苯丙氨酸及其旁路代谢产物导致脑细胞损伤。

本题知识点：遗传性疾病-苯丙酮尿症，

31.

患儿，15 岁，每天摄入能量比较多，喜吃甜食，睡觉前有吃宵夜的习惯，现在入小学，由于肥胖，被同学讥笑，不愿上学。根据肥胖的分度，轻度肥胖的小儿体重为超过同性别同身高正常儿均值的

- A. 20%~29%
- B. 30%~39%
- C. 40%~49%
- D. 50%~59%
- E. 10%~19%

【正确答案】A

【答案解析】体重超过同性别、同身高均值的 10%~19%为超重，体重超过 20%~29%为轻度肥胖；体重超过 30%~49%为中度肥胖；体重超过 50%为重度肥胖。

本题知识点：营养和营养障碍疾病-单纯性肥胖症，

32.3

岁半男孩，有方颅，肋骨串珠，“O”形腿。精神与睡眠尚可，血清钙 2.4mmol/L 血清磷 1.1mmol/L，碱性磷酸酶 10 布氏单位，诊断为

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 呆小病

【正确答案】D

【答案解析】根据患儿 3 岁半，有方颅，肋骨串珠，“O”形腿，考虑为佝偻病后遗症期。

本题知识点：营养和营养障碍疾病-维生素 D 缺乏性佝偻病，

33.

某山区村医，接诊一癫痫患者，因诊疗条件有限无法判定癫痫的类型，在下列药物中应考虑

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 卡马西平
- D. 丙戊酸钠
- E. 苯巴比妥

【正确答案】D

【答案解析】丙戊酸钠是广谱的抗癫痫药，可以用于全面性发作和部分性发作，对各型癫痫都有一定的效果故优先选择。

本题知识点：癫痫，

34.

某癫痫病人，既往有服用癫痫药物史，本次来院诉其所服用的药物催眠作用太强，希望医师能换一种既能在癫痫发作时既能控制症状，又无较强催眠作用的药物，作为住院医师你考虑

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
- D. 扑米酮
- E. 以上都不是

【正确答案】B

【答案解析】苯妥英钠为抗癫痫药、抗心律失常药，治疗剂量不引起镇静催眠作用。与之容易混淆的是C苯巴比妥，属于镇静催眠药，具有镇静、催眠、抗癫痫及抗惊厥作用。

本题知识点：癫痫，

35.

男，35岁。外伤后致双下肢瘫痪。查体：双上肢肌张力和肌力正常，双下肢肌力2级，双侧膝、踝反射亢进。其受损的部位是

- A. 腰段脊髓

- B. 胸段脊髓
- C. 传入神经元
- D. 前角细胞
- E. 颈段脊髓

【正确答案】B

【答案解析】上肢肌由颈丛支配，颈丛由 $C_5\sim 8$ 和 T_1 的前支组成。本例双上肢肌张力和肌力正常，说明颈丛未受损，且受损部位在 T_1 以下。膝反射的中枢在 $L_2\sim 4$ ，踝反射中枢在 $S_1\sim 2$ ，本例双侧膝、踝反射亢进，此为上运动神经元受损的表现，说明本例受损部位在 L_2 以上、 T_1 以下。

本题知识点：脊髓病变-脊髓压迫症，

36.

患者女性，入院诊断为 Devic 病，该疾病的主要累及部位是

- A. 脑神经和脊髓
- B. 视神经和脊髓
- C. 三叉神经和面神经
- D. 三叉神经和视神经
- E. 面神经和脊髓

【正确答案】B

【答案解析】视神经脊髓炎也叫 Devic 病。是一种独特的中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病，主要累及视神经和脊髓，导致严重的神经功能损害。

本题知识点：脊髓病变-视神经脊髓炎，

37.

年轻的张某是某单位的干部，告诉医生自己在饭厅吃饭觉得菜很淡，想拿酱油，但别人先拿走了；想喝水时，就有人即去倒水，认为别人了解自己的想法。该症状是

- A. 超价观念
- B. 罪恶妄想

C. 夸大妄想

D. 嫉妒妄想

E. 思维被洞悉妄想

【正确答案】E

【答案解析】思维被洞悉妄想，或称内心被揭露感，患者认为其内心所做的事，未经语言文字表达而被周围人所洞悉。该症状常常与关系妄想或其他妄想及幻觉（幻听）等同时存在。该患者通过一些偶然的事情就认为别人了解自己的想法，是思维被洞悉妄想的表现，选 E。

本题知识点：精神分裂症，

38.24

岁女性，病程 6 年，说有人要害他，常自笑，好追求异性，有时打人摔东西，话多内容零乱，精神检查：意识清晰，兴奋多语，思维松弛，主动接触异性，有被害妄想及非血统性妄想，活动增多而无目的性，躯体及神经系统检查未见症状，该患者诊断为

A. 精神分裂症

B. 情感障碍（躁狂相）

C. 脑器质性精神障碍

D. 人格障碍

E. 躯体疾病所致精神障碍

【正确答案】A

【答案解析】精神分裂症是一种严重的精神疾病。一般来说，十五岁到二十岁是最常发病的年龄。它主要的症状包括思考、知觉、情感、行为等多方面之广泛障碍。在发病之初，病人可能出现成绩或工作表现一落千丈、社交退缩、个人卫生习惯不良等前兆，在潜伏期阶段，若未予以适当的处置，病情便会更加恶化，而衍生出幻觉（看到或听到一些不存在的刺激）、妄想（脑海中坚信一个不合理、脱离现实的信念）、语无伦次、行为怪异等症状。

本题知识点：精神分裂症，

39.

患者男性，45 岁，因近期家人感觉不对劲，与该患者来医院就诊，王医生在询问相关情况

- A. 强迫思维
- B. 强制性思维
- C. 思维插入
- D. 思维迟缓
- E. 思维散漫

【正确答案】D

【答案解析】思维迟缓是指联想抑制，联想速度减慢、数量的减少和困难。患者表现言语缓慢、语量减少，语音甚低，反应速缓。患者自觉脑子变笨，反应慢，思考问题困难。患者感到“脑子不灵了”、“脑子迟钝了”，多见于抑郁症。

本题知识点：精神障碍-概述，

40.

某精神科医师检查一患者，发现其言语缓慢，语量减少，语声甚低，应优先考虑下述哪种疾病

- A. 强迫性思维
- B. 思维奔逸
- C. 联想散漫
- D. 思维中断
- E. 思维迟缓

【正确答案】E

【答案解析】思维迟缓即联想抑制，患者联想速度减慢，数量减少和困难，表现为言语缓慢，语量减少，语声甚低，自觉脑子变笨，反应慢，思考问题困难。

本题知识点：精神障碍-症状学，

41.

男，28岁，枕部着地，昏迷5分钟后清醒，并自己回到家中，其后出现头痛并逐渐加重伴呕吐，1小时后不省人事，急送医院。查体：BP160/90mmHg，脉率65次/分，呼吸15次/分。浅昏迷，右枕部头皮挫伤，左侧瞳孔4mm，对光反射消失；右侧瞳孔2.5mm，对光射存在。最可能的诊断是

- A. 颅脑肿瘤
- B. 颅内血肿
- C. 脑梗塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑挫伤

【正确答案】B

【答案解析】中间清醒期是指受伤当时昏迷，数分钟或数小时后意识障碍好转，甚至完全清醒。继而因为硬膜外血肿的形成，脑受压引起再度昏迷。

本题知识点：颅脑损伤-颅内血肿，

42.

王大叔，55岁，高血压患者，爬山时突发一侧肢体无力，3小时后偏瘫。CT可见基底核出现大面积高密度影，中线压迫移位。可能的诊断为

- A. 高血压脑病
- B. 脑转移瘤
- C. 脑血栓形成
- D. 脑出血
- E. 脑栓塞

【正确答案】D

【答案解析】高血压患者出现偏瘫应首先考虑出现脑血管病变，不选A、B；脑血栓通常在安静状态下发病，脑出血通常于剧烈活动血压升高时发病，故初步诊断为脑出血，CT可见基底核出现大面积高密度影，中线压迫移位，为脑出血表现，故选择D。

本题知识点：脑血管疾病-脑出血，

43.

某高血压患者，一天前因与人争吵，随后出现意识障碍，呈进行性加重，收住入院后，第二天上午查房中主任医师提问：高血压脑出血最常累及的前三种血管排序是

- A. 豆纹动脉、大脑后动脉丘脑支、基底动脉脑桥支

- B. 豆纹动脉、基底动脉脑桥支、大脑后动脉丘脑支
- C. 大脑中动脉、大脑后动脉丘脑支、基底动脉脑桥支
- D. 大脑中动脉、豆纹动脉、基底动脉脑桥支
- E. 室管膜下动脉、基底动脉脑桥支、大脑后动脉丘脑支

【正确答案】B

【答案解析】高血压性脑出血按照最常累及的脑血管依次排序是：豆纹动脉>基底动脉脑桥支>大脑后动脉丘脑支。

本题知识点：脑血管疾病-脑出血，

44.

男，70岁，因观看足球比赛突然晕倒而入院治疗。查体发现左侧上、下肢瘫痪，伸舌时舌头偏向左侧。左半身深、浅感觉消失。双眼左侧半视野缺失，瞳孔对光反射存在。考虑病变的部位在

- A. 左侧中央前、后回
- B. 右侧中央前回
- C. 左侧内囊
- D. 右侧内囊
- E. 右侧中央后回

【正确答案】D

【答案解析】患者表现为三偏，考虑为内囊损伤。偏瘫：病变脑组织对侧肢体瘫痪。偏身感觉障碍：病灶对侧肢体感觉减退或消失。偏盲：病灶对侧同向偏盲，比如病灶在右侧内囊，则左眼外侧一半及右眼内侧一半看不见。

本题知识点：神经病学概论-运动系统，

45.

小王无眩晕、无听力障碍且肌力完好，但却出现左上肢指鼻试验不正确和轮替动作差、左下肢跟膝胫试验差。病损部位在

- A. 小脑蚓部

- B. 右侧小脑半球
- C. 左侧小脑半球
- D. 左侧脑桥前庭神经核
- E. 右侧脑桥前庭神经核

【正确答案】 C

【答案解析】 此题的考点是小脑损害的临床表现。当一侧小脑半球病变时，表现为同侧的肢体共济失调，即指鼻试验和跟膝胫试验不稳定，轮替动作差，辨距不良，故 C 正确。

本题知识点：神经病学概论-运动系统，

46.

男，35 岁。近 3 个月经常感到不明原因的紧张、害怕，对生活中的琐事思虑多，自己不能控制，为此感到苦恼，坐立不安，主动就诊。患者存在的主要症状是

- A. 焦虑症状
- B. 强制思维
- C. 强迫症状
- D. 惊恐发作
- E. 恐惧症状

【正确答案】 A

【答案解析】 焦虑症状是指在缺乏相应客观刺激情况下，出现内心不安的状态，表现为顾虑重重，紧张恐惧，坐立不安，严重时搓手顿足，惶惶不可终日，似有大祸临头的感觉。恐惧是指面临某种事物或处境时出现的紧张不安反应。惊恐发作主要表现为突然发作的、不可预测的、反复出现的、强烈惊恐体验。强迫症状主要表现为强迫观念和强迫行为。强制思维是指患者脑中反复出现的某一观念，明知没有必要，但又无法摆脱。

本题知识点：神经症性及分离（转换）性障碍-广泛性焦虑症，

47.

在对某双向障碍的患者治疗中，出现碳酸锂中毒的早期症状为

- A. 厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应

- B. 震颤、共济失调
- C. 发热、定向障碍
- D. 癫痫大发作
- E. 下肢水肿、多尿

【正确答案】 B

【答案解析】 剂量增大可引起中毒，症状主要为神经系统异常，表现为意识障碍、昏迷、肌张力增高、深反射亢进、共济失调、震颤发生。

早期副作用主要是上消化道症状，如果是锂中毒先兆，特征性的表现是粗大震颤、抽动、眩晕，而导致的共济失调的表现。

本题知识点：心境障碍（情感性精神障碍）-双相障碍，

48.

女，28岁。近3个月来觉得疲乏无力，早醒，食欲下降，工作效率明显低下，感觉头脑迟钝，不愿多说话，觉得度日如年，认为前途暗淡，有轻生念头。体格检查无明显异常。该患者最可能的诊断是

- A. 抑郁发作
- B. 精神分裂症
- C. 焦虑症
- D. 分离障碍
- E. 神经衰弱

【正确答案】 A

【答案解析】 抑郁症以显著而持久的心境低落为主要临床特征，其中情绪低落为基本症状。本例情绪低落（觉得度日如年）、思维迟缓（感觉头脑迟钝）、无望（自觉前途暗淡），有自杀倾向（轻生念头）及生物学症状（早醒、食欲下降），故应诊断为抑郁发作。焦虑症以焦虑为突出症状，常有不明原因的提心吊胆、紧张不安。

按焦虑症的诊断标准，病程应超过6个月，本例病程仅3个月。精神分裂症患者的精神活动是不协调的，以思维障碍为原发症状，而情感障碍是继发的，与本例不符。神经衰弱的症状特异性差，为排除性诊断，只有排除其他精神疾病之后，才能诊断神经衰弱。

分离性障碍旧称癔症，是指一种以分离障碍为主要临床表现的精神障碍，主要表现为部分或

全部丧失对过去的记忆，或出现具有发泄特点的情感暴发，患者可以有遗忘、人格改变等表现，症状具有发作性，与本例不符。

本题知识点：心境障碍（情感性精神障碍）-抑郁症，

三、A3/A4 题型

1. 肾的冠状切面观，肾实质分为肾皮质和肾髓质，并有肾椎体、肾乳头、乳头孔、肾柱，还可见肾小盏、肾大盏、肾盂等结构。

本题知识点：泌尿系统，

1) 肾实质的结构不包括

- A. 肾乳头
- B. 肾小盏
- C. 肾锥体
- D. 肾柱
- E. 肾乳头孔

【正确答案】B

【答案解析】肾实质可分为肾皮质和肾髓质。肾皮质主要位于肾实质的浅层，富有血管，于新鲜标本上呈红褐色。肾髓质位于肾皮质的深部，色淡红，含有许多小管道。肾髓质由 15~20 个肾锥体组成。锥体的基底朝向皮质，尖端钝圆，朝向肾窦，称肾乳头，有时 2~3 个肾锥体合成 1 个肾乳头。肾乳头顶端有许多小孔，肾生成的尿液由此孔流入肾小盏内。皮质延伸至肾锥体之间的部分称肾柱。

肾小盏位于肾窦内，呈漏斗状。肾小盏包绕肾乳头，承接由肾乳头排出的尿液。2~3 个肾小盏合成肾大盏，肾大盏共有 2~3 个，彼此汇合成肾盂。肾盂离开肾门后向下走行，逐渐变细，约在第 2 腰椎体上缘移行为输尿管。

2) 输送尿液离开肾的结构

- A. 肾乳头孔
- B. 肾小盏
- C. 肾盂

D. 肾大盏

E. 输尿管

【正确答案】C

【答案解析】肾小盏位于肾窦内,呈漏斗状。肾小盏包绕肾乳头,承接由肾乳头排出的尿液。2~3个肾小盏合成肾大盏,肾大盏共有2~3个,彼此汇合成肾盂。肾盂离开肾门后向下走行,逐渐变细,约在第2腰椎体上缘移行为输尿管。

2.24

岁女性,停经58天,2周前行人工流产吸宫术,术后持续阴道流血。

本题知识点: 计划生育-人工流产,

1) 患者初步考虑的诊断是

A. 子宫复旧不良

B. 吸宫不全

C. 子宫穿孔

D. 子宫内膜炎

E. 漏吸

【正确答案】B

【答案解析】人工流产手术后阴道流血时间长,血量多或流血停止后再出现多量流血,应考虑吸宫不全。

2) 为明确诊断,首先选用的辅助检查是

A. 血常规检查

B. 子宫镜检查

C. B型超声检查

D. 腹腔镜检查

E. hCG测定

【正确答案】C

【答案解析】明确吸宫不全的检查为彩超检查。

3) 确诊后应选用的治疗措施是

- A. 应用抗生素
- B. 抗生素+宫缩剂
- C. 抗生素+止血剂
- D. 抗生素+清宫术
- E. 宫缩素+清宫术

【正确答案】D

【答案解析】无明显感染征象，应尽早行清宫术，术后给予抗生素预防感染。若同时伴有感染，应控制感染后再行清宫术。

3.

女，20岁。突发下腹疼痛1天急诊来院。否认性生活史，月经规律。直肠指诊扪及下腹肿物如拳头大小，触痛明显。急诊行剖腹探查术，术中见左侧卵巢肿大为囊实性包块，包膜完整。右侧附件及子宫外观无异常，快速病理示左卵巢未成熟畸胎瘤，分化Ⅱ级，腹腔冲洗液未查见癌细胞。

本题知识点：女性生殖器官肿瘤-卵巢肿瘤，

1) 该患者应选择的手术方式

- A. 患侧附件切除术
- B. 双侧附件切除术
- C. 患侧附件切除术+保留生育功能的分期手术
- D. 子宫+双附件切除术
- E. 患侧附件切除术+阑尾切除术

【正确答案】C

【答案解析】卵巢恶性肿瘤的治疗原则是以手术为主，加用化疗、放疗的综合治疗。手术起关键作用，尤其是首次手术更重要，尽早剖腹探查。因患者20岁年龄较轻，有生育要求，故应做患侧附件切除术加保留生育功能的分期手术，故本题应选C。

2) 若选择化疗, 应选择的化疗方案是

- A. 顺铂+5-氟尿嘧啶
- B. 顺铂+环磷酰胺
- C. 顺铂+依托泊苷
- D. 顺铂+环磷酰胺+克林霉素
- E. 顺铂+依托泊苷+博来霉素

【正确答案】E

【答案解析】常用的化学治疗药物有烷化剂、依托泊苷, 抗代谢药物 5-氟尿嘧啶, 抗生素类多与顺铂联合应用。环磷酰胺为免疫抑制剂, 故本例患者最佳的化学药物治疗方案应为 NSA+依托泊苷+博来霉素, 故本题应选 E。

3) 化疗前与家属/患者本人谈话的内容不包括

- A. 化疗药物价格
- B. 化疗药物对卵巢功能的影响
- C. 化疗疗程
- D. 化疗副作用
- E. 化疗药物的化学结构

【正确答案】E

【答案解析】在对患者进行化学药物治疗前, 应先征得家属/患者本人的同意, 向家属/患者本人交代治疗方案的内容有化疗药物价格、化疗药物对卵巢功能的影响、化疗疗程长短、化疗副作用, 对机体的影响等问题, 而化疗药物的化学结构及作用机制不必谈及。

4) 患者术后病理诊断为左侧卵巢未成熟畸胎瘤 II 级, 病理分期为 I a 期。下一步处理方案为

- A. 随诊
- B. 放疗
- C. 化疗

- D. 化疗+放疗
- E. 内分泌治疗

【正确答案】C

【答案解析】化学药物治疗为重要的辅助治疗,可预防复发,手术未能全部切除者,患者可获暂时缓解甚至长期存活。无性细胞瘤对放射治疗最敏感,颗粒细胞瘤中度敏感,上皮性癌也有一定敏感。但未成熟畸胎瘤对放疗敏感性较低,故主要辅以化疗,故本题应选 C。

4.

女,35岁。平时月经规则,现停经69天,阴道流血10天。妇科检查子宫如妊娠3个月大,软,无压痛,双侧附件区均触及5cm囊性包块,壁薄,活动好,无压痛。血hCG增高明显。

本题知识点:妊娠滋养细胞疾病-葡萄胎,

1) 最可能的诊断是

- A. 异位妊娠
- B. 卵巢巧克力囊肿
- C. 子宫肌瘤
- D. 葡萄胎
- E. 不全流产, 宫腔积血

【正确答案】D

【答案解析】患者停经史,子宫增大, hCG 明显升高,说明存在妊娠,加上双侧附件区均触及5cm囊性包块,且子宫大小大于停经周数,考虑为葡萄胎。题干中双侧附件区触及囊性包块,提示卵巢黄素化囊肿,其为葡萄胎的常见表现,特点是常为双侧,囊肿光滑,壁薄,活动度好,一般在清宫后2~4个月自行消退。

2) 为确诊应首先进行的检查是

- A. 血清 CA125 测定
- B. 盆腔 B 超检查
- C. 盆腔 CT
- D. 盆腔 MRI

E. 腹部 X 线摄片

【正确答案】B

【答案解析】B 超是诊断葡萄胎可靠、敏感的辅助检查，宫腔内充满不均质密集状或条状回声，呈“落雪征”，水泡大时呈“蜂窝状”。

3) 合适的治疗是

A. 负压吸宫术

B. 子宫切除术

C. 化学药物治疗

D. 放射治疗

E. 性激素治疗

【正确答案】A

【答案解析】葡萄胎一旦诊断成立，应及时清宫，在遇到类似考题时，应注意清宫前应判断有无合并休克、子痫、甲亢等表现，若出现应先对症处理后再清宫。

5.

女，30 岁，妊娠 35 周，发现血压升高 3 周，今晨突然腹痛，呈持续性，阴道有少量流血，查体：P 112 次/分，BP 150/98mmHg，子宫张力大，宫底前壁压痛明显，胎心 100 次/分，尿蛋白（++）。

本题知识点：病理妊娠-胎盘早剥，

1) 最可能的诊断是

A. 子宫破裂

B. 先兆子宫破裂

C. 前置胎盘

D. 早产临产

E. 胎盘早剥

【正确答案】E

2) 此时最适宜的处理是

- A. 使用硫酸镁抑制宫缩后继续妊娠
- B. 给予降压止痛后密切观察
- C. 给予 β 受体兴奋剂抑制宫缩，加强胎儿监护
- D. 静脉滴注缩宫素引产
- E. 剖宫产终止妊娠

【正确答案】 E

3) 该患者最容易发生的并发症是

- A. 子痫
- B. 心力衰竭
- C. 子宫破裂
- D. DIC
- E. 胎盘粘连

【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期高血压疾病子痫前期/子痫发生在妊娠 20 周以后，临床表现为高血压、蛋白尿。可以发生胎盘早剥等并发症。该患者的临床症状为突然腹痛，呈持续性，阵发性加重，符合胎盘早剥。最适宜的就是剖宫产终止妊娠。DIC 胎盘早剥是妊娠期发生 DIC 最常见的原因，伴有死胎时约 1/3 发生。

6.

患儿，女，7 个月，发热伴皮疹 7 天。查体：体温 39℃，精神可，躯干部皮肤散在红色斑丘疹，双下肢散在靶形红色斑丘疹。颈部可触及 3 个黄豆大小淋巴结。前囟平软。双结膜充血，无流泪，口唇黏膜干燥，舌质红，呈杨梅舌。心肺查体无明显异常。肝脏肋下约 1cm，脾脏未触及。手足红肿、硬。

本题知识点： 风湿免疫性疾病-川崎病，

1) 该病儿最可能的诊断是

- A. 渗出性多形性红斑

- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 风疹
- D. 麻疹
- E. 川崎病

【正确答案】 E

【答案解析】 患儿有皮肤黏膜损害，淋巴结肿大，并有手足硬性肿，符合川崎病的表现。渗出性多型性红斑、传染性单核细胞增多症一般无手足硬性肿及杨梅舌。麻疹黏膜损害，卡他症状明显，流泪，并有分泌物。风疹虽无卡他症状，但和麻疹一样，皮疹为红色粟粒样，而且无手足硬性肿及杨梅舌。

2) 治疗该病可阻断急性炎症反应并具有预防冠状动脉病变作用的是

- A. 抗病毒药物
- B. 抗生素
- C. 大剂量丙种球蛋白
- D. 阿司匹林
- E. 皮质激素

【正确答案】 C

【答案解析】 阿司匹林可减轻急性炎症反应，解聚血小板，但单用阿司匹林可否预防冠状动脉病变不确定。大剂量丙种球蛋白静脉滴注，可阻断急性炎症反应并具有预防冠状动脉病变作用。

3) 早期应用阿司匹林的作用是

- A. 减少冠状动脉病变发生
- B. 增强免疫力
- C. 封闭自身免疫性抗体
- D. 抗血小板凝集
- E. 以上都是

【正确答案】D

【答案解析】阿司匹林可减轻急性炎症反应，解聚血小板，但是单用阿司匹林可否预防冠状动脉病变尚不确定。

冠状动脉炎引起冠状动脉瘤和栓塞而致猝死是川崎病的严重表现，早期（发病 10 天内）应用大剂量丙种球蛋白可以减少冠状动脉病变发生。

4) 若有冠状动脉病变，阿司匹林的用药时间是

A. 8~12 周

B. 3 个月

C. 用至冠状动脉病变消失

D. 3~6 个月

E. 4~6 天

【正确答案】C

【答案解析】川崎病如有冠状动脉病变时，应延长用药时间，直至冠状动脉恢复正常。

7.

女孩，6 岁。精神欠佳 2 周，发热、头痛、呕吐 5 天。2 周前开始出现精神不佳，10 天来每天发热，最高体温 38.0℃，进食欠佳，伴头痛、呕吐。1 个月前曾患“麻疹”。查体：精神差，消瘦，右眼外展受限，颈抵抗 (+)，Kernig 征 (+)，Brudzinski 征 (+)。PDD 试验 (-)。

本题知识点：结核病-结核性脑膜炎，

1) 最可能的诊断是

A. 病毒性脑炎

B. 流行性脑脊髓膜炎

C. 化脓性脑膜炎

D. 结核性脑膜炎

E. 隐球菌性脑膜炎

【正确答案】D

【答案解析】者有麻疹病史，出现中枢神经系统异常，消瘦、精神不佳，低热，累及外展神经，考虑结核可能性较大。

2) 为明确诊断首选的检查是

- A. 头颅 CT
- B. 脑电图
- C. 胸部 X 线片
- D. 脑脊液检查
- E. 血沉

【正确答案】D

【答案解析】脑脊液查到结核杆菌是诊断结核可靠的依据。

3) 提示该疾病进入晚期的表现是

- A. 昏迷
- B. 腹壁反射消失
- C. 颅神经受损
- D. 肢体偏瘫
- E. 惊厥

【正确答案】A

【答案解析】结核性脑膜炎，分三期，早期、中期、晚期（昏迷期）。

8.

患儿 10 个月，8kg，发热呕吐腹泻 2 天，每日大便 10 余次，呈稀水样便，含奶瓣，无腥臭。尿量减少。体格检查：精神萎靡，皮肤弹性差，前囟及眼窝凹陷，口唇樱红，心肺腹无明显异常。四肢冷。血常规：WBC $7.7 \times 10^9/L$ ，L 62%，N 38%；大便常规：WBC 0~1/HP。血清钠 135mmol/L。

本题知识点：消化系统疾病-小儿腹泻病，

1) 该患儿的诊断是

- A. 婴儿腹泻伴中度等渗性脱水
- B. 婴儿腹泻伴重度等渗性脱水
- C. 婴儿腹泻伴中度等渗性脱水、酸中毒
- D. 婴儿腹泻伴重度等渗性脱水、酸中毒
- E. 婴儿腹泻伴轻度等渗性脱水

【正确答案】 C

【答案解析】 10 个月小儿，8kg，精神萎靡，皮肤弹性差，前囟及眼窝凹陷，四肢冷。口唇樱红。诊断：婴儿腹泻伴中度等渗性脱水、酸中毒。

2) 第 1 天补液种类应选择

- A. 2: 3: 1 液
- B. 4%碳酸氢钠
- C. 5%葡萄糖液
- D. 2%乳酸钠溶液
- E. 2: 1 液

【正确答案】 A

3) 补液总量和张力应为

- A. 800ml，1/2 张
- B. 1500ml，2/3 张
- C. 1200ml，1/2 张
- D. 1400ml，2/3 张
- E. 720ml，1/2 张

【正确答案】 C

【答案解析】 补液方案（第 1 天补液）

(1) 补液总量：120~150ml/kg。

- (2) 补液种类: 等渗性脱水补充累积损失量用 1/2 (2: 1 液或 2: 3: 1 液)。
- (3) 补液步骤及速度: 以补充累积损失量为主阶段: 速度为 $8\sim 10\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$, 时间 $8\sim 12\text{h}$; 维持补液阶段: 速度为 $5\text{ml}/\text{kg}\cdot\text{h}$, 将余量 $12\sim 16\text{h}$ 滴完。

9.

女婴, 3 岁。呕吐腹泻 2 天。突然脐周阵发性腹痛, 继恶心呕吐 2~4 次, 大便 5~6 次。初蛋花汤样后呈赤豆汤血水样便, 腥臭, 无脓。T39℃, 腹软, 稍胀, 不固定压痛, 无肌紧张, 未及包块, 皮疹 (-)。

本题知识点: 新生儿与新生儿疾病-新生儿坏死性小肠结肠炎,

1) 为早期确诊, 哪项检查最有价值

- A. 动脉血气分析
- B. 腹部 X 线片
- C. 血白细胞计数分类
- D. 大便常规加隐血试验
- E. 大便培养加药敏

【正确答案】 B

【答案解析】 患儿以腹胀、呕吐、腹泻、血便为主要临床表现, 有腥臭味, 说明有感染, 考虑是坏死性小肠结肠炎。腹部 X 线平片以动力性肠梗阻、肠壁积气和门静脉积气为特征。病理上以小肠和结肠的坏死为特征。

2) 可能的诊断是

- A. 过敏性紫癜
- B. 肠套叠
- C. 婴儿腹泻
- D. 急性坏死性肠炎
- E. 细菌性痢疾

【正确答案】 D

3) 患儿进食的指征为

- A. 腹痛减轻，粪便隐血阴性
- B. 肉眼血便消失，腹胀基本好转，腹痛减轻
- C. 腹痛、呕吐、腹泻停止
- D. 中毒症状明显改善
- E. 中毒性休克得以纠正

【正确答案】A

【答案解析】待临床情况好转，腹胀消失，大便潜血转阴后可逐渐恢复饮食。恢复喂养要从水开始，再用糖水、稀释奶，逐渐增加奶量及浓度。

10.

男性，18岁学生，不出门怕见人，不去上课，纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了，难看了。说班上的同学都讥笑他，出门就感觉别人在说他，别人的眼光看他时很特别，能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他，父母不是亲生的，曾说要去做亲子鉴定。

本题知识点：精神障碍-症状学，

1) 该患者的精神症状中不存在

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 非幻觉性知觉障碍

【正确答案】D

【答案解析】被控制妄想，指坚信自己意志被外部势力或外部意志所取代或控制而不能自主。用于描述被动综合征，以突出的被控制妄想与假性幻觉为主。

2) 如给予药物治疗，下列不属抗精神病药的是

- A. 氟哌啶醇

- B. 氟奋乃静
- C. 氟西汀
- D. 氯氮平
- E. 三氟拉嗪

【正确答案】 C

【答案解析】 氟西汀属于抗抑郁类药物。

3) 判断一种抗精神病药是否有效至少要足量使用的时间是

- A. 4 周
- B. 5 周
- C. 6 周
- D. 7 周
- E. 8 周

【正确答案】 C

【答案解析】 固定知识点，一般抗精神病药至少使用 6 周，例如精神分裂患者的治疗急性期就是至少 6 周。

11.

男，56 岁的心房颤动患者，突然发生“命名困难”。2 周来共发生过 5 次，每次持续 2~15 秒。查体无神经系统异常。脑 CT 无异常。

本题知识点：脑血管疾病-短暂性脑缺血发作，

- 1) 可能的诊断是
- A. 脑动脉瘤
 - B. 脑血栓形成
 - C. 脑出血
 - D. 脑血管畸形
 - E. 短暂性脑缺血发作

【正确答案】 E

【答案解析】发作性的运动性失语，均于 24 小时内缓解，查体无神经系统异常，脑 CT 无异常，符合短暂性脑缺血发作。

2) 主要累及的血管是

- A. 基底动脉系
- B. 椎动脉系
- C. 颈内动脉系
- D. 大脑后动脉
- E. 大脑前动脉

【正确答案】 C

【答案解析】命名性失语：表现为患者能讲话，也能理解别人的问话，能说出物品的性质及用途，唯独叫不出物品的名称，所以称命名性失语。失语是颈内动脉的特点。

3) 最适宜的预防治疗是

- A. 阿司匹林
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 丙戊酸钠
- D. 胞二磷胆碱
- E. 降纤酶

【正确答案】 A

【答案解析】血小板抑制剂，如阿司匹林，可减少栓子发生，预防复发。

12.

患者，年轻女性，身高 165cm，体重 55kg，常因大量进食后过分担心体重增高，采取诱吐手段来加以控制。近一个月来出现对任何事情都不感兴趣，常常自责等表现。

本题知识点：心理生理障碍-进食障碍，

1) 初步考虑

- A. 进食障碍
- B. 神经性厌食
- C. 神经性贪食
- D. 神经性呕吐
- E. 以上都不是

【正确答案】 C

【答案解析】 神经性贪食与神经性厌食的区别在于，贪食是会有进食的，严重者暴饮暴食，在进食之后才对体重感到过分的心理担忧，常常采用诱吐，药物等手段来控制，多数患者体重是正常的，且常常伴有抑郁的表现。而神经性厌食是拒绝进食，拒绝治疗，体重不正常，但抑郁症只有在非常严重时发生。

2) 该患者 BMI 值为

- A. 17
- B. 18
- C. 19
- D. 20
- E. 21

【正确答案】 D

【答案解析】 体质指数 (BMI) = 体重 (kg) \div 身高² (m)；神经性厌食患者体重常 \leq 17.5。而神经性贪食则常为正常。

3) 若该患者需要与神经性呕吐做鉴别，其鉴别点是

- A. 有无电解质紊乱
- B. 刻意诱发呕吐
- C. 体重是否减轻
- D. 是否有进食
- E. 是否过分担心发胖

【正确答案】 E

【答案解析】 神经性呕吐是进食后不久出现自发地或故意的反复呕吐, 呕吐与社会因素有关, 患者一般无害怕或过分担心发胖的想法, 所以和神经性贪食患者一样, 体重常多为正常的, 也可以因呕吐导致水电解质紊乱, 呕吐后一般不影响下一次进食。

四、B 题型

1. A. 肛直肠线

B. 白线

C. 齿状线

D. 肛直肠环

E. 肛梳

本题知识点: 消化系统,

1) 直肠与肛管的分界线是

【正确答案】 A

【答案解析】 肛柱上端的环形连线为肛直肠线, 是直肠与肛管的分界线。

2) 内痔与外痔的分界线

【正确答案】 C

【答案解析】 齿状线以上者为内痔, 以下者为外痔, 跨越齿状线上下者为混合痔。

2.A.

钳刮术

B. 负压吸宫术

C. 静脉滴注催产素

D. 利凡诺羊膜腔内注射

E. 药物流产

本题知识点: 计划生育-计划生育方法的知情选择,

1) 青年女性, 剖宫产术后 1 年, 停经 45 天, B 超示早孕, 符合 6⁺周妊娠, 最宜采取哪种方

式终止妊娠

【正确答案】E

【答案解析】药物流产适应证①早期妊娠 ≤ 49 日，可门诊行药物流产。②本人自愿，血或尿 hCG 阳性，超声检查确诊为宫内妊娠。③人工流产高危因素者，如瘢痕子宫、哺乳期、子宫颈发育不良或严重骨盆畸形。④多次人工流产史，对手术流产有恐惧和顾虑心理者。

2) 青年女性，既往月经规律，停经 52 天，B 超示早孕，符合 7⁺周妊娠，最宜采取哪种方式终止妊娠

【正确答案】B

【答案解析】手术方式①负压吸引术：利用负压吸引原理，将妊娠物从宫腔内吸出。适用于妊娠 10 周内；②钳刮术：通过机械或药物方法使宫颈松软，然后用卵圆钳钳夹胎儿及胎盘。适用于妊娠 10~14 周。

3.A.

圆韧带

B. 主韧带

C. 宫骶韧带

D. 阔韧带

E. 骨盆漏斗韧带

本题知识点：女性生殖系统解剖，

1) 从子宫角前面至大阴唇前端，维持子宫前倾位置的韧带为

【正确答案】A

【答案解析】圆韧带：呈圆索状得名，由平滑肌和结缔组织构成，全长 10~12cm。起自子宫角的前面、输卵管近端的稍下方，在阔韧带前叶的覆盖下向前外侧走行，到达两侧骨盆侧壁后，经腹股沟管止于大阴唇前端。有维持子宫呈前倾位置的作用。

2) 维持子宫解剖位置，限制子宫向两侧倾斜的韧带为

【正确答案】D

【答案解析】阔韧带：位于子宫两侧呈翼状的双层腹膜皱襞，由覆盖子宫前后壁的腹膜自子宫侧缘向两侧延伸达盆壁而成，能够限制子宫向两侧倾斜。

3) 固定宫颈位置、防止子宫下垂的主要结构为

【正确答案】B

【答案解析】主韧带：又称宫颈横韧带。在阔韧带的下部，横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间。为一对坚韧的平滑肌和结缔组织纤维束，是固定宫颈位置、防止子宫下垂的主要结构。

4) 卵巢动静脉从哪条韧带中穿过

【正确答案】E

【答案解析】阔韧带前后两叶，其上缘游离，内 2/3 部包裹输卵管(全部无腹膜遮盖)，外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带或称为卵巢悬韧带，卵巢动静脉由此穿行。

4.A.

致病性大肠杆菌肠炎

B. 伪膜性肠炎

C. 轮状病毒肠炎

D. 空肠弯曲菌肠炎

E. 真菌性肠炎

本题知识点：消化系统疾病-小儿腹泻病，

1) 大便黏冻样有脓血

【正确答案】D

2) 大便呈水样或蛋花汤样、无腥臭味

【正确答案】C

3) 黄绿色水样便，有伪膜

【正确答案】B

4) 黄绿色稀水便带黏液、有豆渣样块状物

【正确答案】E

【答案解析】轮状病毒肠炎：大便次数多、量多、水多，黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味，镜检偶有少量白细胞。

空肠弯曲菌肠炎大便呈黏液状、带脓血、有腥臭味。

真菌性肠炎：大便稀黄，泡沫较多，带黏液，有时可见豆腐渣样细块，偶见血便。

5.A.

尿嘌呤分析

B. 血浆氨基酸分析

C. 血 TSH 测定

D. 染色体核型分析

E. 尿三氯化铁试验

本题知识点：遗传性疾病-苯丙酮尿症，

1) 儿童苯丙酮尿症初筛选用的检查是

【正确答案】E

2) 儿童苯丙酮尿症的确诊检查是

【正确答案】B

【答案解析】苯丙酮尿症实验室检查：

尿三氯化铁试验和 2, 4-二硝基苯肼试验是检测尿中苯丙酮酸的化学呈色法，一般用于对较大婴儿和儿童的初筛。

血浆游离氨基酸分析和尿液有机酸分析该试验不仅为本病提供生化诊断依据，同时可鉴别其他可能的氨基酸、有机酸代谢缺陷。

6.A.

感觉倒错

- B. 感觉异常
- C. 感觉过度
- D. 感觉过敏
- E. 感觉缺失

本题知识点：神经病学概论-脑神经，

1) 轻微的刺激引起强烈的感觉属于

【正确答案】 D

【答案解析】感觉过敏指轻微的刺激引起强烈的感觉，例如一个轻微的痛刺激引起较强的痛觉体验。

2) 把冷觉刺激误认为热觉刺激属于

【正确答案】 A

【答案解析】感觉倒错是对刺激的认识倒错，如把冷觉刺激误认为热觉刺激。

3) 蚁行感属于

【正确答案】 B

【答案解析】感觉异常指的是没有外界刺激而自发的感觉，如麻木感、蚁行感等。