

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2021 年第 6 期

1. 【问题】反应小儿骨骼发育的重要指标是身高吗？在什么情况下选体重？

【解答】身高（高）指从头顶到足底的全身长度，是反映骨骼发育的重要指标。

体重为各器官、组织及体液的总重量，是反映小儿营养状况的敏感指标，也是儿科临床计算药量、输液量等的重要依据。

2. 【问题】新冠肺炎是属于哪类传染病？甲类？乙类？丙类？如发现按哪类来上报？多少小时内上报？

【解答】目前，新型冠状病毒的肺炎属于乙类传染病，按甲类管理。

责任报告人发现甲类传染病和按照甲类管理的乙类传染病病人、病原携带者或疑似传染病病人时，应在 2 小时内报告发病地的卫生防疫机构。

3. 【问题】医院感染类型有哪些？那么自体感染算什么？

【解答】医院感染按病原体的来源不同可分为外源性感染和内源性感染两类。

(1) 外源性感染（又称交叉感染）：指病原体来自于病人体外，通过直接或间接的途径，传播给病人所引起的感染。

(2) 内源性感染（又称自身感染）：指病原体来自于病人自身所引起的感染。在病人体内或体表定植、寄生的正常菌群，正常情况下对人体无感染力而不致病；当人体的健康状况不佳、免疫功能受损、正常菌群移位，以及抗生素的不合理应用时，引起的机体感染。

教材中没有“自体感染”，只有“自身感染”，属于内源性感染。

4. 【问题】胸腔引流，引流出血液量多少为活动性出血？

【解答】胸膜腔内活动性出血的征象：

(1) 脉搏逐渐加快，血压持续下降；

(2) 经补充血容量后血压虽有短暂回升，但又迅速下降；

(3) 血红蛋白、血细胞计数、血细胞比容持续降低；

(4) 胸膜腔闭式引流出血量大于每小时 200ml，并持续 3 小时以上；

(5) 胸膜腔穿刺抽出的血液很快凝固或因血液凝固抽不出，且胸部 X 线是胸膜腔阴影继续增大者。

5. 【问题】洋地黄中毒所致的室性期前收缩是选利多卡因还是苯妥英钠？

【解答】洋地黄中毒引起的室性期前收缩应立即停用洋地黄，并给予钾盐和苯妥英钠治疗。