

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2021 年第 11 期

1. 【问题】婴儿喂奶后为什么选右侧卧位？

【解答】喂后将婴儿抱直，头部靠在母亲肩上，轻拍背部，使空气排出，然后保持右侧卧位，以防呕吐。主要是防止呕吐。

2. 【问题】五苗防七病是哪七病？

【解答】七病：乙肝、百日咳、破伤风、白喉、脊髓灰质炎、麻疹、风疹。

3. 【问题】左心循环是体循环还是肺循环啊？

【解答】左心是接受从肺回来的已经结合氧气的动脉血，然后送达全身的，当心力衰竭时，肺内的血液无法回流，导致肺淤血，从而出现呼吸困难等肺部症状，所以才会说“左肺右体”。

4. 【问题】三个不同类型的前置胎盘临床症状？

【解答】临床表现及分类 妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血是前置胎盘的主要症状，偶有发生于妊娠 20 周左右者。阴道流血时间的早晚、反复发作的次数、流血量的多少与前置胎盘的类型有关。

1. 完全性前置胎盘 子宫颈内口全部为胎盘组织所覆盖，又称中央性前置胎盘。初次出血早，约在妊娠 28 周，反复出血次数频繁，量较多，有时一次大量阴道流血即可使病人陷入休克状态。

2. 部分性前置胎盘 子宫颈内口部分为胎盘组织所覆盖。出血情况介于完全性前置胎盘和边缘性前置胎盘之间。

3. 边缘性前置胎盘 胎盘附着于子宫下段，边缘不超越子宫颈内口。初次出血发生较晚，多于妊娠 37~40 周或临产后，量较少。

由于反复多次大量阴道流血，病人可出现贫血，贫血程度与出血量成正比，出血严重者可发生休克，还可导致胎儿缺氧、宫内窘迫，甚至死亡。

前置胎盘常合并胎位异常、胎先露下降受阻；分娩时易出现宫颈撕裂或胎盘绒毛植入到子宫肌层等发生产后大出血。胎盘剥离面靠近子宫颈口，容易发生产褥感染。

5.【问题】患者男性，55 岁，患肝硬化多年。昨天因吃鱼后出现呕血，量多，为鲜红色血块。

入院后测血压，收缩压 10KPa，脉搏 130 次/分，患者神志恍惚，四肢厥冷，面色苍白。初步估计患者出血量

A.<500ml

B.500~1000ml

C.>500ml

D.>1500ml

E.>2000ml

【学员提问】请问老师这题选什么？为什么？

【解答】根据此患者的收缩压及表现，可以判断其发生了中度休克，失血量在 800~1600ml，所以选项 D 最佳。

【继续提问】谢谢！没想这是中度休克，所以一直想不明白。