

**【6.22日】临床医师-女性生殖系统-冲刺刷题考题**

1. 28岁，女性，骑自行车与三轮车相撞，自觉外阴疼痛难忍并肿胀就诊。根据女性外阴解剖学特点，可能发生的是

- A. 小阴唇裂伤
- B. 处女膜破裂
- C. 大阴唇血肿
- D. 阴道前庭损伤
- E. 前庭大腺肿大伴出血

2. 欲行全子宫切除，保留双附件，不需要切断的韧带是

- A. 圆韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 卵巢悬韧带
- D. 阔韧带
- E. 主韧带

3. 关于子宫的描述，正确的是

- A. 子宫峡部下端为解剖学内口
- B. 宫体与宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
- C. 幼年时宫体和宫颈的比例是2:1
- D. 子宫峡部上端是组织学内口
- E. 成年女子的子宫长7~8cm，宽4~5cm，厚4~5cm

**【例题】**（4~6题共用备选答案）

- A. 卵泡雌激素
  - B. 黄体生成素
  - C. 雌激素
  - D. 孕激素
  - E. 催乳激素
4. 卵泡早期分泌量少，排卵前达高峰，以后降低，排卵后期再度增高的激素是
5. 卵泡前半期分泌量少，排卵前一天骤升，一天骤降，并维持低水平的激素是
6. 卵泡期分泌量少，排卵后分泌量明显增加，8~9天后下降的激素是
7. 属于孕激素的生理作用是
- A. 使阴道上皮细胞脱落加快
  - B. 使宫颈黏液变稀薄
  - C. 使子宫肌层增厚
  - D. 使子宫内膜增生
  - E. 使血循环中胆固醇水平降低

## 医师资格考试辅导

8. 妊娠期母体循环系统的变化，错误的是
- A. 血容量至妊娠末期增加 40%~45%
  - B. 心率从妊娠早期至末期每分钟增加 10~15 次
  - C. 心搏出量至妊娠 32~34 周达高峰
  - D. 妊娠后期心脏向左、向上、向前移位
  - E. 第二产程期间，心搏出量略减少
9. 晚期复发性流产最常见的原因是
- A. 胚胎发育异常
  - B. 胎盘功能不全
  - C. 染色体异常
  - D. 子宫畸形
  - E. 宫颈内口松弛
10. 已婚女性，29 岁，停经 50+2 天，阴道流血伴下腹隐痛 5 天，加剧半天。近 1 周有恶心、食欲不振等不适。妇检：阴道内有较多血块，宫颈口开大，可见血块及组织堵塞于宫颈口，子宫约 50 天孕大，最可能的诊断是
- A. 难免流产
  - B. 不全流产
  - C. 先兆流产
  - D. 稽留流产
  - E. 完全流产
11. 流产感染易发生在
- A. 先兆流产
  - B. 完全流产
  - C. 稽留流产
  - D. 不全流产
  - E. 难免流产
12. 女，28 岁。妊娠 40 天，因下腹阵痛伴阴道少量出血 1 天就诊。查体：子宫增大与停经月份相符，宫口未开。既往妊娠 50 天时自然流产 1 次。目前对该患者的正确处置是
- A. 静卧保胎
  - B. 行宫颈内口环扎术保胎
  - C. 行刮宫术清除宫内胚胎
  - D. 肌注炔雌醇抑制宫缩
  - E. 静点缩宫素止血
13. 26 岁，经产妇。停经 8 周，下腹阵发性剧烈疼痛 10 小时伴多量阴道流血，超过月经量。检查宫口开大近 2cm。本例最正确的处置应是
- A. 静脉滴注止血药物
  - B. 口服硫酸舒喘灵
  - C. 肌注硫酸镁
  - D. 肌注黄体酮

E. 行负压吸宫术

14. 输卵管妊娠常见的病因是

- A. 输卵管发育异常
- B. 慢性输卵管炎
- C. 输卵管结扎术后再通
- D. 输卵管受肿瘤压迫
- E. 内分泌功能失调

15. 已婚妇女，26岁。月经规律，停经数天，今晨出现一侧下腹痛伴肛门坠胀感，查体：BP 90/60mmHg。该患者此时有诊断价值的体征是

- A. 子宫稍大变软
- B. 腹肌紧张
- C. 宫颈举痛，后穹隆饱满
- D. 双合诊黑加征（+）
- E. 腹部移动性浊音（-）

（16~18题共用题干）

女，30岁。已婚。平时月经规律。停经40天，右下腹剧痛4小时伴头晕及肛门坠胀感。查体：BP 80/56mmHg，面色苍白，痛苦病容，下腹部压痛及反跳痛（+），尤以右侧为著，肌紧张不明显，移动性浊音（+）。妇科检查：宫颈举痛，宫体稍大，右附件区触及不规则包块，大小约4cm×3cm×3cm，压痛（+）。实验室检查：Hb100g/L。

16. 该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢黄体囊肿破裂
- B. 卵巢囊肿蒂扭转
- C. 卵巢滤泡囊肿破裂
- D. 输卵管妊娠破裂
- E. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂

17. 该患者简单可靠的辅助检查是

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹部CT检查
- C. 腹部X线检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 阴道后穹窿穿刺

18. 该患者正确的处理措施是

- A. 中药活血化瘀
- B. 口服止血药物
- C. 手术治疗
- D. 对症处理，严密观察
- E. 肌肉注射甲氨蝶呤

19. 妊娠期高血压疾病的基本病变为

## 医师资格考试辅导

- A. 慢性弥漫性血管内凝血  
B. 全身小动脉痉挛  
C. 血液高度浓缩  
D. 水钠严重潴留  
E. 肾素-血管紧张素-前列腺素系统平衡失调
20. 初孕妇，29岁，妊娠37周。头痛1周，今晨喷射性呕吐1次，1小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体：BP 180/120mmHg，尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是
- A. 子痫  
B. 脑出血  
C. 癔症  
D. 癫痫  
E. 脑血栓形成
21. 24岁，女，妊娠38周，头晕眼花1天。体格检查：血压160/96mmHg，宫底位于脐与剑突之间，胎头固定，枕右前位，胎心142次/分，尿蛋白(++)。本例正确的诊断应是
- A. 妊娠期高血压  
B. 子痫前期  
C. 重度子痫前期  
D. 子痫  
E. 妊娠合并慢性高血压
22. 初产妇孕38周，下肢水肿伴头晕眼花、视物模糊1周。血压160/104mmHg，尿蛋白(+)。NST有反应型。正确处理为
- A. 立即剖宫产  
B. 积极治疗，等待自然分娩  
C. 积极治疗1周，终止妊娠  
D. 立即静脉滴注催产素引产  
E. 积极治疗24~48小时，终止妊娠
- (23~25题共用题干)
- 26岁，初孕妇。现妊娠40周，近半月头痛、眼花、视物模糊，今晨出现剧烈头痛并呕吐2次来院就诊。测血压180/110mmHg。
23. 最有参考价值的病史是
- A. 既往有无头痛史  
B. 既往血压正常  
C. 有高血压家族史  
D. 有患病毒性肝炎史  
E. 有多次泌尿系统感染史
24. 为与慢性高血压鉴别，最有价值的血液检查结果是
- A. 尿素氮值增高  
B. 尿素值增高  
C. 尿酸值增高

- D. 肌酸值增高
- E. 肌酐值增高

25. 听胎心发现胎心 176 次/分，此时恰当的处置应是

- A. 静脉滴注硫酸镁
- B. 静脉快速滴注甘露醇
- C. 对症处理
- D. 立即行剖宫产术
- E. 立即行催产素静脉滴注引产

26. 初孕妇，25 岁。现妊娠 9 周。半年前曾因感冒诱发心力衰竭。查体：心率 110 次/分，心尖部闻及舒张期杂音，肝肋下可触及。该患者正确的处理措施是

- A. 继续妊娠，需口服地高辛
- B. 终止妊娠，行负压吸引术
- C. 继续妊娠，增加产前检查次数
- D. 终止妊娠，行钳刮术
- E. 继续妊娠，不需特殊治疗

【例题】(27~28 题共用备选答案)

- A. 前置胎盘
- B. 羊水过多
- C. 胎盘早剥
- D. 先兆子宫破裂
- E. 子宫破裂

27. 27 岁初孕妇，妊娠 38 周，患重度妊娠高血压综合征，昨晚突然出现阴道流血伴下腹痛，最可能的诊断应是

28. 经产妇，27 岁，32 周妊娠，昨日夜晚突然出现无痛性阴道流血，最可能的诊断是

【例题】(29~31 题共用题干)

35 岁，孕 3 产 0，孕 32 周，阴道少量出血 3 天，无腹痛。曾自然流产、过期流产各 1 次。入院检查：枕左前位，胎头浮，胎心好，耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。

29. 该病例最可能的诊断是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 前置胎盘
- C. 先兆流产
- D. 先兆子宫破裂
- E. 胎盘边缘血窦破裂

30. 为明确诊断，首选的检查方法是

- A. X 线腹部平片
- B. 阴道内诊检查
- C. 腹部 B 超检查
- D. 肛门检查

## E. 血常规及凝血功能检查

31. 最恰当的处理是

- A. 确诊后即行人工破膜
- B. 卧床休息，吸氧
- C. 期待疗法
- D. 尽快剖宫产术
- E. 人工破膜及静脉滴注缩宫素

32. 25岁，初产妇。妊娠38周，规律宫缩12小时，自然破膜8小时，宫口开大3cm，胎心110次/分，胎心监护有多个晚期减速出现。本例正确处置应是

- A. 急查尿雌激素/肌酐比值
- B. 吸氧、严密观察产程进展
- C. 静注25%葡萄糖液加VitC
- D. 静脉滴注缩宫素，加速产程
- E. 立即行剖宫术

33. 临产已20小时，BP150/100mmHg，宫缩45秒，间隔3分钟，胎心116次/分，S+3，宫口开全，羊水黄绿色，出现频发晚期减速。此时应采取的措施是

- A. 肌注尼可刹米
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 静脉滴注硫酸镁
- D. 产钳术助产
- E. 立即行剖宫产

34. 27岁，经产妇。妊娠39周，双胎妊娠。第一儿枕先露自然分娩，第二儿间隔8分钟臀助产娩出，历经10分钟娩出胎盘，随后阴道流血量达600ml，最可能的诊断是

- A. 副胎盘残留
- B. 胎盘残留
- C. 子宫收缩乏力
- D. 宫颈裂伤
- E. 凝血功能障碍

35. 初孕妇，25岁，妊娠40周。入院前1日出现不规律子宫收缩，入院24小时后静脉滴注缩宫素引产，第一产程5小时，第二产程10分钟，胎儿娩出后2分钟产妇突然出现寒战、咳嗽、发绀，血压60/40mmHg，随后阴道流血不止，立即配血进行抢救。最可能的诊断是

- A. 缩宫素过敏
- B. 羊水栓塞
- C. 急性肺栓塞
- D. 心源性休克
- E. 子宫收缩乏力性出血

(36~37题共用题干)

经产妇，40岁。近2年痛经并逐渐加重，伴经量增多及经期延长，届时需服强镇痛药。查

## 医师资格考试辅导

子宫均匀增大如妊娠8周，质硬，有压痛，经期压痛明显。

36. 痛经逐渐加重的原因，最可能的是

- A. 功能性痛经
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜结核
- D. 子宫内膜癌
- E. 子宫黏膜下肌瘤

37. 本例确诊后的处置应选择

- A. 镇痛药物治疗
- B. 雌激素治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 手术治疗
- E. 放射治疗

38. 女，56岁。阴道脱出肿物2年。妇科检查：阴道前壁膨出，宫颈光滑，用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂

- A. I度轻型
- B. I度重型
- C. II度轻型
- D. II度重型
- E. III度型

39. 女，60岁。阴道脱出物3个月。查体：屏气用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外，宫颈前唇有一溃疡。首选的治疗是

- A. 曼氏手术
- B. 经阴道子宫全切除术
- C. 阴道纵隔形成术
- D. 子宫托
- E. 腹腔镜圆韧带缩短术

(40~42题共用题干)

女，38岁。接触性出血半年。妇科检查：外阴、阴道无异常，宫颈轻度糜烂，触之易出血，子宫正常大小，宫旁组织及双侧附件未触及异常。

40. 首选的检查方法是

- A. 阴道镜检查
- B. LEEP锥切术
- C. 宫颈活检
- D. 宫颈冷刀锥切术
- E. 宫颈细胞学检查

41. 如检查结果为鳞状上皮内高度病变(HSIL)，首选的处理方法是

- A. 阴道镜下活检
- B. 宫颈锥形切除术

## 医师资格考试辅导

- C. 宫颈碘试验
- D. 分段诊刮术
- E. 宫颈细胞学检查

42. 如为宫颈上皮内瘤变Ⅲ级，宜采取的处理方法是

- A. 子宫切除术
- B. 放射治疗
- C. 化学治疗
- D. 宫颈锥形切除术
- E. 随访观察

(43~45 题共用备选答案)

- A. 淋巴转移和种植
- B. 血行转移和淋巴转移
- C. 直接蔓延和种植
- D. 直接蔓延和淋巴转移
- E. 血行转移

43. 子宫颈癌主要播散的方式

44. 卵巢肿瘤主要播散的方式

45. 绒毛膜癌主要播散的方式

46. 不属于宫颈癌淋巴转移一级组的是

- A. 髂内
- B. 髂外
- C. 腹主动脉旁
- D. 宫旁
- E. 闭孔

47. 宫颈癌临床分期Ⅱa 是指

- A. 癌累及阴道，未达阴道下 1/3 段，无明显宫旁浸润
- B. 癌累及宫旁，无明显阴道浸润
- C. 肉眼可见癌灶虽位于宫颈，但体积 >4cm
- D. 癌累及阴道下 1/3 段，无明显宫旁浸润
- E. 癌累及宫旁，间质浸润深度 3~5mm

48. 普查宫颈癌时，最有实用价值的检查方法是

- A. 阴道镜检查
- B. 妇科三合诊检查
- C. 宫颈碘试验
- D. 宫颈刮片细胞学检查
- E. 宫颈活组织检查

## 医师资格考试辅导

49. 女性，40岁。不规则阴道流血3个月。妇科检查：宫颈呈菜花样，约5cm×4cm×4cm大小，质脆易出血。三合诊左侧主韧带结节状增粗，已达盆壁。宫颈活检示鳞状细胞癌。合适的治疗是

- A. 宫颈癌根治术
- B. 化疗
- C. 化疗后行宫颈癌根治术
- D. 放疗
- E. 宫颈癌根治术后加化疗

50. 按现行FIGO（2009）的子宫内膜癌手术分期标准，II期是

- A. 侵犯肌层 $\geq 1/2$
- B. 累及宫颈黏膜腺体
- C. 侵犯宫颈间质
- D. 侵犯子宫浆膜层
- E. 盆腔淋巴结或阴道转移

（51~53题共用题干）

女，62岁。绝经11年，阴道反复流血4个月就诊。查体：肥胖，一般情况好，血压150/105mmHg。妇科检查：阴道少许血液，宫颈光滑，子宫正常大，双附件正常。

51. 最可能的诊断是

- A. 子宫颈癌
- B. 老年性子宫内膜炎
- C. 子宫内膜息肉
- D. 老年性阴道炎
- E. 子宫内膜癌

52. 确诊的最佳方法是

- A. 宫腔涂片细胞学检查
- B. 宫颈管细胞学检查
- C. 宫颈活检
- D. 宫腔镜检查
- E. 子宫分段诊刮

53. 下列哪项是首选的辅助检查

- A. 经阴道B超检查
- B. 阴道镜检查
- C. 阴道涂片细胞学检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 后穹窿穿刺检查

54. 卵巢肿瘤患者盆腔X线平片显示牙齿及骨骼提示

- A. 畸胎瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 纤维瘤

## 医师资格考试辅导

- D. 卵巢膜细胞瘤
- E. 颗粒细胞瘤

55. 滴虫阴道炎最常见的传播途径是

- A. 性直接接触感染
- B. 经血循环感染
- C. 间接接触感染
- D. 内源性感染
- E. 经淋巴循环感染

56. 甾体激素避孕药的避孕机理不包括

- A. 影响输卵管生理功能
- B. 改变宫颈黏液的性状
- C. 抑制排卵
- D. 阻止精子与卵子的结合
- E. 改变子宫内膜形态与功能

57. 细菌性阴道病的诊断标准不包括

- A. 阴道分泌物增多伴外阴瘙痒
- B. 匀质、稀薄、灰白色阴道分泌物
- C. 线索细胞阳性
- D. 阴道分泌物 pH 值  $>4.5$
- E. 胺臭味试验阳性

58. 关于妊娠滋养细胞肿瘤的发生，正确的是

- A. 侵蚀性葡萄胎可继发于流产后
- B. 侵蚀性葡萄胎不会发生子宫外转移
- C. 侵蚀性葡萄胎多继发于葡萄胎清宫后 1 年以上
- D. 绝经后妇女不会发生绒毛膜癌
- E. 绒毛膜癌可继发于足月妊娠或异位妊娠后

59. 有关Ⅲ度胎盘早剥的描述，正确的是

- A. 阴道流血量与贫血程度呈正比
- B. 易导致凝血功能障碍
- C. 胎盘剥离面为胎盘面积的  $1/5$
- D. 出现无原因无痛性阴道流血
- E. 一般胎儿存活

60. 女，53 岁。接触性出血 1 个月。妇科检查：宫颈后唇有一菜花样新生物，接触性出血阳性，宫体正常大小，附件 (-)。该患者最可能的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 急性宫颈炎
- C. 宫颈肌瘤
- D. 宫颈癌

E. 慢性宫颈炎

61. 初孕妇，26岁。妊娠38周。查体：P 90次/分，R 18次/分，BP 120/80mmHg，叩诊心浊音界稍向左扩大，心尖部闻及2/6级收缩期吹风样杂音，踝部轻度水肿。最可能的诊断是

- A. 妊娠期高血压疾病性心脏病
- B. 风湿性心脏病合并妊娠
- C. 心脏病合并妊娠，性质待查
- D. 正常妊娠改变
- E. 围生期心肌病

62. 女，65岁。不规则阴道流血1年余。有高血压、糖尿病病史3年。BMI 28，B超发现宫腔内2.0cm×2.5cm占位性病变，有丰富血流，血流阻力指数为0.36，如宫腔内膜活检确诊后，首选的治疗措施是

- A. 生物治疗
- B. 手术治疗
- C. 激素治疗
- D. 化学药物治疗
- E. 放射治疗

63. 初孕妇，24岁，妊娠39周。腹痛2天，加剧1小时。查体：BP 130/90mmHg，心率106次/分。下腹拒按，阴道口可见胎儿上肢，胎心音消失。导尿呈淡红色。首选的处理措施是

- A. 行毁胎术
- B. 内倒转后臀牵引
- C. 行胎头吸引术
- D. 立即剖宫产
- E. 行产钳助产术

64. 初产妇，29岁。妊娠41周，枕右前位，骨盆测量正常，宫口开全1小时，胎心88次/分，胎头S+3。在吸氧同时，最恰当的处理措施是

- A. 应用前列腺素加强宫缩
- B. 等待自然分娩
- C. 立即行剖宫产术
- D. 产钳助产术
- E. 静脉滴注缩宫素

65. 女，32岁。停经90天，阴道不规则流血6天，下腹隐痛，妇科检查：宫底平脐，质软，未触及胎体，未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。应首先考虑的诊断是

- A. 羊水过多
- B. 先兆流产
- C. 死胎
- D. 葡萄胎
- E. 稽留流产

66. 初产妇，27岁。妊娠40周，规律宫缩12小时，产科检查：胎头高浮，宫口开大3cm，

## 医师资格考试辅导

胎头枕骨靠近骶岬，胎心 140 次/分。最恰当的处理措施是

- A. 静脉滴注地诺前列酮
- B. 尽早行剖宫产术
- C. 等待宫口开全产钳助娩
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 等待经阴道分娩

67. 初孕妇，24 岁。妊娠 38 周。既往血压正常。5 天前突觉头痛且逐渐加重。BP 166/112mmHg，双下肢水肿（++）。24 小时尿蛋白 5g，血细胞比容 0.42，此时首选的处理是

- A. 硫酸镁缓慢静脉注射
- B. 呋塞米静脉注射
- C. 硝普钠静脉滴注
- D. 头颅 CT 检查
- E. 立即行剖宫产术

（68~69 题共用备选答案）

- A. 宫缩时胎头受压
- B. 胎儿受镇静药物影响
- C. 宫缩时脐带受压，兴奋迷走神经
- D. 胎儿缺氧
- E. 胎儿状况良好

68. 胎心减速出现在宫缩高峰后，下降慢，持续时间长，恢复慢，临床提示的情况是

69. 胎心率减速与宫缩无固定关系，下降迅速且下降幅度大，恢复也迅速，临床提示的情况是

70. 符合产褥期正常临床表现的是

- A. 血性恶露持续 1 个月
- B. 产后 24 小时有  $<39^{\circ}\text{C}$  的泌乳热
- C. 产后呼吸浅快、脉搏缓慢
- D. 产后 5~7 日出现宫缩痛
- E. 宫底在产后第一日略上升至脐平

71. 初孕妇，23 岁，孕 38 周。规律宫缩 10 小时就诊，查体：胎心率 136 次/分，宫口开大 8cm，胎头+2。胎膜未破。正确的处理措施是

- A. 人工破膜并静注宫缩素
- B. 5 单位的缩宫素静滴
- C. 立刻行剖宫产术
- D. 继续观察产程
- E. 100mg 哌替啶静注

72. 女，36 岁。月经稀发 3 年。停经 1 年。实验室检查：血 FSH48U/L，雌激素 10pg/ml。最可能的诊断为

- A. 子宫内膜不规则脱落

## 医师资格考试辅导

- B. 卵巢早衰
- C. 黄体功能不足
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 子宫内膜异位症

73. 关于妊娠母体内分泌系统的改变正确的是

- A. 皮质醇减少
- B. 催乳激素增多
- C. 卵泡刺激素增多
- D. 游离甲状腺激素增多
- E. 黄体生成素增多

(74~75 题共用题干)

女, 18 岁。月经不规律 2 年, 阴道大量流血 2 周, 贫血貌。B 超示子宫及双侧附件未见异常, 血 FSH、LH、T、PRL 水平正常。

74. 该患者最可能的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 卵巢功能性肿瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 功能失调性子宫出血
- E. 多囊卵巢综合征

75. 经过治疗止血并撤退性出血后, 应采用的治疗是

- A. 氯米芬促排卵治疗
- B. 雌孕激素序贯疗法
- C. 雌激素治疗
- D. 孕激素治疗
- E. 雄激素治疗

(76~77 题共用题干)

女, 26 岁, 人流后 5 个月, 阴道不规则出血 20 天, 伴头晕、乏力 3 天, 近 2 天, 出现胸痛、咯血, 妇科检查: 子宫孕 7 周大小, 质软, 有轻度压痛, 双侧可触及囊性肿物, 直径均约 5cm 大小, 胸部 X 线片提示双下肺多发圆形结节影。

76. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 痰细胞学检查
- B. 血常规
- C. B 超
- D. 血  $\beta$ -hCG
- E. 诊断性刮宫

77. 确诊后首选的治疗方法是

- A. 子宫切除术
- B. 化疗
- C. 内分泌治疗

- D. 放疗
- E. 子宫切除术+双侧附件切除术

(78~79 题共用题干)

女, 26 岁。人工流产术后 1 周, 发热 5 天, 下腹痛 3 天。查体: T 39.2℃, P 105 次/分, BP 105/70mmHg。妇科检查: 宫颈口腺性分泌物, 宫颈举痛 (+), 子宫正常大小, 压痛明显, 双附件稍增厚, 压痛 (+), 右侧为重。血 WBC  $14 \times 10^9/L$ , N 0.90。

78. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性盆腔炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 异位妊娠破裂
- E. 流产不全

79. 对治疗最有价值的辅助检查项目是

- A. 尿妊娠试验
- B. 病原体检查
- C. 血常规
- D. 盆腔 B 超
- E. 尿常规

80. 女, 35 岁。白带增多伴外阴瘙痒 1 月余, 妇科检查: 宫颈散在红色斑点, 后穹隆有多量稀薄脓性泡沫状分泌物。其最可能感染的病原菌是

- A. 厌氧菌
- B. 白色念珠菌
- C. 淋菌
- D. 加德纳菌
- E. 阴道毛滴虫

(81~82 题共用题干)

女, 58 岁。腹胀、食欲不振 1 月余。G2P2。自消化内科转来。查体: 腹部膨隆, 移动性浊音 (+)。妇科检查: 阴道后穹隆可触及散在结节, 无触痛, 子宫后位, 大小正常, 子宫左后方可触及质硬包块, 边界及大小欠清。血 CA125 为 1865U/ml。

81. 首先应考虑的诊断是

- A. 卵巢上皮性癌
- B. 无性细胞瘤
- C. 盆腔炎性包块
- D. 转移性卵巢肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

82. 术后拟给予药物治疗, 最适合的是

- A. 化疗药物
- B. 孕激素类药物
- C. 抗生素

D. 胸腺肽

E. GnRH- $\alpha$