

临床医学综合题目（50 题）

1. 肺癌常见的症状是

- A. 脓性痰
- B. 白色泡沫样痰
- C. 刺激性咳嗽和血痰
- D. 胸闷、干咳
- E. 肺部干啰音



2. 原发型肺结核好发人群

- A. 婴幼儿教育网
www.med66.com
- B. 老年人
- C. 青壮年
- D. 育龄妇女
- E. 少年儿童



3. 关于肺结核描述错误的是

- A. 严重危害人类健康
- B. 以飞沫传播网
www.med66.com
- C. 传染源主要是继发性肺结核的患者
- D. 尚不可治愈
- E. 结核分枝杆菌是结核病的病原菌



4. 呼吸衰竭描述错误的是

- A. 肺换气功能严重障碍
- B. 静息状态下能维持足够的气体交换
- C. 可出现低氧血症
- D. 可不伴发高碳酸血症
- E. 伴发高碳酸血症



5. 慢性支气管炎相关描述错误的是

- A. 每年发病 3 个月，连续 2 年或 2 年以上
- B. 咳嗽以夜间为主
- C. 喘息
- D. 反复咳嗽、咳痰
- E. 咳白色泡沫样或黏稠痰

6. 心肌梗死症状中最先出现下列哪一项

- A. 发热
- B. 疼痛
- C. 恶心呕吐
- D. 呼吸困难
- E. 昏厥

7. 抢救左心衰急性肺水肿时，下列措施中错误的是

- A. 取下肢下垂坐位
- B. 静脉注射毛花苷 C
- C. 低流量间断给氧
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 安慰患者，稳定情绪

8. 休克代偿期的临床表现是

- A. 血压稍低、脉快、脉压缩小
- B. 血压正常、脉细速、脉压缩小
- C. 血压稍低、脉快、脉压正常
- D. 血压稍升高、脉搏无变化、脉压缩小
- E. 血压稍升高、脉快、脉压缩小

9. 原发性高血压特点不包括

- A. 血压随季节变化而变化
- B. 血压随昼夜变化而变化
- C. 冬季血压较高
- D. 一般夜间血压较高
- E. 清晨起床前未活动时血压最低

10. 感染性心内膜炎最常见的并发症是

- A. 脑栓塞
- B. 细菌性动脉瘤破裂
- C. 心力衰竭
- D. 肾功能不全
- E. 脾破裂

11. 消化性溃疡引起的疼痛，以何者最具特征性

- A. 中上腹疼痛
- B. 饥饿性疼痛
- C. 反复发作性疼痛
- D. 节律性疼痛
- E. 长期疼痛

12. 下列哪项对诊断消化性溃疡意义最大

- A. 钡餐透视局部有压痛、激惹、变形
- B. 钡餐透视有龛影
- C. 胃液分析为高胃酸
- D. 多年周期性腹痛
- E. 上腹部压痛

13. 对鉴别上、下尿路感染最有意义的是

- A. 中段尿细菌培养阳性

- B. 尿路刺激症状
- C. 畏寒、发热、腰痛
- D. 血尿

E. 尿中白细胞管型



14. 哪项表现对诊断尿路感染最有意义

- A. 畏寒、发热、白细胞增高
- B. 尿频、尿急、尿痛
- C. 尿培养细菌计数 $>10^5/ml$
- D. 清洁中段尿白细胞 >5 个/视野
- E. 尿亚硝酸盐还原试验阳性

15. 我国慢性肾功能衰竭病因中哪种占首位

- A. 高血压肾小动脉硬化
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 小管间质性肾病
- D. 继发性肾小球疾病
- E. 原发性肾小球肾炎


16. 对慢性肾小球肾炎患者不宜采取哪项措施

- A. 低钠饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低蛋白饮食
- D. 积极控制血压
- E. 低磷饮食

17. 月经后3~7天，下列哪项检查或治疗不适当


- A. 取子宫内膜检查，确定是否有分泌期改变
- B. 放置节育器

- C. 腹腔镜
- D. 剖腹探查术
- E. 子宫输卵管造影术



18. 激素避孕使用的药物成分主要是

- A. 雄激素
- B. 醛固酮
- C. 胰岛素
- D. 促性腺激素释放激素



19. 妇女一生各阶段生理特点，下列哪项正确

- A. 儿童期体格与内外生殖器同时发育
- B. 新生女婴少量阴道流血警惕先天恶性肿瘤
- C. 第一性征的出现，标志青春期开始
- D. 月经初潮标志卵巢功能成熟为性成熟的开始
- E. 绝经后的生命时期为绝经后期



20. 女性卵巢功能成熟，生育能力旺盛的时期是

- A. 幼年期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 更年期
- E. 老年期

21. 排卵发生在

- A. 本次月经第一天的 14 日后
- B. 月经周期的正中间
- C. 下次月经来潮前 14 日左右



- D. 下次月经来潮前 12 日左右
- E. 本次月经结束后的第 14 日左右

22. 妇女妊娠 40 周，正常的羊水量为

A. 300ml

B. 400ml

C. 800ml

D. 1000ml

E. 1200ml



23. DIC 的临床表现不包括

A. 出血

B. 微血管拴塞

C. 休克

D. 循环障碍

E. 血糖升高



24. 年轻女性月经增多，疑有缺铁性贫血，哪项检查最有诊断意义

A. 血清铁降低

B. 总铁结合力增高

C. 血清可溶性转铁蛋白受体降低

D. 游离原卟啉降低

E. 铁盐吸收降低



25. 血友病的特征不包括

A. 阳性家族史

B. 发病较晚

C. 自发或轻度外伤后出血不止

D. 血肿形成



E. 关节出血

26. 不属于血友病出血引起症状的是

- A. 局部疼痛、麻木
- B. 肌肉萎缩
- C. 局部缺血性坏死
- D. 呼吸困难
- E. 昏迷

27. 以下关于低钾血症的主要病因，叙述错误的是

- A. 应用呋塞米等利尿剂
- B. 大量呕吐
- C. 静脉营养液中钾盐补充不足
- D. 钾向组织细胞外转移
- E. 长期进食不足

28. 代谢性酸中毒的常见原因中，下列哪项是错误的

- A. 急性腹膜炎
- B. 休克
- C. 长期禁食
- D. 长期反复呕吐
- E. 急性肾功能衰竭

29. 下列哪项不是代谢性酸中毒的临床表现

- A. 呼吸深而快
- B. 呼气中带有酮味
- C. 面部潮红
- D. 脉搏加速
- E. 耳前叩击试验阳性

30. 轻度高渗性缺水的主要症状是

A. 幻觉

B. 嗜睡

C. 恶心

D. 口渴

E. 心悸



31. 仅具有幻觉、妄想或明显的精神运动兴奋或意志等“精神病性症状”的精神障碍，称为

A. 精神病

B. 神经病

C. 心身疾病

D. 妄想症

E. 精神分裂症



32. 脑出血主要的病因是


A. 大动脉粥样硬化

B. 小动脉粥样硬化

C. 心源性栓塞

D. 高血压

E. 颅内动脉粥样硬化



33. 脊髓灰质炎混和疫苗在一岁以内应接种几次

A. 1 次

B. 2 次

C. 3 次

D. 4 次

E. 5 次



34. 维生素最主要的特点是

- A. 不提供热量
- B. 维持人体正常生长发育、调节身体各种功能
- C. 人体需要量很少
- D. 人体不能合成或合成量很少，必须由食物供给
- E. 是机体的组成成分

35. 宏量营养素不包括

- A. 糖类
- B. 脂类
- C. 蛋白质
- D. 维生素
- E. 碳水化合物

36. 下列有关小儿骨骼发育的叙述中正确的是

- A. 前囟最晚闭合的年龄为 10 个月
- B. 后囟一般闭合的年龄在出生后 2 周
- C. 骨缝一般闭合的年龄为 2 个月
- D. 6 个月小儿出现第三个生理弯曲
- E. 1~9 岁儿童腕部骨化中心的数目约为小儿的年龄加 1

37. 前囟饱满、紧张、隆起，常表示

- A. 甲状腺功能减退
- B. 佝偻病
- C. 脱水
- D. 头小畸形
- E. 颅内压增高

38.一般类型急性上呼吸道感染，其病程一般约为

A. 1~3 天

B. 3~5 天

C. 5~7 天

D. 7~9 天

E. 9~14 天

39. 婴儿出生后 4~6 个月每月增长约

A. 200~300g

B. 300~400g

C. 500~600g

D. 700~800g

E. 800~1000g

40. 生理性体重下降的范围一般是出生体重的

A. 1%~5%

B. 3%~9%

C. 5%~10%

D. 10%~15%

E. 15%~20%

41. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是

A. 非特异性的神经兴奋性增高

B. 出牙延迟

C. 腕踝畸形

D. 下肢畸形

E. 颅骨软化

42. 佝偻病初期长骨 X 线表现为

- A. 骨骺软骨明显增宽
- B. 干骺端临时钙化带模糊
- C. 骨质普遍稀疏
- D. 有明显变化
- E. 骨干弯曲

43. 人工喂养较母乳喂养更易发生佝偻病最主要的原因是

- A. 食物中含磷低
- B. 食物中含钙低
- C. 钙磷比例不当
- D. 维生素 D 含量少
- E. 日光照射不足

44. 急性重型肝炎临床表现描述有误的是

- A. 黄疸加深
- B. 肾功能障碍
- C. 有出血倾向
- D. 少量腹水
- E. 两周后出现肝性脑病

45. 对细菌性痢疾来说哪项是对的

- A. 潜伏期 1~2 天
- B. 近年来在临幊上很少见
- C. 粪便中有大量单核细胞
- D. 通常结肠与小肠均有炎症
- E. 治疗菌痢，首选氯霉素

46. 菌痢流行间歇期间的重要传染源是

- A. 急性期病人

- B. 轻症病人
- C. 重症病人
- D. 急性恢复期病人
- E. 慢性病人和带菌者



47. 传染病的基本特征为

- A. 有传染源、传播途径、免疫性
- B. 有传染源、传染性、易感人群
- C. 有病原体、有传染性、有流行病学特征、有感染后免疫
- D. 有病原体、流行性、易感性
- E. 有传染性、流行性、免疫性



48. 关于Ⅲ度烧伤，下列哪项是错误的

- A. 痛觉丧失
- B. 无水疱
- C. 无栓塞状血管
- D. 焦痂约3周后开始分离



49. 大面积烧伤48h内最主要的全身改变指

- A. 创伤性休克
- B. 低血容量休克
- C. 毒血症
- D. 创面脓毒症
- E. 急性肾功能衰竭



50. 破伤风病人的治疗原则是

- A. 预防和抢救休克
- B. 早期气管切开术



- C. 清除毒素来源、中和毒素、控制和解痉治疗
- D. 高压氧治疗
- E. 应用破伤风类毒素



临床医学综合答案及解析

1. 【正确答案】C

【答案解析】肺癌常见的症状是刺激性咳嗽和血痰。刺激性咳嗽是癌肿在较大的支气管内生长引起，血痰为痰中带点血丝或断续少量咯血。


本题知识点：肺癌



2. 【正确答案】E

【答案解析】原发型肺结核：包括原发综合征及胸内淋巴结结核。多见于少年儿童，无症状或症状轻微，多有结核病家庭接触史，结核菌素试验多为强阳性。


本题知识点：肺结核



3. 【正确答案】D

【答案解析】肺结核至今仍然是严重危害人类健康的主要传染病。结核分枝杆菌是结核病的病原菌，传染源主要是继发性肺结核的患者，尤其是那些未被发现和未给予治疗管理或治疗不合理的涂片病原菌阳性患者，通过咳嗽、喷嚏等方式把含有结核分枝杆菌的微滴排到空气中而由飞沫传播。经过化学药物和其他的一系列手段，肺结核是可以治愈的。


本题知识点：肺结核



4. 【正确答案】B

【答案解析】呼吸衰竭是指各种原因引起的肺通气和（或）换气功能严重障碍，以致在静息状态下亦不能维持足够的气体交换，导致低氧血症伴（或不伴）高碳酸血症，进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征。

本题知识点：呼吸衰竭



5. 【正确答案】B

【答案解析】慢性支气管炎是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。依据咳嗽、咳痰或伴喘息，每年发病3个月，连续2年或2年以上，排除其他慢性气道疾病即可诊断。咳嗽以晨间为主，咳白色泡沫样或黏稠痰，偶有咯血，多为痰中带血。

本题知识点：慢性支气管炎

6. 【正确答案】B

【答案解析】发生心肌梗死时，患者多表现为胸骨后或心前区持续、剧烈压榨样闷痛。可有出汗、恶心、呕吐、等伴随症状，部分患者有濒死感。

本题知识点：冠状动脉粥样硬化性心脏病

7. 【正确答案】C

【答案解析】抢救左心衰急性肺水肿时的给氧方法是高流量鼻管给氧或加压给氧。

本题知识点：心力衰竭

8. 【正确答案】E

【答案解析】休克代偿期：者表现为精神紧张、兴奋或烦躁不安、面色苍白、手足湿冷、心率加速、过度换气等血压正常或稍高，反映小动脉收缩情况的舒张压升高，故脉压缩小尿量正常或减少。若处理及时、得当，休克可得到纠正。否则病情继续发展，便进入休克抑制期。

本题知识点：休克

9. 【正确答案】D


【答案解析】原发性高血压体征：血压随季节、昼夜、情绪等因素有较大波动。冬季血压较高，夏季较低；血压有明显昼夜波动，一般夜间血压较低，清晨起床未活动时血压最低，活动后血压迅速升高，形成清晨血压高峰。患者在家中的自测血压值往往低于诊所血压值。

本题知识点：原发性高血压

10. 【正确答案】C

【答案解析】感染性心内膜炎最常见的并发症是心力衰竭，主要有瓣膜关闭不全所致，主动脉瓣受损者最常发生(75%)，其次为二尖瓣(50%)和三尖瓣(19%)；瓣膜穿孔或者腱索断裂导致急性瓣膜关闭不全时可诱发急性左心衰竭。

本题知识点：自体瓣膜感染性心内膜炎



11. 【正确答案】D

【答案解析】慢性病程、周期性发作的节律性上腹疼痛是诊断消化性溃疡的重要线索，但是确诊有赖于胃镜检查。

本题知识点：消化性溃疡

12. 【正确答案】B

【答案解析】慢性病程、周期性发作的节律性上腹疼痛是诊断消化性溃疡的重要线索，确诊有赖于胃镜检查。X线钡餐检查发现龛影亦有确诊价值。

本题知识点：消化性溃疡



13. 【正确答案】E

【答案解析】畏寒、发热、腰痛和尿中白细胞管型都属于有意义的鉴别，选择最佳的选项应该是尿中白细胞管型。

本题知识点：急性肾盂肾炎、尿路结石

14. 【正确答案】C

【答案解析】真性菌尿的标准：①新鲜中段尿沉渣革兰氏染色油镜观察，细菌 >1 个/视野；②新鲜中段尿细菌培养计数 $\geq 10^5/ml$ ；③膀胱穿刺尿培养阳性。

15. 【正确答案】E

【答案解析】在我国最常见引起慢性肾衰竭的病因按顺序为原发性慢性肾小球肾炎、糖尿病肾病和高血压肾小球动脉硬化。

本题知识点：急性肾盂肾炎、尿路结石及慢性肾衰竭




16. 【正确答案】B




【答案解析】慢性肾小球肾炎时要求饮食限盐，肾功能不全者还应控制蛋白摄入量及限磷；积极控制血压；避免劳累、感染、妊娠及应用肾毒性药物。

本题知识点：慢性肾小球肾炎、肾病综合征



17. 【正确答案】A



【答案解析】月经后 3~7 天和月经第 5~6 天，不是同一个时期，月经后 3~7 天已经是月经周期的 9~13 天了。此时，子宫内膜是增生期。而且不是这个时期也不是子宫内膜不规则脱落取内膜检查的时期。

本题知识点：功能失调性子宫出血



18. 【正确答案】E

【答案解析】激素避孕使用的成分是雌激素和孕激素。



19. 【正确答案】E

【答案解析】妇女一生划分为胎儿期、新生儿期、儿童期、青春期、性成熟期、绝经过渡期和绝经后期 7 阶段。其中在新生儿期（出生后 4 周内）少量阴道出血属正常现象。儿童期（出生后 4 周~12 岁左右）生殖器呈幼稚型。青春期（10~19 岁）第二性征发育标志青春期开始。月经初潮为青春期的重要标志。绝经后期是指绝经后的生命时期。

本题知识点：女性生殖系统生理



20. 【正确答案】C



【答案解析】性成熟期是卵巢生殖功能与内分泌功能最旺盛时期。18岁开始，历时约30年，此期卵巢功能成熟，出现周期性排卵。生殖器官各部及乳房，在卵巢分泌的性激素作用下发生周期性变化。

本题知识点：女性生殖系统生理

医学教育网
www.med66.com

21. 【正确答案】C

【答案解析】排卵多发生在下次月经来潮前14日左右。

本题知识点：女性生殖系统生理

医学教育网
www.med66.com

22. 【正确答案】C

【答案解析】正常羊水量：母儿间的液体交换，主要通过胎盘，每小时约3600ml。母体与羊水的交换，主要通过胎膜，每小时约400ml，以保持羊水量相对恒定。

正常羊水量：①妊娠8周：5~10ml；②妊娠10周：约30ml；③妊娠20周：约400ml；④妊娠38周：约1000ml；⑤妊娠40周：约800ml；⑥过期妊娠羊水量明显减少至300ml以下。

本题知识点：妊娠生理

医学教育网
www.med66.com

23. 【正确答案】E

医学教育网
www.med66.com

【答案解析】DIC除去原发疾病的临床表现外，主要临床表现包括：自发性持续多部位出血；微血管栓塞；休克或者微循环障碍；微血管病性溶血。

本题知识点：弥散性血管内凝血（DIC）

医学教育网
www.med66.com

医学教育网
www.med66.com

24. 【正确答案】C

【答案解析】血清可溶性转铁蛋白受体（sTfR）测定是迄今反应缺铁性红细胞生成的最佳指标，一般sTfR浓度 $>26.5\text{nmol/L}$ （ $2.25\mu\text{g/ml}$ ）可诊断缺铁。

本题知识点：贫血概论及缺铁性贫血

医学教育网
www.med66.com

25. 【正确答案】B

【答案解析】血友病是一组因遗传性凝血活酶生成障碍引起的出血性疾病。以阳性家族史、幼年发病(生之具有，伴随终身)、自发或轻度外伤后出血不止、血肿形成及关节出血为特征。

本题知识点：血友病

医学教育网
www.med66.com

26. 【正确答案】E

【答案解析】血友病临床表现为出血血肿压迫症状明显，随部位不同有不同表现，血肿压迫周围神经可致局部疼痛、麻木及肌肉萎缩；压迫血管可致相应供血部位缺血性坏死或淤血、水肿；口腔底部、咽后壁、喉部及颈部出血可致呼吸困难甚至窒息；压迫输尿管致排尿困难；腹膜后出血可引起麻痹性肠梗阻。

本题知识点：血友病

医学教育网
www.med66.com

27. 【正确答案】D

【答案解析】低钾血症的主要病因有：①长期进食不足；②应用呋塞米和利尿酸（依他尼酸）等利尿；③补液患者长期接受不含钾盐的液体，或静脉营养液中钾盐补充不足；④呕吐、持续胃肠减压、禁食、肠瘘；⑤钾向组织细胞内转移。

本题知识点：低钾血症及代谢性酸中毒

医学教育网
www.med66.com

医学教育网
www.med66.com

28. 【正确答案】D

【答案解析】代谢性酸中毒的病因：①碱性物质丢失过多，多见于腹泻、肠瘘、胆瘘和胰瘘或者应用碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）导致 HCO_3^- 减少；②酸性物质产生过多，失血性及感染性休克致急性循环衰竭、组织缺血缺氧，可使丙酮酸及乳酸大量产生，发生乳酸性酸中毒。糖尿病或长期禁食体内脂肪分解形成大量酮体引起酮症酸中毒；③急性肾功能衰竭导致内生 H^+ 不能排出体外，或 HCO_3^- 吸收减少，均可导致酸中毒。


本题知识点：低钾血症及代谢性酸中毒

医学教育网
www.med66.com

医学教育网
www.med66.com

29. 【正确答案】E

【答案解析】轻度代谢性酸中毒可无明显症状。重症病人可有疲乏、眩晕、嗜睡。可有感觉迟钝或烦躁。最明显的表现是呼吸变得又深又快，呼吸肌收缩明显。呼气带有酮味。病人面颊潮红，心率加快，血压常偏低。可出现腱反射减弱或消失、神智不清或者昏迷。




本题知识点：低钾血症及代酸



30. 【正确答案】D

【答案解析】高渗性缺水缺水程度不同，症状亦不相同。轻度缺水者除口渴外，无其他症状，缺水量为体重的2%~4%。



本题知识点：水和钠的代谢紊乱



31. 【正确答案】A

【答案解析】精神病特指具有幻觉、妄想或明显的精神运动兴奋或抑制等“精神病性症状”的精神障碍，只是精神障碍中的一小部分。

本题知识点：精神障碍概述



32. 【正确答案】D

【答案解析】脑出血的主要原因是高血压（出血主要位于基底节区和脑干、小脑）以及增龄（老年人脑叶出血多因脑淀粉样血管病所致）。

本题知识点：脑卒中

33. 【正确答案】C

【答案解析】2个月时脊髓灰质炎三型混合疫苗（第1次）。3个月时脊髓灰质炎三型混合疫苗（第2次）。4个月时脊髓灰质炎三型混合疫苗（第3次）。

本题知识点：儿童保健原则

34. 【正确答案】D

【答案解析】维生素需要量虽极小，但大多数不能在体内合成（维生素D、维生素K及部分维生素B除外），必须由食物中获得。



本题知识点：儿童营养基础

35. 【正确答案】D

【答案解析】碳水化合物包括单糖（葡萄糖、双糖）和多糖，为供能的主要来源，属于宏量营养素。营养素分为：宏量营养素（糖类，蛋白质，脂类）；微量营养素（矿物质，包括常量元素和微量元素；维生素）；以及其他膳食成分（膳食纤维，水）。

本题知识点：儿童营养基础



36. 【正确答案】E

【答案解析】前囟出生时约 1.0~2.0cm，1~2 岁时闭合。后囟一般于生后 6~8 周时闭合。骨缝一般于生后 3~4 个月时闭合。6 个月小儿能坐时出现胸椎后凸（第二个生理弯曲）。1~9 岁儿童骨龄简易计算法：腕部骨化中心的数目约为小儿的年龄加 1。

本题知识点：骨骼发育



37. 【正确答案】E

【答案解析】前囟饱满、紧张、隆起，常表示颅内压增高，是婴儿脑膜炎、脑炎或脑积水等重要体征之一；前囟凹陷常见于脱水或极度消瘦患儿。

本题知识点：骨骼发育

38. 【正确答案】B

【答案解析】一般类型急性上呼吸道感染，其病程一般约为 3~5 天。


本题知识点：急性上呼吸道感染



39. 【正确答案】C

【答案解析】婴儿出生后前 3 个月每月增长 700~800g，4~6 个月每月增长 500~600g，后半年（7~12 个月）每月增长 300~400g。

本题知识点：体格生长常用指标



40. 【正确答案】B

【答案解析】由于哺乳量的不足、不显性失水、排尿及排出胎便，出生后 3~4 日内有生理性体重下降，约下降原有体重的 3%~9%，至 7~10 日体重逐渐恢复至出生时的体重。

本题知识点：体格生长常用指标

41. 【正确答案】A

【答案解析】初期（早期）多见于 6 个月以内，特别是<3 个月的婴儿，主要表现为非特异性的神经兴奋性增高症状，如易激惹，烦躁，睡眠不安，夜间惊啼，多汗（与季节无关），枕秃（因烦躁及头部多汗致婴儿常摇头擦枕）。

本题知识点：维生素 D 缺乏性佝偻病

42. 【正确答案】B

【答案解析】初期（早期）血钙正常或稍低，血磷低，钙磷乘积稍低（30~40），血清 25-(OH)D₃ 下降，碱性磷酸酶正常或增高。此期无骨骼改变，X 线片检查多正常，或仅见临时钙化带模糊。

本题知识点：维生素 D 缺乏性佝偻病

43. 【正确答案】C

【答案解析】食物中钙、磷含量过低或比例不当：食物中钙磷比例直接影响钙、磷的吸收，母乳钙磷比例适宜（2:1），钙的吸收率较高；而牛乳钙磷含量虽高于人乳，但钙磷比例不当（1.2:1），钙的吸收率较低，故人工喂养者更易发生佝偻病。

本题知识点：维生素 D 缺乏性佝偻病

44. 【正确答案】E

【答案解析】急性重型肝炎临床表现：既往无同型肝炎病史，起病甚急，可有发热、食欲缺乏、恶心、频繁呕吐、极度乏力等明显的消化道及全身中毒症状；

黄疸逐渐加深；肝脏进行性缩小；有出血倾向、中毒性鼓肠、肝臭、少量腹水、急性肾衰竭（肝肾综合征）；起病 14 日以内出现不同程度的肝性脑病（Ⅱ～Ⅴ度）表现；凝血酶原活动度低于 40%。

本题知识点：病毒性肝炎

 医学教育网
www.med66.com

45. 【正确答案】A

【答案解析】B 选项：多见。C 选项：镜检有大量脓细胞、红细胞与巨噬细胞。D 选项：细菌性痢疾病变部位主要发生于大肠，尤以乙状结肠和直肠为重。E 选项：首选喹诺酮类。

本题知识点：细菌性痢疾

 医学教育网
www.med66.com

46. 【正确答案】E

【答案解析】菌痢的传染源主要为急性、慢性菌痢病人及带菌者。慢性菌痢病情迁延不愈，排菌量虽然较少，但持续时间长，提示慢性菌痢患者有长期储存病原体的作用，而且在春季复发较多，对这个阶段维持流行过程起了重要作用。

本题知识点：细菌性痢疾

47. 【正确答案】C

【答案解析】传染病的基本特征：有病原体；有传染性；有流行病学特征（流行性、地方性、季节性）；有感染后免疫。

本题知识点：传染病总论

48. 【正确答案】C

【答案解析】Ⅲ°烧伤：使全皮层烧伤甚至达到皮下、肌肉或骨骼。创面无水疱，呈蜡白或焦黄色甚至炭化，痛觉消失，局部温度低，皮层凝固性坏死后形成焦痂，触之如皮革，痂下可显树枝状栓塞的血管。因皮肤及其附件已全部烧毁，无上皮再生的来源，必须靠植皮而愈合。

本题知识点：火器伤、热烧伤

49. 【正确答案】B

【答案解析】烧伤面积较大，尤其是抢救不及时或不当，会造成人体不足以代偿迅速发生的体液丧失，循环血量下降，导致低血容量性休克的发生。

本题知识点：火器伤、热烧伤

 医学教育网
www.med66.com

50. 【正确答案】C

【答案解析】破伤风是一种极为严重的疾病，死亡率极高，为此应该采取积极的综合治疗措施，包括清除毒素来源，中和游离毒素，控制和解除痉挛，保持呼吸道畅通和防止并发症等原则。其他为具体操作措施。

本题知识点：特殊性感染

 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com 医学教育网
www.med66.com