

全科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 14 期

问题索引：

一、【问题】子宫颈癌的临床表现和诊断要点？

二、【问题】葡萄胎的诊断要点？

三、【问题】葡萄胎的处理要点？

具体解答：

一、【问题】子宫颈癌的诊断要点？

【解答】

1. 临床表现

- (1) 早期常无明显症状和体征。一旦出现症状可表现为接触性出血（性交后或阴道检查后）。
- (2) 宫颈检查可表现为糜烂、溃疡或乳头状突起，触之易出血。
- (3) 阴道排液白色或血性，稀薄如水样或米泔样，有腥臭味。
- (4) 宫颈检查可见菜花样结节或溃疡、空洞，癌组织脆、硬、易脱落出血。
- (5) 晚期可出现继发感染、贫血及恶病质。

2. 诊断要点

- (1) 宫颈细胞学检查：是普查中最常用、简便、有效的方法。
- (2) 阴道镜。【医学教育网原创】
- (3) 活体组织病理学检查：病理诊断是宫颈癌的确诊方法。
- (4) 宫颈锥切术
- (5) 其他：荧光素检查法、细胞组织化学检查法等。

二、【问题】葡萄胎的诊断要点？

【解答】

一、症状

1. 完全性葡萄胎的典型症状

- (1) 停经后阴道流血：为最常见的症状。
- (2) 子宫异常增大、变软：约半数以上的子宫体积大于停经月份，质地变软，并伴血清 HCG 水平异常升高。
- (3) 腹痛：表现为阵发性下腹痛，一般不剧烈，能忍受，常发生于阴道流血之

前。

(4) 妊娠呕吐

(5) 妊娠期高血压疾病征象

(6) 卵巢黄素化囊肿：由于大量 HCG 刺激卵巢卵泡内膜细胞发生黄素化而形成囊肿，称卵巢黄素化囊肿。常为双侧性的，但也可单侧，大小不等，一般无症状。黄素化囊肿常在水泡状胎块清除后 2~4 个月自行消退。

(7) 甲状腺功能亢进征象【医学教育网原创】

2. 部分性葡萄胎

可有完全性葡萄胎的大多数症状，但程度较轻。子宫体积与停经月份多数相符或小于停经月份，一般无腹痛，妊娠呕吐也较轻，常无妊娠期高血压疾病的征象，一般不伴卵巢黄素化囊肿。

(二) 体征

体格检查时子宫体积大于停经月份的子宫、变软；怀孕 5 个月大小时尚不能触及胎体，不能听到胎心，无胎动，均应怀疑葡萄胎。

(三) 辅助检查

1. 绒毛膜促性腺激素（HCG）测定：血清 HCG 滴度通常高于相应孕周的正常值。

2. B 超检查：是诊断葡萄胎的重要辅助检查方法。子宫明显大于相应孕周，无妊娠囊或胎心搏动，宫腔内充满不均质密集状或短条状回声，呈“落雪状”，若水泡较大而形成大小不等的回声区，则呈“蜂窝状”。常可监测到两侧或一侧卵巢囊肿。

3. 多普勒胎心测定。

三、【问题】葡萄胎的处理要点？

【解答】

1. 清除宫腔内容物：确诊葡萄胎后，在患者情况稳定后，应及时清除宫腔内容物。

2. 卵巢黄素化囊肿的处理：因囊肿在清除宫腔内容物后会自行消退，一般不需处理。

3. 子宫切除术：单纯子宫切除只能去除葡萄胎侵入子宫肌层局部的危险，不能预防子宫外转移的发生，所以不作为常规处理。

4. 随访

(1) HCG 定量测定：葡萄胎排空后每周一次，直至降低到正常水平。随后 3 个月内仍每周一次，【医学教育网原创】此后 3 个月每 2 周一次，然后每个月一次持续至少半年。如第 2 年未怀孕，可每半年一次，共随访 2 年。

(2) 随访项目：HCG、B 超检查、X 线胸片；还应注意月经是否规则，有无异常阴道流血，有无咳嗽、咯血及其他转移灶症状。

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

