

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2022年第9期

问题索引:

1. 温里剂在使用时需要注意些什么?
2. 附子、干姜的功效有何异同?
3. 斑与疹如何区别?

具体解答:

1. 温里剂在使用时需要注意些什么?

温里剂应用时需注意

- A. 素体阴虚者宜服用温里剂
- B. 温里剂性质温和, 可不拘时令、地域服用
- C. 失血之证应予温里剂温中固阳
- D. 阴寒过盛服药即吐者, 宜温服
- E. 温里剂中宜多补气药物, 助已伤阳气得复

【答案】E

【解析】温里剂应用时需注意:

- (1) 辨清寒证所在的部位, 有针对性地选择方剂。
- (2) 辨清寒热的真假, 真热假寒证不可误用。
- (3) 阴寒太盛, 服药入口即吐者, 可于本类方剂之中反佐少许寒凉之品, 或采用热药冷服的方法, 避免寒热格拒。
- (4) 素体阴虚或失血之人应慎用温里剂, 以免温燥药物重伤阴血。
- (5) 寒为阴邪, 易伤阳气, 故本类方剂多配伍补气药物, 以使阳气得复。[医学教育网原创]

2. 附子、干姜的功效有何异同?

附子、干姜共同的功效是

- A. 补火助阳
- B. 回阳救逆
- C. 温肺化饮
- D. 温中止呕

E. 温经止痛

【答案】B

【解析】附子与干姜二药均能温中散寒、回阳救逆，常用于亡阳证，四肢厥逆，脉微欲绝，脾胃有寒之脘腹冷痛泄泻。然附子为“回阳救逆第一品药”，并能补火助阳，散寒止痛，可用于各种阳虚证以及风寒湿痹证。干姜回阳救逆之功不及附子，长于温中散寒，常用于中焦寒证；又有温肺化饮之功，用于寒饮停肺证。[医学教育网原创]

3. 斑与疹如何区别?

斑与疹的主要区别是

- A. 是否色红成片
- B. 是否时现时隐
- C. 是否抚之碍手
- D. 是否伴寒颤
- E. 是否伴有身热

【答案】C

【解析】斑指皮肤出现深红色或青紫色、片状斑块，平摊于皮肤，摸之不应手，压之不褪色者。疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色者。

其二者最主要的区别是在于是否抚之碍手。[医学教育网原创]