



医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2022年第49期

问题索引：

1. 颞下颌关节区的检查有哪些内容？
2. 鼻腭神经阻滞麻醉时，麻药注入的孔隙是？
3. 哪个牙齿萌出后上颌的正中间隙也会关闭？
4. 临床中什么情况下需要用分离剂？

具体解答：

1. 颞下颌关节区的检查有哪些内容？

以下不属于颞下颌关节区检查的内容

- A. 颞下颌关节弹响的检查
- B. 咀嚼肌肉的扪诊
- C. 颞下颌关节活动度的检查
- D. 外耳道前壁的检查
- E. 开口度的检查

【答案】B

【解析】颞下颌关节区的检查内容包括颞下颌关节的活动度；颞下颌关节弹响；外耳道前壁；开口度及开口型；[医学教育网原创]下颌侧（牙合）运动等。咀嚼肌肉的扪诊是咀嚼肌的检查。

2. 鼻腭神经阻滞麻醉时，麻药注入的孔隙是？

鼻腭神经阻滞麻醉将麻药注入腭前孔，此处的腭前孔就是

- A. 腭大孔
- B. 切牙孔
- C. 圆孔
- D. 下颌孔
- E. 颞孔

【答案】B

【解析】鼻腭神经阻滞麻醉将麻药注入腭前孔[医学教育网原创]（切牙孔），



以麻醉鼻腭神经，故又称为腭前孔注射法。

3. 哪个牙齿萌出后上颌的正中间隙也会关闭？

发育期的上颌正中间隙，在哪个牙萌出后关闭

- A. 上颌中切牙
- B. 下颌尖牙
- C. 上颌第一双尖牙
- D. 上颌尖牙
- E. 上颌第二双尖牙

【答案】 D

【解析】 上颌正中间隙在上颌侧切牙和尖牙萌出时挤压牙根[医学教育网原创]，间隙会自行消失。故答案为 D。

4. 临床中什么情况下需要用分离剂？

临床上，为防止材料与材料或材料与模具发生粘连，常使用

- A. 包埋剂
- B. 清洁剂
- C. 分离剂
- D. 隔离剂
- E. 润湿剂

【答案】 C

【解析】 分离剂是在技工操作和口腔临床修复过程中经常使用的辅助材料。其主要作用是在两种相同或不同材料之间与模具形成隔离膜，[医学教育网原创]使材料与材料或材料与模具不发生粘连。故答案为 C。