

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022 年第 60 期

问题索引：

1. 【问题】腹膜炎会引起什么类型的肠梗阻？
2. 【问题】急性肾小球肾炎患儿什么时候可以上学？什么时候可以恢复正常生活？
3. 【问题】脾切除后为什么要检查血小板计数？
4. 【问题】难免流产和不全流产怎么区分呢？

具体解答：

1. 【问题】腹膜炎会引起什么类型的肠梗阻？

【解答】腹膜炎时，因为腹膜严重充血水肿并渗出大量液体，引起脱水和电解质紊乱、血浆蛋白降低、贫血，加之发热、呕吐；腹内脏器浸泡在脓性液体中，肠管麻痹，形成麻痹性肠梗阻。

腹膜炎治愈后，腹腔内多有不同程度的粘连，大多数无不良后果，部分肠管的粘连扭曲成角可造成[医学教育网原创]粘连性肠梗阻。

2. 【问题】急性肾小球肾炎患儿什么时候可以上学？什么时候可以恢复正常生活？

【解答】急性肾小球肾炎患儿在红细胞沉降率恢复正常后可上学；在 Addis 计数正常后，[医学教育网原创]可恢复正常生活。

3. 【问题】脾切除后为什么要检查血小板计数？

【解答】脾是破坏各种血细胞的器官，所以当脾切除后可出现血小板计数增加，为了防止术后静脉血栓形成，[医学教育网原创]术后 2 周内每日或隔天复查 1 次血小板计数；脾切除术后不用维生素 K 及其他止血药物。

4. 【问题】难免流产和不全流产怎么区分呢？

【解答】难免流产：表现为阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查：子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出；晚期难免流

产还可有羊水流出，或见胚胎组织或胎囊堵于宫口。

不全流产：妊娠产物已部分排出体外，尚有部分残留于宫内，阴道出血可持续不止，严重时引起出血性休克，下腹痛减轻。妇科检查：一般子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，不断有血液自宫颈口内流出，有时尚可见胎盘组织堵塞宫颈口，或部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，有时宫颈口已关闭。



正保医学教育网

www.med66.com