

2022 年儿科主治医师必备考点（71-80）

【考点 71】糖尿病诊断标准

以静脉血浆葡萄糖 (mmol/L) 为标准 (使用葡萄糖氧化酶法测定), 当患儿有“三多一少”症状时, 空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L (≥ 126 mg/dl), 或随机血糖/OGTT 2h 血糖 ≥ 11.1 mmol/L (≥ 200 mg/dl) 者即可诊断为糖尿病。对可疑者应做口服葡萄糖耐量试验 (OGTT)。

【考点 72】肝豆状核变性

本病以不同程度的肝细胞损害、脑退行性病变和角膜 K-F 环为临床特征。

【考点 73】结核菌素试验 (PPD)

1. 试验方法皮内注射 PPD1U 或 5U。

2. 标准: 结核菌素反应属于迟发型变态反应, 应在注射后 48~96 小时内测量反应程度, 通常以 72 小时作为观察反应时间。以皮试硬结的大小判定反应的程度。

阴性: 硬肿直径 < 5 mm。

阳性 (+): 硬肿直径 $\geq 5 \sim 9$ mm。

阳性 (++) : 硬肿直径 $\geq 10 \sim 19$ mm。

强阳性 (+++) : 硬肿直径 ≥ 20 mm。

极强阳性 (++++): 红晕及硬肿呈双圈反应, 并可见水疱或坏死、淋巴管炎。

【考点 74】麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病, 临床上具有发热、结合膜炎、流涕、咳嗽、麻疹黏膜斑 (柯氏斑) 和全身斑丘疹, 疹退后糠麸样脱屑并留有色素沉着等特征。

【考点 75】麻疹的预防

麻疹应早发现、早隔离 (至出疹后 5 天, 并发肺炎者延至 10 天)、早治疗。

【考点 76】风疹

风疹是由风疹病毒引起的急性出疹性传染病, 以前驱期短、3 天出疹及耳后、枕后和颈部淋巴结肿大为其临床特征。胎儿早期感染可致严重先天畸形。

【考点 77】幼儿急疹

又称婴儿玫瑰疹, 是常见于婴幼儿的急性出疹性传染病。临床特征为高热 3~4 天, 热退出疹。

【考点 78】猩红热

猩红热是由 A 组 β 型溶血性链球菌引起的急性出疹性传染病。临床以发热、咽炎、草莓舌、全身鲜红皮疹、疹退后脱皮为特征。

【考点 79】乙脑的预防

主要有疫苗接种（乙脑减毒活疫苗）、防蚊灭蚊和控制中间宿主（改善猪圈环境和圈内卫生、灭蚊等）三大措施。尚无特异性抗病毒治疗手段。对症和支持治疗同其他病毒性脑炎。

【考点 80】脊髓灰质炎

脊髓灰质炎（简称灰髓炎）是由脊髓灰质炎病毒引起的急性神经系统传染病。临床特征为分布不规则和轻重不等的弛缓性肌肉麻痹。