

# 《中药学综合知识与技能》

## 模考试卷

医学教育网 著

## 《中药学综合知识与技能》模考试卷

### 一、最佳选择题

1.某男，68岁。近三天常感胃部胀满，暖腐恶食，且伴有吐不消化食物，舌苔厚腻，脉滑，就诊后，医生开具保和丸治疗。作为药师，发药时应告知患者服用的时间为

- A.空腹服
- B.饭后服
- C.饭前服
- D.清晨服
- E.睡前服

2.创立了新的编写体例，药物按照自然属性进行分类的本草著作是

- A.《新修本草》
- B.《重修政和本草》
- C.《神农本草经》
- D.《本草纲目》
- E.《本草经集注》

3.在吸收水谷精微的同时，又吸收了大量的水液，使无用的水液渗入于膀胱的功能称为

- A.肺主行水
- B.肾主水
- C.小肠主液
- D.大肠主津
- E.脾主运化

4.某女，66岁。常出现胸闷脘痞、小便短涩、大便不爽等症状，体现了湿邪的致病特点是

A.湿为阴邪，易阻遏气机

B.湿性重浊

C.湿性黏腻阻滞

D.湿性趋下，易伤阴位

E.湿性凝滞不通

5.某女，56岁。近日出现畏寒肢冷，腰膝冷痛，腹泻，完谷不化等不适症状。利用中医五行学说的理论，可选用的治法是

A.滋水涵木法

B.金水相生法

C.泻南补北法

D.佐金平木法

E.益火补土法

6.某女，22岁。少腹冷痛，畏寒肢冷，月经愆期，色暗淡有血块，辨析其证候是

A.气滞证

B.气虚证

C.气血两虚证

D.血寒证

E.血瘀证

7.某女，20岁。恶寒喜暖，口淡不渴，面色苍白，肢冷蜷卧，小便清长，大便溏稀，舌淡苔白而润滑，脉紧。中医辨证是

A.实寒

B.虚寒

C.实热

D.虚热

E.寒热错杂

8.根据望诊望舌理论，以下描述错误的是

A.舌尖候心肺，舌边候肝胆

B.淡白舌主阳虚、血虚

C.舌体胖嫩色淡，多属脾肾阳虚

D.久病见舌颤，多属热极生风

E.色淡白而有裂纹，多属血虚不润

9.诊断乙型病毒性肝炎的直接依据是

A.HBsAg

B.抗-HBc

C.HBeAg

D.HBV-DNA

E.抗-HBs

10.某女，44岁。身热，腹硬满痛，大便燥结，口干渴，舌燥苔焦黄，治宜遵循的治则是

A.急则治其标

B.缓则治其本

C.标本兼治

D.实则泻之

E.虚则补之

11.某女，22岁。发汗恶寒，无汗，身重疼痛，神疲倦怠，舌质淡，苔薄黄，脉弦细，治宜

选用的方剂是

- A.一贯煎
- B.济川煎
- C.薯蓣丸
- D.香薷饮
- E.麻黄汤

12.某男，50岁。小便浑浊如米泔水，尿时热涩疼痛，口干。舌质红，苔黄腻，脉濡数。宜

选用的基础方剂是

- A.八正散
- B.知柏地黄丸
- C.程氏萆薢分清饮
- D.导赤散
- E.苍术难名丹

13.某女，55岁。肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄。舌质淡紫，苔薄白，脉细涩。宜选

用的基础方剂是

- A.真方白丸子
- B.天麻钩藤饮
- C.补阳还五汤
- D.当归六黄汤
- E.龙胆泻肝汤

14.某男，35岁。泄泻清稀如水样，腹痛肠鸣，脘闷纳少，苔白腻，脉濡缓。辨析其证候是

- A.肝郁泄泻

B.脾虚泄泻

C.肾虚泄泻

D.暑湿泄泻

E.寒湿泄泻

15.某女，66岁。虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴有气短自汗，倦怠乏力。

舌淡，脉弦细。证属

A.肝火扰心证

B.痰热扰心证

C.心胆气虚证

D.心肾不交证

E.心脾两虚证

16.某男，77岁。症见胸部膨满，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻，畏风易汗，腕痞纳少，倦怠乏力，舌暗，苔薄腻，脉小滑。根据患者症状，应辨证为

A.痰热郁肺证

B.痰浊阻肺证

C.痰蒙神窍证

D.肺肾气虚证

E.阳虚水泛证

17.某男，70岁。喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰黏腻色白，咳吐不利，甚则呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑。治疗时应首选

A.二陈汤合三子养亲汤

B.生脉散合补肺汤

C.七味都气丸合生脉散

D.参蛤散合肾气丸

E.苏子降气汤合二陈汤

18.某女，56岁。恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咯痰无力，舌淡苔白，脉浮而无力。治法宜首选

A.辛温解表

B.辛凉解表

C.祛湿解表

D.益气解表

E.滋阴解表

19.某女，22岁。咽部疼痛，逐渐加重，吞咽或咳嗽时疼痛加剧，咽部红肿，颌下有髻核。伴有咳嗽痰黄。舌红苔黄，脉浮数。宜选用的基础方剂是

A.凉膈散

B.清咽利膈汤

C.养阴清肺膏

D.疏风清热汤

E.龙胆泻肝丸

20.某女，68岁。水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下为甚，按之凹陷不起，尿量减少。腰酸冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，面色?白。舌质淡胖，苔白，脉沉细。宜选用的基础方剂是

A.济生肾气丸合真武汤

B.麻黄连翘赤小豆汤

C.实脾饮

D.五皮饮合胃苓汤

E.疏凿饮子

21.某男，72岁。患有冠心病多年，近日症见胸痛，痛如针刺而有定处，烦躁，心悸，气短，舌暗红有瘀斑，脉弦涩。治宜选用的中成药是

A.柴胡舒肝丸

B.龙胆泻肝丸

C.血府逐瘀口服液

D.慢肝养阴胶囊

E.舒肝止痛片

22.某男，19岁。大便带血，血色鲜红，且伴有肛门瘙痒等症。舌红，苔薄黄，脉浮数。治宜可选用的方剂是

A.防风通圣丸

B.消风散

C.凉血地黄汤

D.脏连丸

E.止痛如神汤

23.某女，35岁。双侧乳房现有肿块达半年有余，月经前增大，且乳房肿块随喜怒而消长。伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。治疗可选用的方剂是

A.五味消毒饮加减

B.逍遥蒺贝散加减

C.枇杷清肺饮加减

D.茵陈蒿汤加减

E.桃红四物汤加减

24.某女，28岁。乳房胀痛半年，左侧乳房有肿块，月经前增大明显，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦，苔薄黄，脉弦滑。治疗宜采用的相应治法是

A.温阳化痰，疏肝解郁

B.疏肝解郁，理气畅中

C.健脾养心，补益气血

D.疏肝理气，活血化瘀

E.疏肝解郁，化痰散结

25.某女，36岁。月经非时而下，经血暗红，咽干颧红，心烦潮热，腰膝酸软。舌红苔少，脉沉细无力。宜采用的治法是

A.滋益肾阴

B.滋补肝肾，止血调经

C.滋养肝肾

D.滋肾养肝，固冲止血

E.滋肾益阴，佐以助阳

26.患者经行点滴即净，色黯红有血块，小腹疼痛拒按，舌紫暗，或有瘀点，脉细涩或弦涩。

其诊断为

A.气虚型月经过少

B.血热型月经过少

C.血寒型月经过少

D.血瘀型月经过少

E.肾虚型月经过少

27.某女，36岁。经期错后，量少，色淡，质黏，头晕体胖，心悸气短，腕闷恶心，带下量多；舌淡胖，苔白腻，脉滑。宜选用的基础方剂是

A.归肾丸

B.归脾丸

C.大补元煎

D.芎归二陈汤

E.乌药汤

28.某女，72岁。耳聋突然发生，如吹风音，昼夜不停，耳部胀闷不适，听力下降，伴有发热恶寒，鼻塞流涕，咽痒咳嗽。舌质红，苔薄黄，脉浮数。中医应辨证为

A.火毒上攻证

B.肝火上扰证

C.风热侵袭证

D.肾精亏损证

E.脾胃虚弱证

29.某男，3岁。不思进食，神倦多汗，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。舌淡，苔薄白，脉缓无力。宜选用的基础方剂是

A.保和丸

B.异功散

C.四君子汤

D.补中益气汤

E.健脾丸

30.某女，35岁。胃痛胀满，暖腐恶食，吐有不消化食物，吐后痛减，兼有大便秘结，排出困难，舌苔厚腻，脉滑等症，且经期常出现痛经，治宜可选用的藏成药方剂是

- A.六味安消散
- B.八味沉香散
- C.志嘎汗散
- D.仁青常觉
- E.七十味珍珠丸

31.功能祛风镇痛，调经血。用于治疗妇女血症，风症，子宫虫病，小腹疼痛，月经不调等的藏成药方剂是

- A.七十味珍珠丸
- B.二十五味珊瑚丸
- C.二十五味小叶莲丸
- D.二十五味松石丸
- E.三十五味沉香丸

32.药名相近，但性味功效不同的饮片不应排列在一起的是

- A.羌活与独活
- B.葛根与山药
- C.当归与川芎
- D.升麻与柴胡
- E.附子与白附子

33.某女，33岁。经血量少，色暗红，夹有小血块；小腹胀痛不适，经行后痛减，舌紫暗，有瘀斑或瘀点，脉沉弦。医师给予桃红四物汤来治疗。方中选用的当归为

A.生品当归头

B.土炒当归

C.酒当归

D.当归炭

E.生品当归尾

34.番红花的正名是

A.藏红花

B.红花

C.草红花

D.西红花

E.红蓝花

35.中药在临床使用中引起肝损伤多与超剂量用药、联合用药、患者有肝脏基础疾病等因素相关。因此预防药物性肝损伤，首先要严格掌握各种药物应用的适应证，避免滥用。以下关于中药引起肝损伤的防治原则，说法错误的是

A.药物应用中注意剂量、疗程，用药期间严密监测天门冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、胆红素等肝生化指标

B.数种药物并用时，注意药物间的相互作用，尤其避免其他对肝功能有影响的药物的联合使用

C.何首乌“九蒸九晒”后肝毒性降低

D.朱砂用传统的水飞法炮制无法降低其毒性，故在使用时应酌情减量使用

E.一旦发现有肝损害，应立即停药，对症处理，并适当使用保肝药物进行治疗

36.老年人发病用药应

A.首先明确是否需要进行治疗

B.马上住院治疗

C.不管是否对症都要用药

D.多用贵药好药

E.一定要用补益药

37.与孟鲁司特钠治疗慢性持续期小儿哮喘痰热阻肺证具有协同增效的中药方剂是

A.桑杏汤

B.麻黄汤

C.桑白皮汤

D.百合固金汤

E.清燥救肺汤

38.与间羟胺、多巴胺等升压药联用具有协同增效的是

A.小青龙汤

B.丹参注射液

C.生脉饮

D.干姜汤

E.柴朴汤

39.属于中成药配伍应用，一药为主，一药为辅，辅药能提高主药的功效的是

A.更衣丸与内消瘰疬丸

B.二陈丸与平胃散

C.急支糖浆与珍菊降压片

D.银黄片与双黄连口服液

E.镇咳宁胶囊与心通口服液

40.罂粟壳中毒的典型症状是

A.瞳孔散大，对光反应消失

B.呼吸急促

C.血压升高

D.瞳孔极度缩小呈针尖样

E.心跳加速

## 二、配伍选择题

1.A.实中夹虚

B.虚中夹实

C.真虚假实

D.真实假虚

E.因虚致实

(1) 某男，40岁。腹满痛拒按，潮热谵语，但下利清水。辨证为热结旁流，病机为“大实有羸状”，属于

(2) 某男，62岁。腹胀腹痛，时胀时止，食少便溏。自行服用气滞胃痛颗粒，症状不减。

辨证为脾失健运，病机为“至虚有盛候”属于

2.A.阴阳偏盛

B.阴阳互损

C.阴阳偏衰

D.阴阳格拒

E.阴阳亡失

(1) 身热反欲盖衣被，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝，病机属于

(2) 冷汗淋漓，四肢厥逆，神情淡漠，脉微欲绝，病机属于

3.A.脾

B.小肠

C.大肠

D.膀胱

E.胃

(1) 主受盛化物的脏腑是

(2) 主传化糟粕的脏腑是

4.A.太阳经

B.阳明经

C.少阳经

D.厥阴经

E.少阴经

凡头痛之在于经脉者，可根据经络的分布，以确定病位之所在。

(1) 头侧痛属

(2) 前额痛属

(3) 头项痛属

(4) 头顶痛属

5.A.肾气不固证

B.肾不纳气证

C.肾精不足证

D.肾阴虚证

E.肾阳虚证

(1) 某小儿，5岁。身高不足1米，发育迟缓，身材矮小，智力和动作迟钝，囟门迟闭，骨骼痿软，其病机多为

(2) 某女，50岁。常见头晕目眩，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰膝酸痛。舌红，脉细数，其病机多为

(3) 某男，72岁。患有哮喘多年，常出现喘促，呼多吸少，动则喘甚，汗出，四肢不温，恶寒风，面部虚浮，脉虚浮，舌质淡等症，其病机多为

6.A.热痰

B.寒痰

C.湿痰

D.燥痰

E.肺痛

(1) 痰白易咯而量多者，多为

(2) 痰色白而清稀者，多为

(3) 痰色黄而黏稠者，多为

(4) 痰少极黏，难以排出者，多为

7.A.齿龈青紫

B.牙齿蛀蚀

C.齿龈淡白

D.齿稀根露

E.齿龈红肿

根据中医望诊理论

- (1) 肾虚可见
- (2) 血虚可见

8.A.分清五淋丸

B.复方金钱草颗粒

C.济生肾气丸

D.萆薢分清丸

E.前列回春胶囊

- (1) 某男，42岁。小便频数，尿液混浊如米泔，宜选用的中成药是
- (2) 某男，51岁。小便频数短急，沥涩不畅，腰膝酸软，乏力，脉细。宜选用的中成药是
- (3) 某女，42岁。小便短数，尿色黄赤，灼热涩痛，大便干结。宜选用的中成药是
- (4) 某女，72岁。小便不通，排出无力，面色（白光）白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝酸重，小便不利，痰饮咳喘。宜选用的中成药是

9.A.黄芪汤

B.济川煎

C.化肝煎

D.温脾汤合半硫丸

E.六磨汤

- (1) 某男，78岁。大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言。舌淡苔白，脉弱。宜选用的基础方剂是
- (2) 某男，24岁。大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐。舌苔白腻，脉弦紧。宜选用的基础方剂是

(3) 某女，45岁。大便干结，欲便不得出，胸胁痞满，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少。舌苔薄腻，脉弦。宜选用的基础方剂是

10.A.麻黄汤合华盖散

B.桑白皮汤

C.肾气丸合参蛤散

D.百合固金汤

E.清金化痰汤

(1) 某女，69岁，喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，稀薄痰且带泡沫，兼有头痛鼻塞，恶寒，脉浮紧等症，治疗时可选用

(2) 某男，50岁，症见喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，伴有胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，面红，尿赤，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数等症，治疗时可选用

(3) 某男，55岁，症见喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，形瘦神疲，汗出肢冷，舌淡苔薄，脉沉弱，治疗时可选用

11.A.连翘败毒丸

B.皮肤病血毒丸

C.牛黄化毒片

D.乳疾灵颗粒

E.乳增宁胶囊

(1) 某男，22岁。背部疔肿较重，症见肌肤红赤、肿胀、微热、疼痛，舌尖红，脉浮数。医师诊断为疔肿热毒蕴结证，治疗宜选用的中成药是

(2) 某女，26岁。皮肤出现疔肿，症见周围色红肿硬、触痛明显伴有恶寒、发热、口干、尿黄、大便干等。医师诊断为疔湿毒蕴结证，治疗宜选用的中成药是

(3) 某女, 36 岁。患有乳腺增生, 症见一侧乳房肿块, 可有触痛, 肿块边界欠清, 与周围组织不粘连, 乳房胀痛, 且随喜怒而消长, 常在月经前加重。医师诊断为乳癖肝郁痰凝证, 治疗宜选用的中成药是

- 12.A.女金丹丸
- B.春血安胶囊
- C.四物益母丸
- D.鹿胎胶囊
- E.巴戟口服液

(1) 某女, 42 岁。月经先后不定期, 症见经行不畅, 经色暗淡, 神疲乏力, 腰膝酸软, 带下清稀, 舌淡苔白, 脉弱。医师诊断为肾虚证, 治宜选用的中成药是

(2) 某女, 36 岁。近半年来月经总是延后 7 天以上, 症见月经错后, 月经淋漓不净。经行小腹疼痛, 腰部疼痛。医师诊断为肾虚证, 治宜选用的中成药是

(3) 某女, 25 岁。近半年月经总是提前, 症见经量少, 色淡质稀, 腰酸腿软, 面色晦暗, 头晕耳鸣, 舌暗淡, 苔薄白, 脉沉细。医师诊断为肾虚证, 治宜选用的中成药是

- 13.A.常山
- B.丁公藤
- C.猪牙皂
- D.天南星
- E.山豆根

- (1) 有催吐副作用, 量不宜过大的是
- (2) 有强烈的发汗作用, 虚弱者慎用的是
- (3) 咯血吐血者禁用的是

14.A.六味地黄丸

B.通宣理肺丸

C.胆宁片

D.紫雪散

E.镇咳宁胶囊

(1) 治疗风寒湿痹证的尪痹冲剂应避免合用的中成药是

(2) 利胆中成药利胆排石片应避免合用的中成药是

15.A.瞳孔散大，对光反应消失

B.阿尔兹海默病、痴呆、认知功能障碍

C.瞳孔极度缩小呈针尖样

D.尿量减少，双肾刺痛，外用引起过敏反应

E.黄疸、肝肿大、消化道出血

(1) 鸦胆子的不良反应表现可能为

(2) 白矾的不良反应表现可能为

16.A.角弓反张，痉挛

B.牙关紧闭，心律失常

C.大汗，脱发，口唇糜烂

D.吐血、咯血、便血、尿血、黄疸

E.口腔粘膜充血，牙龈肿胀，少尿

(1) 过量服用含有乌头的药物会引起

(2) 过量服用含有雄黄的药物会引起

(3) 过量服用含有马钱子的药物会引起

(4) 过量服用含有朱砂的药物会引起

17.A.C 级

B.F 级

C.H 级

D.G 级

E.I 级

根据用药错误发生的程度和发生后可能造成危害的程度，将用药错误分为 A~ I 九级，并可归纳为 4 个层级。

(1) 患者已使用，但未造成伤害的差错属于

(2) 差错对患者的伤害可导致患者住院或延长住院时间属于

(3) 差错导致患者生命垂危，需要应用维持生命的措施属于

(4) 差错导致患者死亡属于

### 三、综合分析选择题

1.某女，32 岁。口舌生疮，烦躁焦虑，口干舌燥，小便短赤。舌尖红，苔薄黄，脉数。

(1) 口舌生疮，舌尖红，病位在

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

(2) 脉数主病是

A.虚证

B.热证

C.阴证

D.寒证

E.表证

2.某女，55岁。眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀。舌淡苔薄白，脉细弱。

(1) 根据患者症状，辨析其证候是

A.肝阳上亢证

B.气血亏虚证

C.肾精不足证

D.痰湿中阻证

E.肾阳虚衰证

(2) 宜采用的治法是

A.滋养肝肾，益精填髓

B.平肝潜阳，滋养肝肾

C.补益气血，调养心脾

D.化痰祛湿，健脾和胃

E.养血滋阴，和络止痛

(3) 宜选用的基础方剂是

A.归脾汤

B.天麻钩藤饮

C.左归丸

D.龙胆泻肝汤

E.半夏白术天麻汤

3.某男，35岁。腰部冷痛重着，转侧不利，静卧疼痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。

(1) 中医应辨证为

A.寒湿腰痛

B.风寒腰痛

C.瘀血腰痛

D.湿热腰痛

E.肾虚腰痛

(2) 治疗宜选用的治法是

A.温补肾阳，补肾壮腰

B.活血化瘀，通络止痛

C.清热利湿，舒筋止痛

D.散寒除湿，温经通络

E.健脾渗湿，舒筋止痛

(3) 治宜选用的方剂是

A.左归丸加减

B.右归丸加减

C.身痛逐瘀汤加减

D.四妙丸加减

E.甘姜苓术汤加减

4.某男，52岁。近来肋肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。

(1) 中医辨证为

- A.肝郁气滞证
- B.气血亏虚证
- C.肝胆湿热证
- D.瘀血阻络证
- E.肝络失养证

(2) 治疗宜采用的治法是

- A.疏肝理气
- B.祛瘀通络
- C.清热利湿
- D.养阴柔肝
- E.平肝潜阳

(3) 治宜选用的方剂是

- A.柴胡疏肝散
- B.济川煎
- C.一贯煎
- D.玉女煎
- E.血府逐瘀汤

5.患者，女，34岁。面浮身肿，腰以下甚，按之凹陷不起，神疲怕冷，时觉心悸喘促，腹部胀满有水，尿少，舌质淡胖，苔白，脉沉细。

(1) 中医诊断为

- A.癃闭
- B.汗证
- C.水肿
- D.痹证
- E.郁证

(2) 其辨证是

- A.风水相搏证
- B.肾阳衰微证
- C.瘀水互结证
- D.脾阳虚衰证
- E.湿热壅盛证

(3) 其治法是

- A.健脾温阳，利水行气
- B.温肾助阳，化气行水
- C.分利湿热，化气祛瘀
- D.疏风清热，宣肺行水
- E.宣肺解毒，利湿消肿

(4) 治疗应首选的方剂是

- A.越婢加术汤
- B.平喘固本汤合补肺汤
- C.济生肾气丸合真武汤

D.实脾饮

E.真武汤合五苓散

6.某患儿，5岁。近日汗出异常，睡则汗出，醒则汗止，心悸怔忡，失眠多梦，神疲气短，面色不华，舌质淡，舌苔白，脉细。医师诊断为心血不足，给予健脾生血颗粒来治疗。

(1) 健脾生血颗粒的功能为

A.益气补血，健脾宁心

B.补气益血，滋肾养肝

C.健脾和胃，养血安神

D.益气复脉，养阴生津

E.滋阴益气，固本培元

(2) 健脾生血颗粒中所含有的西药成分是

A.三氧化二铁

B.四氧化三铁

C.硫酸铁

D.硫酸亚铁

E.硫化铁

(3) 服药时的注意事项，说法错误的是

A.此药对胃有刺激性，故宜在饭后服用

B.服药期间忌饮茶

C.服药期间勿与含鞣酸类药物合用

D.服药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失

E.少数患儿服药后，可出现短暂性的食欲骤增，多可自行缓解

7.女性患者，47岁，因类风湿性关节炎，服用壮骨关节丸，每日服两次，每次6g。服药30天后，出现乏力、尿黄而浓茶色，皮肤黄染，伴明显皮肤瘙痒，大便呈灰白色。入院治疗，进行了化验检查，结果为甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒学标志均呈阴性。肝穿病理检查提示胆汁淤积型肝炎。

(1) 患者使用壮骨关节丸，可能出现的不良反应不包括

- A.皮疹、瘙痒
- B.恶心、呕吐
- C.女性闭经
- D.血压升高
- E.肝损害

(2) 临床上在使用壮骨关节丸时，作为执业药师，不应给出的用药指导是

- A.建议患者严格遵医嘱用药，避免大剂量、长期连续用药
- B.用药时一旦出现纳差、尿黄、皮肤黄染等症状应及时停药就医。
- C.肝功能不良或特异体质者慎用，定期检查肝功能
- D.30天为一疗程，长期服用者每疗程之间间隔10~20天
- E.严格控制用药剂量和疗程，一般连续用药不宜超过三个月

#### 四、多项选择题

1.以下属于中药药学服务内容的有

- A.中药处方调剂
- B.中药处方点评
- C.中药医嘱审核
- D.参与临床查房

E.参与临床会诊

2.治阴阳偏衰时，可采用的治法有

A.阳病治阴

B.阴病治阳

C.阴中求阳

D.阳中求阴

E.阴阳双补

3.易耗伤津液的病邪有

A.风邪

B.暑邪

C.湿邪

D.燥邪

E.火邪

4.下列属于正治法的有

A.寒者热之

B.寒因寒用

C.热者寒之

D.热因热用

E.虚则补之

5.某男，75岁。关节肿大僵硬、变形，严重部位出现肌肉萎缩。伴有腰膝酸软，骨蒸潮热，

自汗盗汗，舌红或淡，脉细数。医师诊断为尪痹，治宜选用的中成药有

A.四妙丸

B.独活寄生合剂

C.天麻丸

D.益肾蠲痹丸

E.痹痛宁胶囊

6.既含有朱砂，又含有雄黄的中成药有

A.局方至宝散

B.速效牛黄丸

C.紫金锭

D.七珍丸

E.人参再造丸

7.含盐酸麻黄碱的中成药品种有

A.镇咳宁糖浆

B.安嗽糖浆

C.川贝枇杷糖浆

D.天一止咳糖浆

E.散痰宁糖浆

8.肾功能不全者用药的基本原则和使用注意事项是

A.明确疾病的诊断和治疗目标

B.忌用有肾毒性的药物

C.注意药物的相互作用，避免产生新的肾损害

D.坚持少而精的用药原则

E.定期检查，及时调整治疗方案

9.不宜与乳酶生联用的中药有

- A.金银花
- B.饴糖
- C.连翘
- D.黄芩
- E.鱼腥草

10.合理用药的目的有

- A.最大限度地发挥药物治疗效能
- B.将中药和中成药的不良反应降低到最低限度，甚至于零
- C.以最少的支出，冒最小的风险，得到最好的治疗效果
- D.充分利用卫生资源减少浪费和患者经济负担
- E.方便患者使用



## 答案部分

---

### 一、最佳选择题

1.【正确答案】B

【答案解析】健胃消食药宜饭后服，如保和丸、大山楂丸等。

2.【正确答案】E

【答案解析】《本草经集注》创立了新的编写体例：药物分类按自然属性进行区分，改进了《本经》三品分类法；所载药物内容采用朱墨、大小字体分书法，保持了引录文献的原有面貌。

3.【正确答案】C

【答案解析】小肠在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量的水液，使无用的水液渗入于膀胱，故称“小肠主液”。

4.【正确答案】A

【答案解析】湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气：湿邪侵及人体，留滞于脏腑经络，最易阻遏气机，使气机升降失常，经络阻滞不畅，常可出现胸闷脘痞、小便短涩、大便不爽等症状。此外，湿为阴邪，易损伤阳气。脾主运化水湿，其性喜燥而恶湿，故外感湿邪，留滞体内，常先困脾气，使脾阳不振，运化水湿功能减弱，水湿停聚，出现腹泻、尿少、水肿、腹水等病证。

5.【正确答案】E

【答案解析】益火补土法：温肾阳以补脾阳的治法，又称温肾健脾法。（火，在此是指命门之火，而非心火。益火，补益命门之火，即温肾阳之法。）适用于肾阳衰微而致脾阳不振的脾肾阳虚证。临床可见畏寒肢冷，腰膝冷痛，腹泻，完谷不化，或五更泄泻，舌淡胖边有齿

痕，苔白滑，脉沉无力等症。

6.【正确答案】D

【答案解析】血寒证临床常见疼痛喜暖，得暖痛减，形寒肢冷，舌淡而暗，脉沉迟涩。妇女常见少腹冷痛，畏寒肢冷，月经行期，色暗淡有血块等症。

7.【正确答案】A

【答案解析】寒证，是感受寒邪，或阳虚阴盛，机体的功能活动衰减所表现的证候。其临床表现常见恶寒喜暖、口淡不渴、面色苍白、肢冷踈卧、小便清长、大便稀溏、舌淡苔白而润滑、脉迟或紧等症。以寒为主，功能减退为辨证要点。

8.【正确答案】D

【答案解析】舌体震颤不定，不能自主，称为舌体颤动。久病中见舌颤，属气血两虚或阳气虚弱。外感热病中见之，多属热极生风或虚风内动之象。故D项表述错误。

9.【正确答案】D

【答案解析】乙型肝炎病毒DNA (HBV-DNA) 是诊断乙型病毒性肝炎的直接证据。比血清免疫学检查更灵敏，特异性更强。

10.【正确答案】C

【答案解析】临床表现有身热、腹硬满痛、大便燥结、口干渴、舌燥苔焦黄等，此属邪热里结为标，阴液受伤为本，标本俱急，治当标本兼顾，可用增液承气汤治之。泻下与滋阴同用，泻其实热可以存阴，滋阴润燥则有利于通下，标本同治可收相辅相成之功。

11.【正确答案】D

【答案解析】中暑——阴暑

【症状】发热恶寒，无汗，身重疼痛，神疲倦怠。舌质淡，苔薄黄，脉弦细。

【治法】解表散寒，祛暑化湿。

【方剂应用】基础方剂：香薷饮(香薷、厚朴、白扁豆)加减。

12. 【正确答案】 C

【答案解析】淋证——膏淋【症状】小便浑浊，乳白或如米泔水，上有浮油，置之沉淀，或伴有絮状凝块物，或混有血液、血块，尿道热涩疼痛，口干。舌质红，苔黄腻，脉濡数。

【方剂应用】基础方剂：程氏萆薢分清饮(萆薢、黄柏、石菖蒲、茯苓、白术、莲子心、丹参、车前子)加减。

13. 【正确答案】 C

【答案解析】患者应辨证为中风——气虚血瘀证。

中风——气虚血瘀证【方剂应用】基础方剂：补阳还五汤(黄芪、当归、川芎、桃仁、红花、赤芍、地龙)加减。

14. 【正确答案】 E

【答案解析】泄泻——寒湿内盛证

【症状】泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，或兼见外感风寒，恶寒，发热，头痛，肢体酸痛。舌苔白或白腻，脉濡缓。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】不寐——心胆气虚证

【症状】虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】肺胀——痰浊阻肺证

【症状】胸膈满闷，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力。舌暗，苔薄腻或浊腻，脉小滑。

17.【正确答案】A

【答案解析】喘证——痰浊阻肺证【症状】喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咳吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑或濡。

【治法】祛痰降逆，宣肺平喘。

【方剂应用】基础方剂：二陈汤(陈皮、半夏、茯苓、甘草、生姜、乌梅)合三子养亲汤(紫苏子、白芥子、莱菔子)加减。

18.【正确答案】D

【答案解析】气虚感冒

【症状】发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，痰白，咳痰无力。舌淡，苔白，脉浮而无力。

【治法】益气解表。

19.【正确答案】D

【答案解析】咽喉肿痛——风热外袭证【症状】咽部疼痛，逐渐加重，吞咽或吮嗽时疼痛加剧，咽部红肿，颌下有髻核；伴见发热恶风，头痛，咳嗽痰黄。舌质红，苔黄，脉浮数。

【方剂】疏风清热汤。

20.【正确答案】A

【答案解析】水肿——肾阳衰微证【症状】水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下甚，按之凹陷不起，尿量减少或反多，腰酸冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，面色㿔白，甚者心悸胸闷，喘促难卧，腹大胀满。舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟无力。【方剂应用】基础方剂：济生肾气丸(附子、车前子、山茱萸、山药、牡丹皮、牛膝、熟地黄、肉桂、茯苓、泽泻)合真武汤(茯苓、芍药、白术、生姜、附子)加减。

21.【正确答案】C

【答案解析】血府逐瘀口服液的临床应用是气滞血瘀所致胁痛。症见胸痛，痛如针刺而有定处，烦躁，心悸，气短，舌暗红或有瘀斑，脉弦紧或涩；冠心病心绞痛见上述证候者。

22. 【正确答案】 C

【答案解析】痔——风伤肠络证【方剂应用】基础方剂：凉血地黄汤(细生地、当归尾、地榆、槐角、黄连、天花粉、升麻、赤芍、枳壳、黄芩、荆芥、生甘草、生侧柏)加减。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】乳癖——肝郁痰凝证【方剂应用】基础方剂：逍遥蒺贝散(柴胡、当归、白芍、茯苓、白术、瓜蒌、贝母、半夏、南星、生牡蛎、山慈菇)加减。

24. 【正确答案】 E

【答案解析】乳癖——肝郁痰凝证【治法】疏肝解郁，化痰散结。

25. 【正确答案】 B

【答案解析】患者应辨证为崩漏——肝肾不足证。【治法】滋补肝肾，止血调经。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】月经过少——血瘀证【症状】经血量少，色暗红，或夹有小血块；小腹胀痛不适，经行后痛减，或伴胸肋胀痛腰骶疼痛。舌紫暗，有瘀斑或瘀点，脉沉涩或沉弦。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】月经后期——痰湿证【症状】月经周期延后，量少，色淡红，质黏稠；头晕体胖，心悸气短，腕闷恶心，口腻多痰，或带下量多黏腻。舌淡胖，苔白腻，脉滑。宜选用的基础方剂是芎归二陈汤。

28. 【正确答案】 C

【答案解析】耳鸣耳聋——风热外袭证【症状】耳鸣或耳聋突然发生，如吹风音，昼夜不停，耳部胀闷不适，或耳内作痒，听力下降，伴有发热恶寒，鼻塞流涕，咽痒咳嗽。舌质红，

苔薄黄，脉浮数。

29.【正确答案】B

【答案解析】厌食——脾胃气虚证【方剂应用】基础方剂：异功散(人参、白术、茯苓、陈皮、甘草)加减。

30.【正确答案】A

【答案解析】六味安消散由藏木香、大黄、山奈、北寒水石(煨)、诃子、碱花加工制成的散剂。功能和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于脾胃不和，积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

31.【正确答案】C

【答案解析】二十五味小叶莲丸(原二十五味鬼臼丸)，功能祛风镇痛，调经血。用于妇女血症，风症，子宫虫病，小腹疼痛，月经不调等。

32.【正确答案】E

【答案解析】附子与白附子两者名称相近，但功效不同，不宜放在一起。

33.【正确答案】C

【答案解析】当归功用活血养血，桃红四物汤活血行瘀，方中宜用酒当归；当归补血汤补气生血，方中宜用生当归。

34.【正确答案】D

【答案解析】西红花的别名有藏红花、番红花。

35.【正确答案】D

【答案解析】中药在临床使用中引起肝损伤多与超剂量用药、联合用药、患者有肝脏基础疾病等因素相关。因此预防药物性肝损伤，首先要严格掌握各种药物应用的适应证，避免滥用。其次也应注意下述事项。

1. 药物应用中注意剂量、疗程，用药期间严密监测天门冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、胆红素等肝生化指标。对某些有肝损害高危因素者，药物应慎用或减量。如婴幼儿、营养状况差、肝功能不全者，应尽量避免使用本类药物；必须要用的，应根据具体情况减量或延长给药间隔时间。

2. 数种药物并用时，注意药物间的相互作用，尤其避免其他对肝功能有影响的药物的联合使用。

3. 正确的炮制方法，合理的药物配伍可以降低药物的毒性。如何首乌“九蒸九晒”后肝毒性降低；朱砂用传统的水飞法炮制即可除去可溶性汞和游离汞，从而降低其毒性。细辛中的黄樟醚作用于人的呼吸中枢，阻止氧代谢，严重的会破坏肝细胞，引起肝中毒，但黄樟醚是一种极易挥发的物质，通过水煎煮 20~30 分钟，95% 的黄樟醚都会挥发掉，因此适当的煎煮方法非常重要。另外煎煮器具选择不当，也可致毒，应避免用铝锅、铁锅煎药。

4. 如果因慢性病需长期服用某类中药，对有蓄积可能的药物，应采用少量、间断服药的方法。

5. 一旦发现有肝损害，应立即停药，对症处理，并适当使用保肝药物进行治疗。

36. 【正确答案】A

【答案解析】老年人体虚多病，病情往往复杂多变，若药物使用不当可使病情急转直下，甚至无法挽救，故首先应明确是否需要进行治疗。

37. 【正确答案】E

【答案解析】清燥救肺汤加减联合孟鲁司特钠治疗慢性持续期小儿哮喘痰热阻肺证具有协同增效的作用，且可降低孟鲁司特钠引起的过敏反应、皮疹、荨麻疹、烦躁、恶心呕吐、嗜睡的不良反应。

38. 【正确答案】B

【答案解析】丹参注射液与间羟胺（阿拉明）、多巴胺等升压药同用，不但能加强升压作用，

还能减少对升压药的依赖性。

39.【正确答案】B

【答案解析】二陈丸燥湿化痰为主药，治疗湿痰咳嗽；而脾为生痰之源，辅以平胃散同用，燥湿健脾，可明显增强二陈丸燥湿化痰之功。

40.【正确答案】D

【答案解析】罂粟壳中毒的典型症状表现有昏睡或昏迷，抽搐，呼吸浅表而不规则，恶心，呕吐，腹泻，面色苍白，发绀，瞳孔极度缩小呈针尖样，血压下降等。

## 二、配伍选择题

1. (1)【正确答案】D

【答案解析】因实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达，可导致真实假虚证，称为“大实有羸状”。

(2)【正确答案】C

【答案解析】因脏腑的气血不足，运化无力，可导致真虚假实证，称为“至虚有盛候”。

2. (1)【正确答案】D

【答案解析】阴阳格拒——阴盛格阳：临床除可见四肢厥逆、下利清谷、脉微欲绝等症状外，又可见阳浮于外之症，如身热反不恶寒（但欲盖衣被）、面颊泛红等假热之象，应属真寒假热之证。

(2)【正确答案】E

【答案解析】阴阳亡失——亡阳，临床多见冷汗淋漓、肌肤手足逆冷、精神疲惫、神情淡漠，甚则见昏迷、脉微欲绝等症状。

3. (1)【正确答案】B

【答案解析】小肠的主要生理功能是受盛、化物和泌别清浊。

(2)【正确答案】C

【答案解析】大肠的主要生理功能是传化糟粕，并吸收部分水液。

4. (1)【正确答案】C

(2)【正确答案】B

(3)【正确答案】A

(4)【正确答案】D

【答案解析】凡头痛之在于经脉者，可根据经络的分布，以确定其病位之所在。如头项痛属太阳经，前额痛属阳明经，头侧痛属少阳经，头顶痛属厥阴经等。有时头疼常常伴有头晕，需要参考头晕的辨证特点。

5. (1)【正确答案】C

【答案解析】肾精不足证的临床表现，常见男子精少不育，女子经闭不孕，性功能减退。小儿发育迟缓，身材矮小，智力和动作迟钝，囟门迟闭，骨骼痿软。成人早衰，发脱齿摇，耳鸣耳聋，健忘恍惚，动作迟缓，足痿无力，精神呆钝等。一般以小儿生长发育迟缓，成人早衰，生殖功能减退的表现为辨证要点。

(2)【正确答案】D

【答案解析】肾阴虚证的临床表现，常见头晕目眩，耳鸣耳聋，牙齿松动，失眠遗精，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰膝酸痛。舌红，脉细数。一般以肾病的主要症状和阴虚内热症状同见为辨证要点。

(3)【正确答案】B

【答案解析】肾不纳气证的临床表现，常见气虚喘促，呼多吸少，动则喘甚，汗出，四肢不温，恶寒风，面部虚浮，脉虚浮，舌质淡。一般以久病咳喘，呼多吸少，气不得续，动则加重为主，伴见肺肾气虚表现为辨证要点。

6. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 痰白易咯而量多者，为湿痰。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 对痰涎来说，一般痰色白而清稀，多为寒证。

(3) 【正确答案】 A

【答案解析】 痰色黄或白而黏稠者，多属热证。

(4) 【正确答案】 D

【答案解析】 痰少极黏，难以排出者，多属燥痰。

7. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 牙齿松动稀疏、齿根外露者，多属肾虚或虚火上炎。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 胃之经络于龈中，龈色淡白者，多是血虚不荣。

8. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 萆薢分清丸的临床应用是肾阳不足，清浊不分所致膏淋。症见小便频数，尿液混浊，如米泔；亦可用于慢性前列腺炎。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 前列回春胶囊的临床应用是肾气不足，湿热瘀阻所致劳淋。症见小便频数短急，沥涩不畅，腰膝酸软，乏力，脉细。

(3) 【正确答案】 A

【答案解析】 分清五淋丸的临床应用是湿热下注膀胱所致热淋。症见小便短数，尿色黄赤，灼热涩痛，大便干结；尤适用于下尿路感染者。

(4) 【正确答案】 C

【答案解析】济生肾气丸的临床应用是肾阳不足，水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝酸重，小便不利，痰饮咳喘。

9. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】便秘——虚秘【方剂应用】基础方剂：黄芪汤（黄芪、陈皮、火麻仁、白蜜）加减。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】便秘——冷秘【方剂应用】基础方剂：温脾汤（附子、人参、大黄、干姜、甘草）合半硫丸（半夏、硫黄）加减。

(3) 【正确答案】 E

【答案解析】便秘——气秘【方剂应用】基础方剂：六磨汤（沉香、木香、槟榔、乌药、枳壳、大黄）加减。

10. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】喘证——风寒闭肺证【症状】喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。

【治法】宣肺散寒平喘。

【方剂应用】基础方剂：麻黄汤（麻黄、杏仁、桂枝、炙甘草）合华盖散（麻黄、杏仁、桑白皮、紫苏子、茯苓、陈皮）加减。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】喘证——痰热壅肺证【症状】喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷、身热、有汗、口渴喜冷饮、咽干、面红、尿赤、便秘。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

【治法】清热化痰，宣肺平喘。？

【方剂应用】基础方剂：桑白皮汤(桑白皮、半夏、苏子、苦杏仁、贝母、黄芩、黄连、梔子)加减。

(3)【正确答案】C

【答案解析】喘证——肾不纳气证【症状】喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细数。

【治法】补肾纳气。

【方剂应用】基础方：肾气丸(桂枝、附子、熟地、山萸肉、山药、茯苓、丹皮、泽泻)合参蛤散(人参、蛤蚧)加减。

11. (1)【正确答案】A

【答案解析】疔热毒蕴结证可选用的中成药有连翘败毒丸、芩连片、清热暗疮片、龙珠软膏、如意金黄散。连翘败毒丸的临床应用是风热毒邪蕴结肌肤所致疮疡。症见肌肤红赤、肿胀、微热、疼痛。舌尖红，脉浮数；体表急性感染性疾病见上述证候者。

(2)【正确答案】B

【答案解析】疔肿湿毒蕴结证可选用的中成药有皮肤病血毒丸、老鹳草软膏。皮肤病血毒丸的临床应用是血热风盛，湿毒瘀结所致疔肿。症见与毛囊一致的圆锥状炎性小结节、周围色红肿硬、触痛明显。热毒较盛者可伴有恶寒、发热、口干、尿黄、大便干；皮肤浅表化脓性疾病见上述证候者。

(3)【正确答案】D

【答案解析】乳癖肝郁痰凝证可选用的中成药有乳核散结片、乳疾灵颗粒、乳康片。乳疾灵颗粒的临床应用是肝郁气滞、痰瘀互结所致乳癖。症见一侧或双侧乳房肿块，可有触痛，肿块边界欠清，与周围组织不粘连，乳房可有触痛，每随喜怒而消长，常在月经前加重，月经

后缓解；乳腺增生见上述证候者。

12. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 月经先后无定期肾虚证可选用的中成药是鹿胎胶囊。鹿胎胶囊的临床应用是气血两虚，肾气不足所致月经不调。症见月经先后不定期，经行不畅，经色暗淡，神疲乏力，腰膝酸软，带下清稀，舌淡苔白，脉弱。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 月经后期肾虚证可选用的中成药有春血安胶囊、天紫红女金胶囊。春血安胶囊的临床应用是肝肾不足，冲任失调所致月经失调。症见经行错后、经水量多或淋漓不净、经行小腹冷痛、腰部疼痛；青春期功能失调性子宫出血、上节育环后出血见上述证候者。

(3) 【正确答案】 A

【答案解析】 月经前期肾气虚证可选用的中成药是女金丹丸。女金丹丸的临床应用是肾亏血虚所致月经先期。症见经期提前，经量少，色淡质稀，腰酸腿软，面色晦暗，头晕耳鸣，舌暗淡，苔薄白，脉沉细。

13. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 常山，有毒，5~9g。妊娠慎用，有催吐副作用，量不宜过大。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 丁公藤，小毒，3~6g，用于配制酒剂，内服或外搽。妊娠禁用，有强烈的发汗作用，虚弱者慎用。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 猪牙皂，小毒，1~1.5g，多入丸散。外用适量，研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。妊娠禁用，咯血吐血者禁用。

14. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】尪痹冲剂中含有附子，通宣理肺丸中含有半夏，根据十八反“半蒺贝菝及攻乌”得知，附子与半夏存在配伍禁忌，故尪痹冲剂不宜与通宣理肺丸合用。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】利胆中成药利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片等都含有郁金，若与六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散等含丁香（母丁香）的中成药同时使用，就要注意具“十九畏”药物的禁忌。

15. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】鸦胆子泌尿系统毒性表现为尿量减少、双肾刺痛，外用可引起过敏反应。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】白矾神经毒性表现为阿尔兹海默病、痴呆和认知功能障碍。

16. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】含乌头类药物和含乌头类药物的中成药中毒表现是：口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清或小便失禁，继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】含雄黄的中成药中毒表现：各种出血症状，如吐血、咯血、眼结膜充血、鼻衄、便血、尿血等。

(3) 【正确答案】 A

【答案解析】含有马钱子药物的中毒表现是：初期出现头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难；进而伸肌与屈肌同时做极度收缩，发生典型的士的宁惊厥、痉挛，甚至角弓反张，可因呼吸肌痉挛窒息或心力衰竭而死亡。

(4) 【正确答案】 E

【答案解析】含朱砂、轻粉、红粉的中成药的中毒表现：消化系统表现为恶心呕吐、腹痛腹

泻、口中有金属味、流涎、口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂等。

17. (1)【正确答案】A

【答案解析】患者已使用，但未造成伤害的差错属于C级。

(2)【正确答案】B

【答案解析】差错对患者的伤害可导致患者住院或延长住院时间属于F级。

(3)【正确答案】C

【答案解析】差错导致患者生命垂危，需要应用维持生命的措施属于H级。

(4)【正确答案】E

【答案解析】差错导致患者死亡属于I级。

### 三、综合分析选择题

1. (1)【正确答案】B

【答案解析】心在舌的分布部位为舌尖。舌为心之苗，所以舌尖生疮，说明病位在心。

(2)【正确答案】B

【答案解析】数脉主热证。

2. (1)【正确答案】B

【答案解析】眩晕——气血亏虚证【症状】眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀。舌淡苔薄白，脉细弱。

(2)【正确答案】C

【答案解析】眩晕——气血亏虚证【治法】补益气血，调养心脾。

(3)【正确答案】A

【答案解析】眩晕——气血亏虚证【方剂应用】基础方剂 归脾汤(人参、黄芪、白术、茯神、龙眼肉、酸枣仁、木香、当归、远志、生姜、大枣、甘草)加减。

3. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】腰痛——寒湿腰痛

【症状】腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧疼痛不减，寒冷和阴雨天加重。舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】腰痛——寒湿腰痛【治法】散寒除湿，温经通络。

(3) 【正确答案】 E

【答案解析】腰痛——寒湿腰痛【方剂应用】基础方剂：甘姜苓术汤(甘草、干姜、茯苓、白术)加减。

4. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】胁痛——肝络失养证【症状】胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩。舌红少苔，脉细弦而数。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】胁痛——肝络失养证【治法】养阴柔肝。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】胁痛——肝络失养证【方剂应用】基础方剂：一贯煎(北沙参、麦冬、当归、生地黄、枸杞子、川楝子)

5. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】水肿是体内水液潴留，泛滥肌肤，表现以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为特征的疾病。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】水肿——肾阳衰微证【症状】水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下甚，按

之凹陷不起，尿量减少或反多，腰酸冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，面色㿔白，甚者心悸胸闷，喘促难卧，腹大胀满。舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟无力。

(3) 【正确答案】 B

【答案解析】 水肿——肾阳衰微证【治法】温肾助阳，化气行水。

(4) 【正确答案】 C

【答案解析】 水肿——肾阳衰微证【方剂应用】基础方剂：济生肾气丸（附子、车前子、山茱萸、山药、牡丹皮、牛膝、熟地黄、肉桂、茯苓、泽泻）合真武汤（茯苓、芍药、白术、生姜、附子）加减。

6. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 健脾生血颗粒【功能】健脾和胃，养血安神。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 健脾生血颗粒所含的西药成分是硫酸亚铁。

(3) 【正确答案】 E

【答案解析】 健脾生血颗粒忌茶，勿与含鞣酸类药物合用。服药期间，部分患儿可出现牙齿颜色变黑，停药后可逐渐消失；少数患儿服药后，可见短暂性食欲下降，恶心，呕吐，轻度腹泻，多可自行缓解。

7. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 壮骨关节丸的不良反应包括皮疹、瘙痒，恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胃痛，血压升高，肝损害。在不良反应的报告中，胆汁淤积型肝炎例数有一定比例。女性闭经为雷公藤的不良反应。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 壮骨关节丸的用药指导

(1) 建议患者应严格遵医嘱用药，避免大剂量、长期连续用药；一旦出现纳差、尿黄、皮肤黄染等症状应及时停药就医。

(2) 肝功能不良或特异体质者慎用，定期检查肝功能。

(3) 30 天为一疗程，长期服用者每疗程之间间隔 10~20 天。

E 项属于雷公藤制剂的用药指导，故本题选 E。

#### 四、多项选择题

1. 【正确答案】ABCDE

【答案解析】中药药学服务的主要实施内容包含与患者用药相关的全部需求，因此药学服务的具体工作，除传统的中药处方调剂工作以外，还包括中药处方点评、用药咨询、中药医嘱审核、参与临床查房、开展药学查房、开展药学监护、参与临床会诊、患者用药教育、健康宣教、个体化药学服务及用药安全性检测等多个环节。

2. 【正确答案】ABCDE

【答案解析】阴阳偏衰的治法有：阴病治阳、阴中求阳、阳病治阴、阳中求阴、阴阳双补。

3. 【正确答案】BDE

【答案解析】易耗伤津液的病邪：暑邪、燥邪、火邪。

4. 【正确答案】ACE

【答案解析】正治是临床上最常用的一种治疗法则。常用的治法有寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之等。

5. 【正确答案】BCD

【答案解析】患者为尪痹，尪痹可选用的中成药有独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸。

6. 【正确答案】ABCD

【答案解析】人参再造丸中只含有朱砂，不含有雄黄，故不选 E。

7. 【正确答案】 ABDE

【答案解析】含盐酸麻黄碱的中成药品种有良园枇杷叶膏、痰咳清片、镇咳宁糖浆、安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、消咳宁片。

8. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】肾功能不全者用药基本原则和注意事项包括：

- (1) 明确疾病诊断和治疗目标；
- (2) 忌用有肾毒性的药物；
- (3) 注意药物相互作用，避免产生新的肾损害；
- (4) 坚持少而精的用药原则；
- (5) 定期检查，及时调整治疗方案。

9. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】金银花、连翘、黄芩、鱼腥草等及其中成药，不宜与菌类制剂如乳酶生、促菌生等联用，因金银花、连翘、黄芩、鱼腥草等及其中成药具有较强抗菌作用，服用后在抗菌的同时，还能抑制或降低西药菌类制剂的活性。

10. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】合理用药的目的，首先就是要最大限度地发挥药物治疗效能，将中药和中成药的不良反应降低到最低限度，甚至于零。其次是使患者用最少的支出，冒最小的风险，得到最好的治疗效果。其三是最有效地利用卫生资源，减少浪费，减轻患者的经济负担。其四是方便患者使用所选药物。