

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023年第30期

女性生殖系统病理妊娠是考试中的重中之重,每年的分值均在第一位,在医师考试中属于分数多、有些难度的章节,这里介绍女性生殖系统病理妊娠的一部分相关考点。

问题索引:

1. 妊娠期高血压疾病的高危因素有哪些?
2. 重度子痫前期如何诊断?
3. 重度子痫前期应如何处理?

具体解答:

1. 妊娠期高血压疾病的高危因素有哪些?

不是妊娠期高血压疾病的高危因素的是

- A. 孕妇年龄过小或大于40岁
- B. 过期妊娠
- C. 多胎妊娠
- D. 糖尿病与肥胖
- E. 低社会经济状况

【答案】B

【解析】妊娠期高血压疾病的高危因素:初产妇、孕妇年龄过小或大于40岁、多胎妊娠、妊娠期高血压病史及家族史、慢性高血压、慢性肾炎、抗磷脂抗体综合征、糖尿病与肥胖、营养不良、低社会经济状况、妊娠间隔时间 ≥ 10 年、孕早期收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 80\text{mmHg}$,均与子痫前期-子痫发病风险增加密切相关。[医学教育网原创]

2. 重度子痫前期如何诊断?

妊娠期高血压疾病时24小时尿蛋白定量达到或超过下述何项为重度子痫前期

- A. $\geq 1.0\text{g}/24\text{h}$

- B. $\geq 0.3\text{g}/24\text{h}$
- C. $5.0\text{g}/24\text{h}$
- D. $\geq 10\text{g}/24\text{h}$
- E. $\geq 15\text{g}/24\text{h}$

【答案】 C

【解析】子痫前期：妊娠 20 周后出现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ ，伴有尿蛋白 $\geq 0.3\text{g}/24\text{h}$ ，或随机尿蛋白（+）或虽无蛋白尿，但合并下列任何一项者：

血小板减少（血小板 $< 100 \times 10^9/\text{L}$ ）；

肝功能损害（血清转氨酶水平为正常值 2 倍以上）；

肾功能损害（血肌酐水平 $> 1.1\text{mg}/\text{dl}$ 或为正常值 2 倍以上）；

肺水肿；

新发生的中枢神经系统异常或视觉障碍。重度的时候尿蛋白 $\geq 5\text{g}/24\text{h}$ [医学教育网原创]

3. 重度子痫前期应如何处理？

边某，妊娠 32 周，经医生确诊为重度子痫前期，恰当的处理应是

- A. 积极治疗，等待产程发动
- B. 积极治疗 24~48 小时，症状无明显改善时应终止妊娠
- C. 积极治疗一周后，予以引产
- D. 立即引产
- E. 立即行剖宫术

【答案】 B

【解析】重度子痫前期患者：妊娠 < 24 周经治疗病情不稳定者建议终止妊娠；妊娠 24~28 周根据母胎情况及当地母儿诊治能力决定是否期待治疗；妊娠 28~34 周，如病情不稳定，经积极治疗 24~48 小时病情仍加重，促胎肺成熟后终止妊娠；如病情稳定，可考虑期待治疗，并建议转至具备早产儿救治能力的医疗机构；妊娠 ≥ 34 周患者，胎儿成熟后可考虑终止妊娠。[医学教育网原创]