

医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2024年第29期

肝脏疾病中有一些大家比较迷惑的考点，学员经常会提问到，下面给大家汇总一些，一起来学习一下。

问题索引：

1. 肝棘球蚴病是否可以诊断性穿刺？
2. 细菌性肝脓肿患者细菌侵入肝脏最常见的途径是？
3. 阿米巴肝脓肿典型特点有哪些？
4. 肝硬化最严重的并发症是什么？

具体解答：

1. 关于肝棘球蚴病的特点，叙述不正确的是

- A. 可并发囊肿破裂
- B. 以手术治疗为主
- C. 可行诊断性穿刺
- D. 牧区发病较多
- E. 可触及上腹肿块

【答案】C

【解析】肝棘球蚴病[医学教育网原创]严禁诊断性穿刺。可导致囊液包括子囊和原头蚴，进入腹腔，引起突发性腹痛和过敏性休克。

2. 细菌性肝脓肿患者细菌侵入肝脏最常见的途径是

- A. 经胆道
- B. 经肝动脉
- C. 经门静脉
- D. 经淋巴系统侵入
- E. 经开放性伤口直接进入

【答案】A

【解析】题目中的五个选项都是细菌侵入肝脏，引起细菌性肝脓肿[医学教育网原创]途径，其中最常见途径胆道蛔虫、胆道结石等胆道疾病引起的细菌性肝

脓肿。

3. 下列各项中，不符合阿米巴肝脓肿典型特点的是

- A. 多有阿米巴痢疾的病史
- B. 肝穿刺脓液常为棕褐色
- C. 起病缓，病程长，症状轻
- D. 结肠镜检可见结肠黏膜有慢性溃疡
- E. 脓肿常多发

【答案】E

【解析】阿米巴性肝脓肿是肠道阿米巴感染的并发症，故多有阿米巴痢疾的病史，起病较缓慢，病程长，发热等症状较细菌性肝脓肿轻，乙状结肠镜检时可见到结肠黏膜有慢性溃疡，穿刺肝脓肿[医学教育网原创]时可抽出褐色脓液。脓肿绝大多数是单发的（选项E是细菌性脓肿的特点）。

4. 肝硬化最严重的并发症是

- A. 低钠血症
- B. 肺部感染
- C. 肝肾综合征
- D. 自发性腹膜炎
- E. 肝性脑病

【答案】E

【解析】肝硬化最严重的并发症[医学教育网原创]是肝性脑病，最常见的并发症是上消化道出血。

www.med66.com