

仿真
密卷

✓ 学霸同款

✓ 精华提炼

✓ 实战练习

卫生专业技术资格考试

护理学（师）

医学教育网命题组 编

绝密·内部

依据考纲
精心研发

考前爆料
命题规律

精选考题
仿真练习

《基础知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 引起 II 型呼衰最常见的诱因是

- A. 过度劳累
- B. 精神紧张
- C. 呼吸道感染
- D. 营养不良
- E. 长期吸烟

2. 引起支气管扩张的主要原因是

- A. 先天性发育缺陷
- B. 支气管、肺组织的感染和支气管阻塞
- C. 支气管外部纤维的牵拉
- D. 遗传因素
- E. 过敏体质

3. 下列哪项不能诱发窦性心动过速

- A. 发热
- B. 甲亢
- C. 心衰
- D. 失血性贫血
- E. 频繁腹泻

4. 与急性胰腺炎发病无关的是

- A. 胰管梗阻
- B. 胆道疾病
- C. 暴饮暴食
- D. 酗酒
- E. 上消化道出血

5. 与慢性胃炎有关的主要病原菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 幽门螺杆菌
- C. 链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 军团菌

6. 急性肾功能衰竭少尿期最危险的并发症是

- A. 出血倾向
- B. 高钾血症
- C. 代谢性酸中毒
- D. 水中毒
- E. 尿毒症

7. 人体铁的吸收部位主要在

- A. 胃
- B. 十二指肠及空肠上段
- C. 空肠下段
- D. 回肠
- E. 回盲部

8. 特发性血小板减少性紫癜发病的相关因素是

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 甲状腺激素

- D. 抗利尿激素
- E. 肾上腺皮质激素

9. 下列哪一项不是生活中毒的常见原因

- A. 谋害
- B. 自杀
- C. 成瘾
- D. 生产农药时不注意防护
- E. 误服毒物

10. 脑出血最常见的病因是

- A. 高血压脑动脉硬化
- B. 脑动脉炎性管壁坏死
- C. 脑动脉瘤破裂
- D. 动静脉畸形
- E. 脑瘤出血

11. 下列选项中，血钙增高见于

- A. 佝偻病
- B. 急性出血性胰腺炎
- C. 甲状旁腺功能亢进
- D. 婴儿手足搐搦症
- E. 低蛋白血症

12. 关于肝硬化出现全血细胞减少的主要原因是

- A. 出血
- B. 营养坏死
- C. 并发感染
- D. 肝肾综合征
- E. 脾功能亢进

13. 关于左心衰竭的患者最常见症状是

- A. 便秘
- B. 体重下降
- C. 呼吸困难

- D. 肌肉酸痛
- E. 腹胀

14. 原发性气胸多见于

- A. 瘦弱老年人
- B. 瘦弱育龄期女性
- C. 胖矮体型女性青年
- D. 肥胖体型男性儿童
- E. 瘦高体型男性青壮年

15. 与原发性癫痫的发生有关的因素是

- A. 脑膜炎
- B. 脑肿瘤
- C. 脑血管病
- D. 颅脑外伤
- E. 遗传因素

16. 急性上呼吸道感染最常见的细菌为

- A. 流感嗜血杆菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 革兰氏阴性杆菌

17. 下列选项中，冠心病最常见的类型

- A. 心绞痛型
- B. 隐性冠心病
- C. 心肌梗死型
- D. 猝死型
- E. 猝死型

18. 对于烧伤休克患者，观察液量是否补足，简易而重要的指标是

- A. 脉率
- B. 末梢循环
- C. 尿量

- D. 血压
E. 神志
19. 关于直肠肛管周围脓肿的描述中，不正确的是
- A. 多由肛腺或肛窦感染引起
B. 少数原因为肛周皮肤感染、肛管直肠损伤
C. 直肠指诊对直肠肛管周围脓肿有重要意义
D. 一旦脓肿形成应及时切开引流
E. 坐骨直肠窝脓肿很少见
20. 关于感染性休克最常见于
- A. 胆道蛔虫症
B. 肝脓肿
C. 急性梗阻性化脓性胆管炎
D. 急性水肿性胰腺炎
E. 急性胆囊炎
21. 下列选项中，最易发生嵌顿的疝是
- A. 腹股沟斜疝
B. 股疝
C. 婴儿脐疝
D. 阴囊疝
E. (腹)白线疝
22. 下列选项中，内脏性疼痛的特点为
- A. 对牵拉、痉挛、缺血等压力性刺激敏感
B. 对刺、割、灼刺激敏感
C. 突发性绞痛，呈间歇性
D. 痛感弥散，定位不准确
E. 常伴有牵涉性疼痛
23. 患者，男，50岁。火灾事故中，大面积烧伤后1天入院，约占全身35%的面积为大小水疱，血压偏低。患者的主要病理生理改变是
- A. 休克
B. 心功能衰竭
C. 肾衰竭
D. 肝功能衰竭
E. 感染
24. 关于各种休克的共同病理改变是
- A. 血压下降
B. 脉压缩小
C. 有效循环血量锐减
D. 中心静脉压下降
E. 血管张力降低
25. 下列判断脱水性质最有效的辅助检查是
- A. 血钙浓度
B. 血常规
C. 血钠浓度
D. 血气分析
E. 尿比重
26. 血清钾的正常值是
- A. 4.5~5.5mmol/L
B. 3.5~5.5mmol/L
C. 3.5~4.5mmol/L
D. 3.0~4.0mmol/L
E. 2.5~3.5mmol/L
27. DIC 最常见的病因是
- A. 感染
B. 肿瘤
C. 创伤
D. 休克
E. 遗传
28. 属于不完全性骨折的是
- A. 螺旋形骨折

- B. 粉碎性骨折
C. 压缩性骨折
D. 青枝骨折
E. 骨骺分离
29. 下列关于肿瘤细胞分化描述正确的是
A. 高分化细胞接近正常，恶性程度低
B. 未分化细胞核分裂较少，恶性程度高
C. 高分化细胞核分裂较多，恶性程度高
D. 未分化细胞接近正常，恶性程度低
E. 高分化细胞核分裂较多，恶性程度中等
30. 胃壁主细胞分泌的是
A. 碱性黏液
B. 促胃液素
C. 胃蛋白酶
D. 盐酸
E. 抗贫血因子
31. 下列关于肾挫伤的病理变化描述正确的是
A. 肾包膜破裂
B. 肾包膜完整
C. 肾实质破裂
D. 肾周血肿
E. 大量血尿
32. 血淀粉酶显著增高见于
A. 胰腺炎
B. 溃疡病
C. 急性肝炎
D. 肝硬化
E. 心肌炎
33. 下列选项中，高危妊娠指
A. 对胎儿有高度危险的妊娠
B. 对母亲有高度危险的妊娠
C. 对新生儿有高度危险的妊娠
D. 凡能危害母儿或导致难产的妊娠
E. 凡可能导致难产的妊娠
34. 下列选项中，使子宫内膜出现增生期变化的激素是
A. 绒毛膜促性腺激素
B. 雌激素
C. 生乳素
D. 孕激素
E. 雄激素
35. 短效口服避孕药如果漏服，应于几小时内补服
A. 12 小时
B. 24 小时
C. 48 小时
D. 36 小时
E. 72 小时
36. 6~14 岁小儿血红蛋白正常值的低限是
A. 80g/L
B. 90g/L
C. 100g/L
D. 110g/L
E. 120g/L
37. 关于小儿肠套叠的粪便特点是
A. 鲜血便
B. 脓血便
C. 黏液脓血便
D. 血粪混合便
E. 果酱样黏液血便
38. 贫血患儿，活动量稍大时气促、心悸，

Hb40g/L，该患儿的贫血程度为

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 特重度

39. 下列选项中，出生时存在，而数月后消失的神经反射是

- A. 角膜反射
- B. 腹壁反射
- C. 握持反射
- D. 吞咽反射
- E. 膝腱反射

40. 下列选项中，婴幼儿最常见的贫血是

- A. 铅中毒性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 营养性缺铁性贫血
- E. 慢性溶血性贫血

41. 下列属于造成营养不良患儿水肿的主要原因是

- A. 喂养不当
- B. 严重感染
- C. 消化道畸形导致营养物质吸收不良
- D. 蛋白质严重缺乏
- E. 总热量不足

42. 影响子宫内膜由增殖期转变为分泌期的主要激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 促卵泡素

E. 黄体生成素

43. 关于月经的临床表现，下列描述不正确的是

- A. 月经是女性生殖系统周期性变化的重要标志
- B. 无排卵而有周期性子宫出血叫无排卵性月经
- C. 月经周期是指这次月经第 1 天至下次月经第 1 天
- D. 月经血呈暗红色不凝固
- E. 月经周期的长短决定于黄体期的长短

44. 卵子未受精，黄体开始萎缩的时间一般是在排卵后

- A. 3~4 天
- B. 5~6 天
- C. 9~10 天
- D. 11~12 天
- E. 13~15 天

45. 正常骨盆的形态是

- A. 骨盆的三个假想平面均呈横椭圆形
- B. 骨盆的三个假想平面均呈纵椭圆形
- C. 骨盆的入口和中骨盆平面为纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形
- D. 骨盆的入口及出口平面呈横椭圆形，中骨盆呈纵椭圆形
- E. 骨盆的入口平面呈横椭圆形，中骨盆平面呈纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形

46. 月经后子宫内膜再生层是

- A. 致密层
- B. 基层
- C. 功能层

- D. 子宫肌层
E. 海绵层
47. 受精卵着床约在受精后
A. 第 3 日
B. 第 4 日
C. 第 2~3 日
D. 第 6~7 日
E. 第 12~13 日
48. 妊娠早期血中高浓度的雌激素和孕激素来自
A. 肾上腺皮质
B. 卵泡
C. 妊娠黄体
D. 胎盘
E. 卵巢
49. 营养不良导致的代谢异常不包括以下哪项
A. 血糖偏低
B. 血清胆固醇降低
C. 血清清蛋白降低
D. 血钠、血钾偏低
E. 白细胞降低
50. 小儿肥胖症的诊断标准为体重超过同性别、同身高(长)小儿正常标准的
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
E. 50%
51. 小儿急性腹泻病程在
A. 2 周以内
B. 2 个月以内
C. 2 周~2 个月
D. 3 个月内
E. 3 周以内
52. 维持细胞内液渗透压的主要离子是
A. Na^+
B. Cl^-
C. K^+
D. HCO_3^-
E. Mg_2^+
53. 不属于小儿下呼吸道解剖特点的是
A. 支气管腔相对狭窄
B. 黏膜柔嫩血管丰富
C. 软骨柔软支撑力弱
D. 气道清除能力较差
E. 右侧支气管管腔狭窄
54. 关于急性感染性喉炎的病因说法正确的是
A. 可因病毒感染引起
B. 可因细菌感染引起
C. 常为上呼吸道感染的一部分
D. 可在麻疹病程中并发
E. 以上说法均正确
55. 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是
A. 间质性肺炎
B. 支气管肺炎
C. 毛细支气管肺炎
D. 干酪性肺炎
E. 大叶性肺炎
56. 小儿失钾的最重要原因是
A. 严重腹泻呕吐
B. 利尿药用量过多

- C. 肾上腺皮质激素过多
D. 某些肾脏疾病
E. 经皮肤失钾
57. 低血钾常发生于
A. 钾离子摄入减少
B. 醛固酮分泌减少
C. 钾离子进入细胞内减少
D. 肾脏排钾减少
E. 代谢性酸中毒
58. 下述有关钾平衡的描述哪一项是正确的
A. 体内的钾主要从食盐中摄入
B. 肠道不易吸收故肠道中钾浓度高
C. 细胞外钾浓度明显高于细胞内钾浓度
D. 多吃肾多排，少吃少排，不吃不排
E. 主要靠远曲管集合管对钾的分泌和重吸收来调节
59. 有关于局部麻醉说法正确的是
A. 作用于中枢神经系统
B. 病人意识和痛觉消失
C. 运动无障碍
D. 意识清醒
E. 反射活动增强
60. 检查心脏是否跳动，最简单可靠的是触摸颈动脉搏动，抢救者用 2~3 个手指放在气管与颈部肌肉间轻轻按压时间应小于
A. 10s
B. 9s
C. 8s
D. 7s
E. 6s
61. 复苏的目的不仅是恢复自主心跳和呼吸，更重要的是恢复
A. 中枢神经系统的功能
B. 消化系统的功能
C. 多个脏器的功能
D. 泌尿系统的功能
E. 内分泌系统的功能
62. 造成气性坏疽最主要的致病菌是
A. 破伤风梭菌
B. 绿脓杆菌
C. 产气荚膜梭菌
D. 枯草杆菌
E. 炭疽杆菌
63. 下列关于特异性感染特点的叙述正确的是
A. 均有红肿热痛和功能障碍
B. 同一种致病菌可引起同一种疾病
C. 不同致病菌可引起同一种疾病
D. 手术后感染多属此类
E. 一种致病菌只能引起一种特定感染
64. 因感染引起的全身性炎症反应，如体温、循环、呼吸等明显改变的外科感染的统称是
A. 高尿酸血症
B. 败血症
C. 菌血症
D. 坏血菌
E. 脓毒血症
65. 创伤的全身性反应，不包括
A. 体温反应
B. 神经内分泌系统的变化
C. 代谢变化
D. 免疫功能变化

E. 创伤性炎症

66. 颅内压增高的危急并发症和引起死亡的主要原因是

- A. 颅内血肿
- B. 癫痫
- C. 脑疝
- D. 颅内感染
- E. 脑缺氧

67. 成人如果长期缺碘，会引起的病症是

- A. 佝偻病
- B. 夜盲症
- C. 甲状腺肿大
- D. 贫血症
- E. 溶血症

68. 急性乳腺炎常发生于

- A. 产前 3~4 周
- B. 产前 1~2 周
- C. 产后 1~2 周
- D. 产后 3~4 周

二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 某病人已有数年怕热，多汗，食量大，但逐渐消瘦，检查发现 FT_4 及 FT_3 增高，昨天突然体温达 40°C ，心率 150 次/分，恶心、呕吐、腹泻，大汗持续而昏睡，急诊为甲状腺功能亢进症伴甲状腺危象，其原因是

- A. 甲状腺素大量破坏
- B. 机体消耗大量甲状腺素
- C. 腺垂体功能亢进
- D. 大量甲状腺素释放入血
- E. 下丘脑功能亢进

E. 产后 5~6 周

69. 预后最差的肺癌类型是

- A. 鳞癌
- B. 小细胞癌
- C. 大细胞癌
- D. 腺癌
- E. 支气管肺泡癌

70. 难复性疝的内容物多数为

- A. 大网膜
- B. 小肠
- C. 乙状结肠
- D. 阑尾
- E. 膀胱

71. 腹膜炎的分类命名不正确的是

- A. 急性
- B. 细菌性
- C. 原发性
- D. 麻痹性
- E. 弥漫性

2. 男，32 岁，上腹部疼痛已 1 天，进食后加剧，伴呕吐，呕吐后疼痛不缓解，疑为急性胰腺炎。应避免的病因中不包括哪项

- A. 胆道感染
- B. 胰管结石
- C. 慢性胃炎
- D. 酗酒
- E. 暴饮暴食

3. 患者女，40 岁。近月来发现有少量鲜血从乳头溢出，但乳房内未触及明显肿块，亦无头痛，考虑诊断为

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺囊性增生病
- C. 乳腺炎症
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺癌

4. 患者，女，28 岁。高处骑跨式摔落，外阴受伤，自诉疼痛难忍，体检发现外阴血肿，最可能的损伤部位是

- A. 小阴唇
- B. 大阴唇

- C. 处女膜
- D. 阴蒂部
- E. 前庭大腺

5. 患者女性，足月妊娠，规律性腹痛 10 小时，检查宫口开大 5cm。先露部头居棘上 1cm。大凶门位于 8 点，小凶门位于 2 点，下述胎位最正确的是

- A. 枕左前位
- B. 枕左后位
- C. 枕右前位
- D. 枕右后位
- E. 高直后位

三、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1. A. 瘫痪严重患者
- B. 中期功能锻炼的重点
- C. 依靠患者自身力量进行锻炼
- D. 关节僵硬
- E. 在起动时需要帮助

- (1) 手法治疗适应于
- (2) 被动运动适应于
- (3) 助力运动是
- (4) 主动运动是

- 2. A. 鼻
- B. 咽
- C. 喉
- D. 气管
- E. 肺泡

- (1) 呼吸道和消化道的共同通道是
- (2) 下呼吸道的起点是

- 3. A. 丹毒
- B. 新生儿皮下坏疽
- C. 疔
- D. 痈
- E. 脓性指头炎

- (1) 易引起化脓性海绵状静脉窦炎
- (2) 病变部位一般不化脓的是
- (3) 需要尽早切开的是

- 4. A. 乳头状腺癌
- B. 滤泡状腺癌
- C. 未分化癌
- D. 髓样癌
- E. 转移癌

- (1) 分泌大量降钙素的甲状腺癌是
- (2) 甲状腺癌恶性程度最高的是

- 5. A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

- (1) 36 岁女性属于
- (2) 50 岁女性属于

- 6. A. 新生儿 Hb<145g/L
- B. 1~4 个月 Hb<110g/L
- C. 4~6 个月 Hb<110g/L
- D. 6 个月~6 岁 Hb<110g/L
- E. 6~14 岁 Hb<110g/L

- (1) 以上哪一项是我国小儿血液病学会暂定 6 个月以下婴幼儿贫血标准
- (2) 以上哪一项为诊断儿童贫血的标准

- 7. A. 全脑葡萄糖代谢率降低
- B. 母亲有惊厥史
- C. 羊水阻塞
- D. 有病毒感染史

E. 病理性黄疸

- (1) 注意缺陷多动障碍的病因是
- (2) 脑瘫的病因是
- (3) 吉兰-巴雷综合症的病因是

- 8. A. 10%
- B. 40%~45%
- C. 40%
- D. 50%
- E. 35%

- (1) 心脏容量从妊娠早期至妊娠末期约增加
- (2) 至妊娠 32~34 周心排出量约增加
- (3) 妊娠期比非孕期肾小球滤过率约增加
- (4) 妊娠期比非孕期肾血浆流量约增加

- 9. A. 直接扩散
- B. 蔓延转移
- C. 种植转移
- D. 淋巴转移
- E. 血行转移

- (1) 肾癌常见转移途径
- (2) 膀胱癌的常见转移途径

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《相关专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 盆腔 CT 扫描前 3 天对饮食的要求是

- A. 高热量、高蛋白饮食
- B. 高热量、低蛋白饮食
- C. 低热量、高蛋白饮食
- D. 少渣、少胀气饮食
- E. 高热量、高纤维素饮食

2. 交替脉见于

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 贫血
- C. 甲状腺功能减退
- D. 左心衰竭
- E. 主动脉瓣关闭不全

3. 浅昏迷与深昏迷的区别是

- A. 有无自主运动
- B. 有无大、小便失禁
- C. 对声、光的反应
- D. 是否能被唤醒
- E. 角膜反射、瞳孔对光反射及防御反射是否存在

4. 血红蛋白尿见于

- A. 肾盂肾炎
- B. 急性肾炎
- C. 肾结石

D. 肾结核

E. 急性溶血

5. 网织红细胞的正常值为

- A. 成人 5%~15%
- B. 成人 3%~6%
- C. 成人 0.5%~1.5%
- D. 成人 6%~8%
- E. 成人 3%~4%

6. 正常人瞳孔直径为

- A. 1~2mm
- B. 3~4mm
- C. 2~5mm
- D. 4~5mm
- E. 5mm 以上

7. 长期高血压易导致脏器出现相关并发症，常累及的脏器是

- A. 心、脑、肾
- B. 心、肺、脑
- C. 心、肝、肾
- D. 肝、肾、脑
- E. 肝、肾、肺

8. 心力衰竭病人长期服用噻嗪类利尿剂最

易出现的是

- A. 低血钙
- B. 低血糖
- C. 高尿酸
- D. 低血钾
- E. 高血镁

9. 洋地黄类药物的常见心血管系统毒性反应为各种心律失常，最常见的心律失常类型是

- A. 窦性心动过缓
- B. 房室传导阻滞
- C. 室性期前收缩
- D. 心房颤动
- E. 室性心动过速

10. 易致洋地黄中毒的因素，不包括下列哪项

- A. 严重缺氧
- B. 补充钾盐
- C. 肾衰竭
- D. 急性心肌梗死
- E. 老年人

11. 肝癌非手术治疗首选的是

- A. 肝动脉化疗栓塞治疗
- B. 全身化学药物治疗
- C. 放射线治疗
- D. 免疫治疗
- E. 中医药治疗

12. 某病人原有肝硬化，近半个月来肝区特别痛，应查何化验有助于确诊

- A. 血沉
- B. 甲胎蛋白

C. 尿胆红素

- D. 血三酰甘油
- E. 血清球蛋白

13. 下列哪项是确诊消化性溃疡的首选检查方法

- A. 胃液分析
- B. 大便隐血试验
- C. 胃镜及胃黏膜活组织检查
- D. X 线钡餐检查
- E. 幽门螺杆菌检查

14. 下列选项中对诊断慢性肾衰竭有意义的是

- A. 红细胞计数下降
- B. 尿比重低
- C. 蜡样管型
- D. 血肌酐增高
- E. 代谢性酸中毒

15. 某女病人因发热、腰痛、尿频、尿急、尿痛就医，确诊为急性肾盂肾炎，尿化验的特点是

- A. 颗粒管型(++)
- B. 大量红细胞
- C. 蜡样管型
- D. 蛋白(++)
- E. 尿白细胞，5 个/HP

16. 可确定慢性肾小球肾炎病理类型的检查是

- A. 尿常规
- B. 免疫学检查
- C. 肾功能检查
- D. 病原学检查

- E. 肾活组织检查
17. 急性白血病患者的骨髓象是
- A. 多为原始细胞和幼稚细胞
B. 多为中性核和中性分叶核细胞
C. 多为淋巴细胞和巨幼细胞
D. 以淋巴细胞为主，少数幼稚淋巴细胞
E. 多为中幼、晚幼粒和杆状粒细胞
18. 治疗中枢神经系统白血病的常用药物是
- A. 阿霉素
B. 长春新碱
C. 甲氨蝶呤
D. 环磷酰胺
E. 苯丁酸氮芥
19. 区别急淋和急非淋白血病的检查是
- A. 血常规
B. 骨髓象
C. 细胞化学染色
D. 免疫学检查
E. 染色体和基因检查
20. 以下关于营养性缺铁性贫血骨髓象检查描述错误的是
- A. 各系均增生活跃
B. 以中、晚幼红细胞增生明显
C. 幼红细胞胞体小，胞浆少，染色偏蓝
D. 胞浆成熟落后于胞核
E. 幼红细胞增生活跃
21. 阿卡波糖服用方法是
- A. 饭前服用
B. 饭后服用
C. 与第一口饭同时嚼服
D. 饭后 1 小时服用
E. 饭前半小时服用
22. 为使血浆 PH 保持在正常的范围， $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 保持在
- A. 10: 1
B. 15: 1
C. 20: 1
D. 25: 1
E. 30: 1
23. 严重高渗性脱水的病人首选补液的液体是
- A. 生理盐水
B. 平衡盐溶液
C. 5%葡萄糖溶液
D. 5%碳酸氢钠溶液
E. 5%葡萄糖盐水
24. 高钾血症是血清钾大于
- A. 4.5mmol/L
B. 5.5mmol/L
C. 6.5mmol/L
D. 7.5mmol/L
E. 8.5mmol/L
25. 以下有关肠内营养支持的叙述正确的是
- A. 当不能采用肠外营养时采用
B. 要素饮食是有渣饮食
C. 最常见的并发症是便秘
D. 液化饮食是人工合成的营养成分
E. 最严重的并发症是误吸
26. 低血容量性休克应首先快速扩容，下列扩容溶液最优越的是

- A. 平衡盐溶液
B. 0.9%氯化钠
C. 代血浆
D. 葡萄糖溶液
E. 10%葡萄糖溶液
27. 破伤风病人治疗的重要环节是
A. 清除毒素来源
B. 中和游离毒素
C. 控制并解除痉挛
D. 防治并发症
E. 早期行气管切开术
28. 对实体肿瘤最有效的治疗方法是
A. 手术切除
B. 放射治疗
C. 化疗
D. 内分泌治疗
E. 中医中药治疗
29. 多少岁以下的青少年患有弥漫性甲状腺肿不宜手术治疗
A. 16 岁
B. 19 岁
C. 20 岁
D. 25 岁
E. 28 岁
30. 急性乳腺炎的治疗下列哪项不妥
A. 患者暂停哺乳，严重者应予断乳
B. 局部热敷或用微波透热
C. 局部封闭或外敷清热解毒中草药
D. 为防止组织坏死应尽早切开引流
E. 全身症状重者应静点大量有效的抗生素
31. 早期食管癌病人治疗方法首选
A. 化学疗法
B. 放射疗法
C. 激光疗法
D. 手术疗法
E. 免疫疗法
32. 胃肠减压的目的不正确的是
A. 降低胃肠道内的压力
B. 改善胃肠壁血液循环
C. 有利于炎症局限
D. 预防体液丢失
E. 促进胃肠功能恢复
33. 诊断直肠癌最重要且简便易行的检查方法是
A. 纤维结肠镜检查
B. 大便潜血试验
C. 钡剂灌肠检查
D. 直肠指诊
E. CEA 测定
34. 下列哪项不是急性阑尾炎手术治疗的适应证
A. 化脓性或坏疽性阑尾炎
B. 阑尾穿孔并发腹膜炎
C. 小儿急性阑尾炎
D. 慢性阑尾炎急性发作
E. 阑尾周围脓肿
35. 门静脉高压患者行分流术后最易导致的并发症是
A. 肾功能不全
B. 肝性脑病
C. 溶血性贫血

- D. 肝原性糖尿病
E. 结节性动脉周围炎
36. 有关 B 超检查胆道疾病的优点的描述不正确的
- A. 确诊率高
B. 安全，无痛苦
C. 术前不需禁食、禁水
D. 无任何禁忌证
E. 是无损伤检查法
37. 某胰腺炎患者，对其行非手术治疗的措施不妥的是
- A. 禁食和胃肠减压
B. 解痉止痛
C. 静脉输液
D. 腹腔引流
E. 应用胰酶抑制剂
38. 下肢深静脉血栓病人最主要的治疗方法是
- A. 抗凝疗法
B. 卧床休息
C. 穿弹力袜或弹力绷带
D. 溶栓疗法
E. 手术取栓
39. 静脉肾盂造影检查前的护理，下列哪项是错误的
- A. 常规肠道准备
B. 准备泛影葡胺造影剂
C. 做碘过敏试验
D. 鼓励病人多饮水
E. 禁食，排空小便
40. 为了检查尿道损伤病人尿道是否连续、完整，简便的检查方法是
- A. X 线
B. B 超
C. CT
D. 导尿
E. 尿道造影
41. 肾损伤时表明有活动性出血的指标是
- A. 肉眼血尿
B. 中性粒细胞比例升高
C. 白细胞计数增高
D. 血细胞比容持续降低
E. 尿外渗
42. 肾结核术后还需抗结核治疗的时间为
- A. 2 周
B. 1 个月
C. 2 个月
D. 3~6 个月
E. 6 个月以上
43. 保留膀胱的各种手术 2 年内肿瘤复发率在
- A. 20% 以上
B. 30% 以上
C. 40% 以上
D. 50% 以上
E. 60% 以上
44. 以下属于直接牵引的是
- A. 枕颌带牵引
B. 骨盆带牵引
C. 骨盆悬吊牵引
D. 皮肤牵引

E. 骨牵引

45. 在石膏固定病人的护理中最重要的评估内容是

- A. 心理社会反应
- B. 固定是否确切
- C. 肢体血运情况
- D. 生活自理能力
- E. 既往身体状况

46. 对骨折病人不应做的检查是

- A. 肢体测量
- B. 骨擦感或骨擦音
- C. 直接压痛
- D. 间接压痛
- E. X 线拍片

47. 早期滑膜结核与类风湿性关节炎鉴别的可靠依据是

- A. 累及关节的数目
- B. 血沉是否正常
- C. 关节间隙是否狭窄
- D. 结核菌素试验
- E. 滑膜组织病理学检查

48. 腰椎间盘突出症时，可以减轻椎间隙压力、促进髓核还纳的治疗方法是

- A. 给予镇痛药
- B. 骨盆牵引
- C. 腰背肌锻炼
- D. 睡软床
- E. 硬膜外注射皮质激素

49. 第一产程的平均时间，初产妇是

- A. 13~14 小时

B. 11~12 小时

C. 9~10 小时

D. 6~8 小时

E. 5~6 小时

50. 患者，女，27 岁。已婚，既往月经规律，因月经过期 10 天而就诊，要求明确是否怀孕，对确诊帮助最大的检查是

- A. 超声多普勒
- B. 免疫法测定 HCG
- C. 测宫底高度
- D. 测孕激素
- E. 宫颈黏液涂片镜检

51. 羊水栓塞的处理，正确的是

- A. 改善低氧血症
- B. 立即终止妊娠，可提高治愈率
- C. 出血不止时，立即应用肝素抗凝
- D. 慎用肾上腺皮质激素
- E. 休克早期禁用低分子右旋糖酐

52. 不属于化脓性脑膜炎治疗原则的是

- A. 大剂量用药
- B. 早期用药
- C. 坚持用药
- D. 联合用药
- E. 对症处理

53. 产后会阴护理哪项不对

- A. 每日消毒液擦洗会阴部两次
- B. 会阴水肿可用 50% 硫酸镁湿热敷
- C. 会阴有侧切者应取伤口同侧卧位
- D. 会阴伤口红肿可用红外线照射
- E. 每次会阴护理时更换消毒会阴垫

54. 诊断胎儿宫内窘迫的依据不包括

- A. 胎心音不规律， <100 次/分
- B. 胎动频繁
- C. 羊膜镜检羊水深绿色
- D. 胎儿头皮血 pH 值 <7.20
- E. 胎位异常

55. 妊娠合并病毒性肝炎有传染性的指标是

- A. 检测出 HCV
- B. 尿胆红素阳性
- C. HBeAg 是活动性复制
- D. HAV-IgM 阳性
- E. 抗 HBe

二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 男，55 岁。压榨性心前区病痛，持续 2 小时，舌下含服硝酸甘油无效入院，心电图示 $V_1 \sim V_4$ 导联 ST 段抬高弓背向上，应立即做好下列哪项治疗准备

- A. 静脉推注利多卡因
- B. 口服卡托普利
- C. 同步电复律
- D. 尿激酶溶栓治疗
- E. 静脉滴注低分子右旋糖酐

2. 患者男性，41 岁。饮酒后上腹部剧痛 12 小时，伴有恶心、呕吐，疼痛向右肩部放射。查体：上腹部压痛、反跳痛明显，Murphy 征(-)，肠鸣音消失。为明确诊断首选的化验检查是

- A. 血常规检查
- B. 尿常规检查
- C. 肝功能检查
- D. 血淀粉酶含量测定
- E. 血中胆红素测定

3. 男性，57 岁，拟行局麻下手部脓肿切开引流术，局部注射适量利多卡因后不久出现面色潮红、恶心、视物模糊、血压上升

和烦躁不安等表现，首先应考虑其出现了

- A. 过度紧张
- B. 高血压危象
- C. 低血糖反应
- D. 药物过敏反应
- E. 局麻药毒性反应

4. 护士小李负责护理重度烧伤患者，在护理工作中小李观察患者的补液量是否充足的最重要和简易的指标是

- A. 血压
- B. 心率
- C. 末梢循环
- D. 尿量
- E. 精神状态

5. 患者女，因外伤导致脾破裂，除立即手术后还要进行输血，目的是补充

- A. 蛋白质
- B. 抗体
- C. 血红蛋白
- D. 血容量
- E. 凝血因子

6. 患儿男，1 岁。高热惊厥入院，治疗 1 周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育重点是

- A. 合理的喂养方法
- B. 体格锻炼的方法
- C. 惊厥预防及急救措施
- D. 预防接种的时间
- E. 门诊复查的时间

7. 患儿，女，3 岁。化脓性脑膜炎。诊断为肺炎链球菌感染，病原菌明确后，抗生素治疗的疗程为

- A. 1 周
- B. 7~10 天
- C. 10~14 天
- D. 1 个月
- E. 1.5 个月

8. 经产妇，27 岁。足月顺产后第 2 天，出

现轻微下腹部阵痛。脐下 3 指可触及宫底，无压痛，阴道流血不多，无恶心、呕吐。本例恰当处理措施应为

- A. 排除肠梗阻
- B. 一般不需处理
- C. 抗生素预防感染
- D. 按摩子宫
- E. 给予止血药物

9. 24 岁初孕妇。妊娠 33 周，头痛 6 天，经检查 BP165/110mmHg，治疗 3 天无显著效。今晨 5 时突然出现剧烈腹痛。检查子宫板状硬。最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 前置胎盘
- C. 先兆早产
- D. 痉挛性子宫收缩
- E. 先兆子宫破裂

三、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1. A. 腹部叩诊移动性浊音
- B. 呕吐咖啡色液体
- C. 脑膜刺激征
- D. 不能唤醒，有浅反射
- E. 昏迷病人呼气有烂苹果味
- (1) 腹部大量腹水时
- (2) 上消化道大出血时
- (3) 酮症酸中毒时
- (4) 浅昏迷时
- 2. A. 耳鸣、耳聋

- B. 胃肠道刺激症状
- C. 黄疸、转氨酶一过性升高
- D. 周围性神经炎
- E. 球后视神经炎
- (1) 链霉素常见副作用为
- (2) 利福平常见的副作用为
- 3. A. 叶酸
- B. 钾盐
- C. 钙剂
- D. 铁剂

E. 蛋白质

- (1) 营养性缺铁性贫血主要补充
- (2) 营养性巨幼红细胞贫血主要补充

4. A. 静脉肾盂造影

B. 肾动脉造影

C. X 线检查

D. B 超检查

E. 膀胱镜检查

- (1) 诊断膀胱癌最直接、可靠的检查是
- (2) 用于早期诊断肾癌的常用检查是

5. A. 黄色、混浊状，含有食物残渣液体

B. 草绿色透明腹水

C. 血性臭味很重的液体

D. 血性、淀粉酶增高液体

E. 不凝固的血液

- (1) 胃十二指肠溃疡穿孔腹腔穿刺液的性质
- (2) 结核性腹膜炎腹腔穿刺液的性质
- (3) 绞窄性肠梗阻腹腔穿刺液的性质
- (4) 坏死性胰腺炎腹腔穿刺液的性质
- (5) 实质性脏器破裂腹腔穿刺液的性质

6. A. 从胎儿娩出到胎盘娩出

B. 从宫颈口开全到胎儿娩出

C. 从有规律性宫缩到宫口开全

D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出

E. 从有规律性宫缩到胎儿胎盘娩出

- (1) 第一产程指
- (2) 第二产程指

7. A. 白带悬滴检查

B. 分泌物涂片检查

C. 宫颈组织检查

D. 分段诊断性刮宫检查

E. 宫颈刮片检查

(1) 宫颈癌患者确诊的方法是

(2) 阴道假丝酵母菌病患者确诊的方法是

8. A. 口服维生素 D

B. 将舌尖拉出口外

C. 给抗惊厥药

D. 上、下磨牙间放压舌板

E. 注射维生素 D

- (1) 维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥时
- (2) 维生素 D 缺乏性手足搐搦症窒息时

9. A. 孕 24 周末

B. 孕 28 周末

C. 孕 32 周末

D. 孕 36 周末

E. 孕 40 周末

(1) 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起点，用软尺测量宫底高度为 26cm (22.4 ~ 29.0cm)，其孕周为

(2) 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起点，用软尺测量宫底高度为 32cm (29.8 ~ 34.5cm)，孕周为

(3) 孕妇产前检查，以耻骨联合上缘为起点，用软尺测量宫底高度为 33cm (30.0 ~ 35.3cm)，其孕周为

10. A. 肝功损害，消化道症状

B. 精神兴奋，周围神经炎、肝功受损

C. 耳聋

D. 球后视神经炎

E. 肾功能不全

(1) 异烟肼

(2) 链霉素

(3) 乙胺丁醇

(4) 利福平

- 11. A. 维生素 A 可助于疾病恢复
- B. 维生素 B₁₂ 可用于本病恢复
- C. 并发脑膜炎时可用肾上腺皮质激素
- D. 选用对杆菌敏感的抗生素
- E. 本病首选红霉素治疗

(1) 流行性腮腺炎

(2) 麻疹

12. A. 钾盐

- B. 叶酸
- C. 铁剂
- D. 钙剂
- E. 蛋白质

(1) 小儿营养性缺铁性贫血应主要补充

(2) 小儿营养性巨幼红细胞性贫血应主要补充

- 13. A. 白细胞总数及中性粒细胞总数增多
- B. 白细胞总数降低
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 淋巴细胞减少
- E. 小细胞增多

(1) 提示病毒感染引起小儿腹泻的血常规表现为

(2) 提示细菌感染引起小儿腹泻的血常规表现为

(3) 过敏性肠炎引起小儿腹泻的血常规表现为

(4) 寄生虫性肠炎引起小儿腹泻血常规表现为

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 以下对 II 型呼吸衰竭病人的护理，错误的是

- A. 清醒病人鼓励用力咳嗽
- B. 给予高浓度低流量持续吸氧
- C. 痰液黏稠病人要加强雾化
- D. 昏迷病人必要时可机械吸痰
- E. 遵医嘱使用呼吸兴奋药，保持呼吸道通畅

2. 对改善早期肺气肿症状具有重要意义的措施是

- A. 预防呼吸道感染
- B. 戒烟
- C. 去除外界刺激因素
- D. 呼吸功能锻炼
- E. 体位引流

3. 支气管哮喘发作时以下护理措施不妥的是

- A. 限制水摄入
- B. 半坐位
- C. 专人护理
- D. 遵医嘱给予解痉药物
- E. 吸氧

4. 1999 年 WHO/ISH 对一级高血压的诊断标准是

- A. 收缩压 < 120mmHg, 舒张压 < 80mmHg
- B. 收缩压 < 130mmHg, 舒张压 < 85mmHg
- C. 收缩压 140 ~ 159mmHg, 舒张压 90 ~ 99mmHg
- D. 收缩压 130 ~ 139mmHg, 舒张压 85 ~ 89mmHg
- E. 收缩压 160 ~ 179mmHg, 舒张压 100 ~ 109mmHg

5. 频发室性期前收缩的定义是

- A. 室性期前收缩 > 60 次/分钟
- B. 室性期前收缩 > 30 次/分钟
- C. 室性期前收缩 > 20 次/分钟
- D. 室性期前收缩 > 10 次/分钟
- E. 室性期前收缩 > 5 次/分钟

6. 左心功能不全所致呼吸困难是由于

- A. 上腔静脉淤血
- B. 体静脉淤血
- C. 门静脉淤血
- D. 下腔静脉淤血
- E. 肺淤血

7. 下列哪项不是右心衰竭的体征
- A. 肝大
 - B. 胸水
 - C. 腹水
 - D. 颈静脉怒张
 - E. 肝颈静脉回流征阳性
8. 消化性溃疡大出血病人护理措施不包括
- A. 迅速建立静脉通路
 - B. 冰盐水洗胃
 - C. 应用三腔两囊管
 - D. 暂禁食
 - E. 观察粪便颜色及量
9. 水肿型胰腺炎与出血坏死型胰腺炎的主要鉴别点是
- A. 发热
 - B. 休克
 - C. 剧烈腹痛、腹部体征
 - D. 恶心呕吐
 - E. 电解质紊乱
10. 原发性肝癌患者突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征，应考虑
- A. 肝癌腹膜移位
 - B. 肝癌结节破裂
 - C. 急性胃穿孔
 - D. 急性胆囊炎
 - E. 急性胰腺炎
11. 大便次数每日超过几次为腹泻
- A. 3 次
 - B. 4 次
 - C. 5 次
 - D. 6 次
 - E. 7 次
12. 下列哪项不是慢性肾衰竭终末期患者发生高血钾的原因
- A. 进食水果多
 - B. 进食肉类多
 - C. 限制含磷丰富的食物
 - D. 尿少
 - E. 使用保钾利尿药
13. 下列关于急性肾盂肾炎的护理措施中不妥的是
- A. 进食清淡、富有营养的食物，补充多种维生素
 - B. 多喝水，每天饮水量超过 2000ml
 - C. 体温过高时宜进行物理降温
 - D. 采用平卧位卧床休息可以减轻疼痛
 - E. 使用喹诺酮类药物应观察消化道反应，皮肤瘙痒等
14. 属于原发性肾病综合征的临床表现包括
- A. 大量蛋白尿，24h 尿蛋白定量测定 $>2.5\text{g}$
 - B. 血清白蛋白低于 50g/L
 - C. 常伴高胆固醇症
 - D. 无水肿
 - E. 常伴高脂血症
15. 慢性肾小球肾炎患者 24 小时尿蛋白量多为
- A. $>150\text{mg/d}$
 - B. $<1\text{g/d}$
 - C. $<1.5\text{g/d}$
 - D. $1\sim 3\text{g/d}$

E. $>3.5\text{g/d}$

16. 肾病综合征患者的饮食应为

- A. 正常蛋白饮食 $1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- B. 低蛋白饮食 $0.4\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- C. 低蛋白饮食 $0.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- D. 多食含饱和脂肪酸的食物
- E. 高盐饮食

17. 急性白血病患者出血的最主要原因是

- A. 血管壁通透性增加
- B. 血小板减少
- C. 血小板寿命缩短
- D. 抗凝物质增多
- E. 纤溶酶原激活物减少

18. 某再生障碍性贫血患者，给予丙酸睾酮治疗。该药的正确使用方法是

- A. 浅部肌肉注射
- B. 用药 1 个月见效即可停药
- C. 该药不良反应较少，用量可以适当加大
- D. 长期用药不会损害肝脏的功能
- E. 需经常更换注射部位，防止注射处发生肿块

19. 白消安的不良反不反应不包括

- A. 骨髓抑制
- B. 皮肤色素沉着
- C. 阳痿
- D. 停经
- E. 周围神经炎

20. 急性特发性血小板减少性紫癜的临床表现不包括

- A. 儿童多见
- B. 常有发热
- C. 皮肤黏膜出血
- D. 便血、尿血
- E. 关节痛

21. 各种贫血的护理诊断首先是

- A. 营养失调
- B. 有感染的危险
- C. 活动无耐力
- D. 呼吸型态改变
- E. 心排出量减少

22. 关于甲状腺功能亢进症病人的饮食护理，错误的是

- A. 高蛋白饮食
- B. 高碘饮食
- C. 高热量饮食
- D. 高维生素饮食
- E. 忌浓茶和咖啡

23. 符合甲状腺功能亢进症代谢率增高的表现是

- A. 神经过敏、失眠
- B. 心动过速、收缩压增高
- C. 肠蠕动增快、腹泻
- D. 甲状腺弥漫性肿大
- E. 怕热、多汗、食欲亢进

24. 可判定类风湿关节炎患者处于活动期的主要表现是

- A. 关节疼痛
- B. 关节畸形
- C. 关节肿胀

- D. 类风湿结节
E. 关节功能障碍
25. 类风湿关节炎关节病变的特点是
- A. 主要侵犯大关节
B. 不留关节畸形
C. 游走性疼痛
D. 对称性改变
E. 关节红肿热痛明显
26. 系统性红斑狼疮下列损害发生率最高的是
- A. 肾脏
B. 心血管
C. 肺与胸膜
D. 消化系统
E. 神经系统
27. 有机磷农药急性中毒，瞳孔变化是
- A. 扩大
B. 无变化
C. 大小不等
D. 略缩小
E. 明显缩小
28. 急性感染性多发性神经根神经炎发病的诱发因素是
- A. 情绪激动
B. 劳累
C. 饱餐
D. 寒冷
E. 吸烟
29. 下列哪项不属于脑桥出血的表现
- A. 对侧偏盲
B. 突然深昏迷
C. 中枢性高热
D. 四肢瘫痪
E. 两侧瞳孔针尖样缩小
30. 下列对昏迷病人护理措施的描述错误的是
- A. 观察病人生命体征
B. 保持呼吸道通畅
C. 每日清洁口腔 1 次
D. 每次气管吸痰不超过 15 秒钟
E. 保持皮肤清洁，预防压疮
31. 癫痫病人可进行的日常活动项目是
- A. 游泳
B. 打太极拳
C. 开汽车
D. 单独外出
E. 登高
32. 等渗性脱水病人输入大量等渗盐水时，可出现
- A. 血钠过高
B. 水中毒
C. 氯化钠过剩
D. 高氯性酸中毒
E. 低氯性酸中毒
33. 低磷血症时，实验室检查血清无机磷低于
- A. 0.75mmol/L
B. 0.85mmol/L
C. 0.92mmol/L

- D. 0.96mmol/L
E. 0.98mmol/L
34. 静脉输液补钾的先决条件是
- A. 尿量在 40ml/h 以上
B. 浓度在 0.3% 以下
C. 速度在 1.5g/h 以下
D. 总量在 4~5g/d 以下
E. 最多不要超过 3~6g/d
35. 关于肠内营养(EN), 下列哪项措施是不恰当的
- A. EN 符合生理、并发症少
B. 只要肠道有功能, 尽量采取 EN 支持
C. 昏迷病人不能用 EN
D. 营养液输入初始应缓慢、低浓度
E. 营养液的温度应接近体温
36. 抗休克最基本的措施是
- A. 吸氧
B. 应用血管活性药物
C. 纠正代谢性酸中毒
D. 补充血容量
E. 消除致病因素
37. 少尿是指 24 小时尿量少于
- A. 50ml
B. 100ml
C. 200ml
D. 300ml
E. 400ml
38. 急性肾衰竭病人的饮食护理中错误的是
- A. 高蛋白
B. 高热量
C. 充足维生素
D. 忌含钾丰富的食物
E. 控制入水量
39. 麻醉前禁食禁水的主要目的是
- A. 预防术中呕吐物误吸
B. 防止术中排便
C. 防止术后腹胀
D. 利于术后胃肠功能恢复
E. 防止术后尿潴留
40. 防止局部麻醉出现不良反应须做到
- A. 宁多勿少
B. 最小剂量、最低浓度
C. 用药最大剂量
D. 局部药物注入血管内
E. 麻药中勿加肾上腺素
41. 正确的胸外心脏按压, 是使胸骨下段下移
- A. 1~2cm
B. 3~4cm
C. 5~6cm
D. 7~8cm
E. 9~10cm
42. 下列不属于平均肺动脉压(MPAP)升高的表现是
- A. 肺血流量增加
B. 肺血管阻力升高
C. 二尖瓣狭窄
D. 肺动脉瓣狭窄
E. 左心功能不全

43. 人体在术后早期应激状态下出现的代谢改变是

- A. 肝糖原合成增加
- B. 高血糖
- C. 肌肉蛋白质分解增强
- D. 大量脂肪分解
- E. 胰岛素水平升高

44. 预防术后肺部感染的因素是

- A. 术前戒烟
- B. 术后早期活动
- C. 痰液黏稠时可给祛痰剂
- D. 鼓励病人深呼吸
- E. 应用镇咳剂

45. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿应

- A. 立即使用完
- B. 4h 用完
- C. 24h 用完
- D. 烘干后使用
- E. 重新灭菌

46. 关于急性蜂窝织炎的描述不正确的是

- A. 致病菌主要是化脓性链球菌
- B. 病变区与正常皮肤无明显界限
- C. 局部明显红肿剧痛
- D. 可由软组织损伤后感染引起
- E. 多伴有寒战、高热等全身症状

47. 破伤风的潜伏期一般为

- A. 2~3 天
- B. 4~5 天
- C. 7~8 天

D. 13~15 天

E. 6~20 天

48. 下列关于肿瘤化疗的叙述错误的是

- A. 可大剂量冲击疗法
- B. 可中剂量短程疗法
- C. 可小剂量维持疗法
- D. 多疗程治疗
- E. 避免联合用药

49. 恶性肿瘤病人放疗期间血小板降至 $80 \times 10^9 / L$ 时，首先应

- A. 暂停放疗
- B. 加强营养
- C. 少量输血
- D. 减少放射量
- E. 服用生血药物

50. 颅内压增高病人床头抬高 $15^\circ \sim 30^\circ$ 的主要目的是

- A. 有利于改善心脏功能
- B. 有利于改善呼吸功能
- C. 有利于颅内静脉回流
- D. 有利于鼻饲
- E. 防止呕吐物误入呼吸道

51. 下列有关促进脑脊液外漏通道早日闭合采取的措施说法错误的是

- A. 神志清醒者，取半坐卧位
- B. 昏迷者床头抬高 30° ，患侧卧位
- C. 维持半坐卧位体位至停止脑脊液漏后 1~3 日
- D. 半坐卧位目的是借助重力作用使脑组织移向颅底

- E. 半坐卧位主要使脑膜逐渐形成粘连而封闭脑膜破口
52. 甲亢病人术前需要服用的减少甲状腺素合成的药物是
- A. 阿托品
B. 普萘洛尔
C. 硫氧嘧啶
D. 甲状腺素
E. 复方碘化钾
53. 肋骨骨折的特殊体征是
- A. 局部血肿
B. 局部瘀斑
C. 局部压痛
D. 咳嗽、呼吸时疼痛加剧
E. 按压肋骨有骨摩擦感
54. 缓解气胸患者呼吸困难首选措施为
- A. 胸腔引流
B. 吸氧
C. 镇静剂
D. 抗生素
E. 呼吸兴奋剂
55. 关于直疝三角，不正确的叙述是
- A. 腹股沟斜疝由此突出
B. 外侧边为腹壁下动脉
C. 内边为腹直肌外侧缘
D. 底边为腹股沟韧带内侧
E. 腹股沟斜疝内环位于其外侧
56. 确定实质性脏器损伤的诊断依据是
- A. 腹胀程度
B. 有无移动性浊音
C. 膈下有无游离气体
D. 腹腔穿刺抽出不凝固血液
E. 腹痛性质
57. 消化性溃疡病人饮食护理正确的是
- A. 忌食生冷食物
B. 少量出血时可进食热流质
C. 忌食高热量、高营养食物
D. 进食富含纤维素多的蔬菜水果
E. 急性发作期病人应给予普食
58. 大肠癌患者的术前肠道准备，描述正确的是
- A. 术前 2~3 日半流质饮食
B. 术前禁食 6 小时、禁水 4 小时
C. 术前 1 日口服新霉素或卡那霉素
D. 术前 3 日口服泻剂硫酸镁
E. 术前 2 日晚用生理盐水灌肠，术前 1 日晚清洁灌肠
59. 门静脉高压症病人的临床表现，描述有误的是
- A. 早期即可有脾大
B. 可有黄疸、蜘蛛痣
C. 腹水较多时叩诊实音
D. 有消化吸收功能障碍或营养不良的表现
E. 胃底曲张静脉出血时会呕吐鲜红色血液或排出柏油样便
60. 产后恶露含大量白细胞、坏死蜕膜组织、表皮细胞及细菌属于
- A. 血性恶露
B. 浆液恶露

- C. 白色恶露
- D. 红色恶露
- E. 黏液恶露

61. 正常产妇在产后第 1 天的生命体征变化为

- A. 体温↑、脉搏↑、呼吸↑、血压↑
- B. 体温↑、脉搏↓、呼吸↓、血压正常
- C. 体温↓、脉搏↓、呼吸↓、血压正常
- D. 体温↓、脉搏↑、呼吸↑、血压↑
- E. 体温↑、脉搏↑、呼吸↓、血压↓

62. 有关预防新生儿臀红的措施，不正确的是

- A. 勤换尿布
- B. 大便后用温水洗净臀部
- C. 包裹不可过松、过紧
- D. 垫塑料布防止床单潮湿
- E. 避免尿液和粪便长时间刺激

63. 下列选项中，对妊高征产妇的护理措施正确的是

- A. 孕妇应采取右侧卧位休息
- B. 监测血压变化，每 2 小时测一次
- C. 硫酸镁注射应使用长针头、深部肌肉注射
- D. 硫酸镁的滴注速度以 2.5g/h 为宜
- E. 硫酸镁中毒现象首先表现呼吸抑制

64. 下列哪项不符合前置胎盘的表现

- A. 先露下降受阻
- B. 无痛性阴道流血
- C. 子宫下段闻及胎盘血流音
- D. 子宫张力较高，胎心音不易闻及

E. 宫底高度与孕周相符

65. 下列对慢性羊水过多临床表现描述错误的是

- A. 多发生于妊娠 20~24 周
- B. 孕子宫大于妊娠月份
- C. 腹部膨隆、腹壁皮肤发亮、变薄
- D. 胎位不清
- E. 胎心遥远或听不到

66. 有关妊娠合并糖尿病的处理，错误的是

- A. 孕期定期产科和内科复查
- B. 所生婴儿一律按早产儿护理
- C. 预防感染应保持皮肤清洁
- D. 建议人工喂养婴儿
- E. 产后避免使用药物避孕

67. 下列哪项属于不协调性子宫收缩乏力的特点

- A. 宫缩的兴奋点来自两侧子宫角部
- B. 子宫收缩极性正常
- C. 子宫收缩具有节律性
- D. 宫缩时间长且规律
- E. 子宫收缩不协调，不能使子宫颈口扩张和胎先露下降

68. 关于痉挛性狭窄环，描述正确的是

- A. 处于子宫上、下段交界处，不协调性子宫收缩过强
- B. 此环常围绕胎儿较大部位
- C. 此环随子宫收缩而上升
- D. 一般不会导致产程停滞
- E. 是子宫破裂先兆

69. 免疫成分含量最高的是

- A. 婴儿配方奶
- B. 初乳
- C. 过渡乳
- D. 成熟乳
- E. 晚乳

70. 破伤风患者最早发生痉挛的肌肉是

- A. 膈肌
- B. 咀嚼肌
- C. 面肌
- D. 颈背肌
- E. 四肢肌肉

71. 关于早产的喂养下列说法错误的是

- A. 胎龄越小，出生体重越低每次喂乳量越少
- B. 胎龄越小，出生体重越低喂奶间隔越长
- C. 无法母乳喂养者以早产儿配方奶为宜
- D. 喂养后，宜取右侧卧位
- E. 必要时补充高营养液

二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者女，65 岁。因慢性心衰入院，给予利尿、强心治疗。护士在给予患者强心药物地高辛时，下列哪种情况不可以给药

- A. 患者血压 150/90mmHg
- B. 患者存在房颤
- C. 患者存在便秘
- D. 患者存在呼吸困难
- E. 患者心率 56 次/分

72. 新生儿窒息应首选的复苏措施是

- A. 吸氧
- B. 静注肾上腺素
- C. 复苏气囊加压给氧
- D. 清除呼吸道黏液
- E. 肌注尼可刹米

73. 营养不良儿皮下脂肪消减最先出现的部位

- A. 腹部
- B. 面部
- C. 躯干
- D. 小腿
- E. 臀部

74. 下述哪一项是维生素 D 缺乏性佝偻病时骨样组织堆积的表现

- A. 颅骨软化
- B. 肋膈沟
- C. 手镯
- D. 漏斗胸
- E. 鸡胸

2. 孕妇，30 岁，孕 1 产 0。孕 28 周，诊断为妊娠合并缺铁性贫血，下列补充铁剂的健康教育内容不正确的是

- A. 首选口服制剂
- B. 同时服用维生素 C
- C. 应饭后或餐中服用
- D. 轻度贫血不可下床活动

E. 出现黑便无需就医

3. 病人女性，45 岁，因煤气中毒入院，刚入院时意识不清，经积极治疗后清醒，病人清醒后仍要休息观察

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 1 周
- D. 2 周
- E. 半年

4. 男，84 岁，行走时突然跌倒，神志不清，经医院检查，一侧肢体瘫痪，口斜眼歪，一侧瞳孔直径 5mm，另一侧瞳孔直径 3mm。瞳孔不等大的原因是

- A. 颅内压增高
- B. 脑膜炎
- C. 脑动脉血栓形成
- D. 脑疝
- E. 脑梗死

5. 男，30 岁，触电后心肺复苏，心电图示患者心室颤动，首要的处理措施是

- A. 用阿托品
- B. 置心脏起搏器
- C. 除颤
- D. 用肾上腺素
- E. 用利多卡因

6. 病人王某，身高 180cm，体重 80kg，因急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下，行阑尾切除术。病人回病室后应采取何种体位

- A. 侧卧位 4 小时

B. 平卧位 4~6 小时

C. 中凹位 6 小时

D. 去枕平卧位，头偏向一侧 4 小时

E. 去枕仰卧位 2 小时

7. 女性，38 岁，甲亢，甲状腺大部切除术后，突发呼吸困难、窒息，最大的可能是

- A. 切口内出血
- B. 喉头水肿
- C. 气管塌陷
- D. 双侧喉返神经损伤
- E. 喉痉挛

8. 男，46 岁，行毕 II 式胃大部切除术后第 8 天，突发上腹部剧痛，呕吐频繁，每次量少，不含胆汁，呕吐后症状不缓解。查体：上腹部偏右有压痛。考虑并发了

- A. 吻合口梗阻
- B. 倾倒综合征
- C. 十二指肠残端破裂
- D. 输入袢梗阻
- E. 输出袢梗阻

9. 某产妇足月经阴道自然分娩一女婴，产后母乳喂养，第 4 日乳房胀痛、无红肿，乳汁排出不畅，体温 38.2℃，此时正确的处理方法是

- A. 吸奶器吸吮
- B. 生麦芽煎服
- C. 抗生素治疗
- D. 少喝水
- E. 让新生儿多吮吸乳头

10. 孕妇，26 岁。患风湿性心脏病，心功

能Ⅱ级，现足月临产，宫口已开全，较疲劳，下述处理不恰当的是

- A. 适当用镇静剂
- B. 给予氧气吸入
- C. 立即行剖宫产
- D. 会阴切开，阴道助娩
- E. 产后给抗生素预防感染

11. 早产儿，生后 4h 出现呼吸性呻吟，三

凹征，鼻翼扇动，发绀，X 线检查可见两肺透亮度降低，支气管充气征，诊断为新生儿肺透明膜病，以下对其的护理措施，不正确的是

- A. 给予吸氧
- B. 禁食禁饮
- C. 室温保持在 22~24℃
- D. 用药后 4~6 小时内禁止气道内吸引
- E. 注意无菌操作，预防感染

三、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1. 患者女，60 岁，糖尿病患者，口服降糖药控制血糖不满意，改用皮下注射胰岛素。

(1) 关于胰岛素治疗，下列不妥的是

- A. 胰岛素剂量需严格个体化
- B. 从小剂量开始，逐渐增量
- C. 老年人胰岛素治疗时血糖控制标准可适当放宽
- D. 停用口服降糖药后改用中长效胰岛素制剂
- E. 血糖控制不稳时，可每 3~4 天调整一次剂量

(2) 护士指导患者进行胰岛素注射，下列哪一部位不可注射胰岛素

- A. 上臂外侧
- B. 臀大肌
- C. 膀胱区
- D. 腹部
- E. 股外侧

(3) 应告知患者使用胰岛素治疗中警惕

- A. 低血糖反应
- B. 酮症酸中毒发生

- C. 胃肠道反应
- D. 过敏反应
- E. 肾功能损害

2. 女，12 岁。因眼睑水肿、浓茶水色尿而就诊。查体：颜面眼睑水肿，血压 140/96mmHg，下肢非凹陷性水肿，尿量 300ml/24h，诊断为急性肾小球肾炎。

(1) 该患儿的首优护理问题是

- A. 知识缺乏
- B. 体液过多
- C. 皮肤完整性受损的危险
- D. 潜在并发症：高血压脑病
- E. 活动无耐力

(2) 该患儿如不采取治疗，最易出现的并发症是

- A. 感染加重
- B. 高血压脑病
- C. 严重循环充血
- D. 急性肾衰竭
- E. 心力衰竭

(3) 此时护理措施最应强调

- A. 绝对卧床休息
- B. 限制水的入量
- C. 观察 24 小时出入量
- D. 快速利尿
- E. 应用降压药

3. 56 岁妇女，绝经后 8 年出现阴道不规则流血，妇检：宫颈光滑，阴道黏膜菲薄，宫体稍大，软，活动良，附件(-)。

(1) 初步诊断宫体癌，最支持该诊断的体征是

- A. 56 岁
- B. 阴道不规则流血
- C. 宫体大、软
- D. 阴道黏膜菲薄
- E. 宫颈光滑

(2) 为进一步确诊，首选的检查项目是

- A. 细致的双合诊
- B. 三合诊
- C. 分段诊刮
- D. 宫颈刮片
- E. 宫颈细胞学检查

(3) 若该病人的疾病已经发生转移，其最常见的转移途径是

- A. 淋巴转移
- B. 血行转移
- C. 腹腔种植
- D. 直接蔓延
- E. 医源性操作转移

4. 患儿男，5 岁，发热伴右耳下疼痛肿胀 2 天，腹痛半天入院，查体：体温 39.5℃，右腮腺肿胀压痛明显，上腹疼痛，压痛

明显。

(1) 该患儿最可能的诊断是

- A. 腮腺并发脑膜炎
- B. 腮腺并发胰腺炎
- C. 腮腺并发睾丸炎
- D. 腮腺并发卵巢炎
- E. 腮腺并发胃肠炎

(2) 为进一步诊断应立即做的检查是

- A. 尿常规
- B. 便常规
- C. 血常规
- D. 血、尿淀粉酶
- E. 脑脊液

(3) 下列处理不当的是

- A. 给予富有营养、易消化饮食
- B. 保持口腔清洁
- C. 局部热敷以减轻肿胀
- D. 可用如意金黄散敷患处
- E. 控制体温

5. 患儿，6 个月，腹泻 3 天，10~20 次/日，呈水样便，已 12 小时未排尿。体温 37.6℃，意识模糊，四肢发凉、皮肤弹性极差，前囟及眼窝凹陷明显，血清钠 138mmol/L。

(1) 补液中对该患儿的病情观察最为重要的是

- A. 体温变化
- B. 大便情况
- C. 呼吸情况
- D. 有无低血钙表现
- E. 第一次排尿时间、尿量

(2) 补液后脱水征消失，但突然全身抽搐，两眼上翻，考虑为

- A. 低血糖
- B. 低钾血症
- C. 低钙血症
- D. 低钠血症
- E. 氮质血症

- A. 中度等渗脱水
- B. 中度高渗脱水
- C. 重度等渗脱水
- D. 重度高渗脱水
- E. 重度低渗脱水

(3) 该患儿脱水的程度和性质是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《专业实践能力》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 使用化学制冷袋时除常规观察项目外，还应特别注意观察

- A. 瞳孔的变化
- B. 化学制冷袋有无破损、漏液现象
- C. 患者的心理状态
- D. 体温的变化
- E. 患者尿量

2. 为患者烤灯治疗时，表明剂量合适的情况是

- A. 皮肤潮红
- B. 出现红斑
- C. 皮肤过热
- D. 出现水疱
- E. 局部紫红色

3. 冷、热治疗反复使用时，为防止产生继发效应，中间须间隔

- A. 2 小时
- B. 1 小时
- C. 45 分钟
- D. 30 分钟
- E. 20 分钟

4. 输液反应中最常见的是

- A. 空气栓塞
- B. 发热反应

C. 输液微粒污染

D. 静脉炎

E. 急性肺水肿

5. 输血时发生溶血反应，出现黄疸和血红蛋白尿的机制是

- A. 红细胞凝集成团，阻塞部分小血管
- B. 凝集的红细胞发生溶解，血红蛋白释放入血浆
- C. 血红蛋白形成结晶体，阻塞肾小管
- D. 肾小管内皮缺血、缺氧而坏死
- E. 红细胞破坏，释放凝血物质而引起 DIC

6. 输液过程中导致静脉痉挛的原因是

- A. 输液速度过快
- B. 液体注入皮下组织
- C. 针头阻塞
- D. 患者肢体抬举过高
- E. 输入的药液温度过低

7. 下列与输液时滴速调节无关的是

- A. 病人的年龄
- B. 药液的性质
- C. 病人的病情
- D. 药物的作用
- E. 病人的性别

8. 下列输液速度宜快的病人是
- A. 心功能衰竭抢救的病人
 - B. 严重脱水的病人
 - C. 输入升压药物的病人
 - D. 静脉补钾的病人
 - E. 静脉补充高渗液体的病人
9. 患者出现低蛋白血症时，宜输注的血液制品是
- A. 库存血
 - B. 代血浆
 - C. 白蛋白液
 - D. 血小板
 - E. 红细胞悬液
10. 下列输血操作中，不妥的是
- A. 须两人核对无误后方可输入
 - B. 输血开始时速度宜慢
 - C. 切勿剧烈震荡血袋
 - D. 可根据需要在血液中加入药品
 - E. 应首先输入成分血，再输新鲜血
11. 低分子右旋糖酐的主要作用是
- A. 降低血液黏稠度
 - B. 提高血浆胶体渗透压
 - C. 补充蛋白质
 - D. 补充营养和水分
 - E. 供给热能
12. 青霉素过敏性休克最常见于
- A. 皮肤过敏试验进行皮内注射时
 - B. 皮内注射后 20 分钟内
 - C. 用药后 20 分钟内
 - D. 用药后 24 小时内
 - E. 用药后 1~3 天
13. 下列药物，使用前无需作过敏试验的是
- A. 普鲁卡因
 - B. 细胞色素 C
 - C. 链霉素
 - D. 破伤风抗毒素
 - E. 氨茶碱
14. 关于取药，配药时的操作不妥的是
- A. 固体药用药匙取药
 - B. 更换水剂药液品种时应将量杯洗净后再用
 - C. 药液不足 1ml 用滴管吸取计量
 - D. 数种药片不可放在同一药杯内
 - E. 先配固体药，再配水剂
15. 氧气雾化吸入时氧气流量是
- A. 8~10L/min
 - B. 6~8L/min
 - C. 4~6L/min
 - D. 2~4L/min
 - E. 1~2L/min
16. 宜装瓶盖紧的药物是
- A. 糖衣片
 - B. 维生素
 - C. 氨茶碱
 - D. 疫苗
 - E. 盐酸肾上腺素
17. 医师为病人开老人剂量的药剂量，需要患者年龄达到
- A. 55 岁
 - B. 60 岁
 - C. 65 岁
 - D. 70 岁
 - E. 75 岁

18. 下列服药方法的描述，不正确的一项是

- A. 助消化药饭后服
- B. 服用铁剂，禁忌饮茶
- C. 磺胺药服后，不宜饮水
- D. 服用强心苷类药物前应先测量心率
- E. 鼻饲病人服药，应自胃管灌入研碎的药物，灌后需温开水冲净

19. s. o. s. 代表的中文含义是

- A. 需要时(长期)
- B. 需要时(12 小时内限 1 次)
- C. 立即马上
- D. 临睡前
- E. 必要时

20. 以下外文缩写表示必要时(长期)医嘱，正确的是

- A. b. i. w.
- B. q. d.
- C. p. c.
- D. p. r. n.
- E. s. o. s.

21. 在护理诊断陈述的 PES 公式中“S”表示的含义是

- A. 分类
- B. 诊断名称
- C. 相关因素
- D. 临床表现
- E. 实验室检查

22. 护理诊断依据的分类法是

- A. Maslow 的需要层次论分类
- B. NANDA 的人类反应型态分类
- C. MajoryGordon 的功能性健康型态分类

D. Roy 适应模式分类

E. Peplau 人际关系模式分类

23. 更侧重对疾病病因、病理生理变化判断的是

- A. 护理评估
- B. 护理诊断
- C. 护理评价
- D. 医疗诊断
- E. 护理措施

24. 护理程序的步骤是

- A. 评估、计划、实施、评价
- B. 评估、计划、诊断、实施、评价
- C. 评估、诊断、计划、实施、评价
- D. 评估、诊断、计划、预评价、实施
- E. 评估、诊断、计划、预评价、实施、评价

25. 用护理方法解决不了的健康问题是

- A. 活动无耐力
- B. 经胃管进食
- C. 便秘
- D. 白细胞减少
- E. 尿潴留

26. 护理程序的最后一个步骤是

- A. 评价
- B. 计划
- C. 诊断
- D. 评估
- E. 实施

27. 医疗事故鉴定组鉴定工作基本制度是

- A. 客观事实为依据
- B. 鉴定工作独立进行

- C. 实行合议制原则
D. 回避原则
E. 是非分明原则
28. 疏忽大意是行为人因一时粗心或遗忘而造成
- A. 客观上的过失
B. 主观上的过失
C. 人为的过失
D. 并不严重的过失
E. 无法弥补的过失
29. 国务院要求《医疗事故处理条例》开始施行的时间是
- A. 2002 年 9 月 1 日
B. 2000 年 1 月 1 日
C. 2005 年 8 月 29 日
D. 1999 年 5 月 1 日
E. 2006 年 12 月 1 日
30. 关于护理立法的意义描述有误的一项是
- A. 促进护理管理法制度化，提高护理质量
B. 促进护理教育及护理学科的发展
C. 保证护理人员具有良好的护理道德
D. 有利于维护医疗卫生机构的权益
E. 有利于维护服务对象的正当权利
31. 护士不注重患者的主诉或尊严，引起患者的不满，属于侵犯患者的
- A. 知情权
B. 就医权利
C. 生命权和隐私权
D. 安全权
E. 人生权
32. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于
- A. 一级医疗事故
B. 二级医疗事故
C. 三级医疗事故
D. 四级医疗事故
E. 严重医疗差错
33. 执行医嘱时，错误的行为是
- A. 紧急抢救时，执行口头医嘱
B. 常规情况下，不执行电话医嘱
C. 发现医嘱有错误时，及时对其进行修改
D. 发现医嘱有错误时，拒绝执行，并向医生提出质疑
E. 患者对医嘱提出质疑时，对医嘱的准确性进行核实
34. 世界上第一部护理法是由哪一国颁布的
- A. 英国
B. 法国
C. 美国
D. 意大利
E. 荷兰
35. 属于语言性交流的是
- A. 手势
B. 眼神交流
C. 倾诉
D. 面部表情
E. 专业性皮肤接触
36. 在倾听技巧中不可取的是
- A. 全神贯注
B. 集中精力
C. 双方保持一定距离
D. 双方坐同一高度

E. 保持目光持续接触

37. 下列有关“倾听”这一非语言交流技巧的描述正确的是

- A. 避免看清对方表情
- B. 避免护患双方眼神的接触
- C. 患者叙述时，护士可思考问题
- D. 说话声音宜大，避免听不清楚
- E. 不中断患者谈话，对话题表示出兴趣

38. 下列有关非语言性沟通的描述不正确的是

- A. 是无声的交流
- B. 获取的信息较真实
- C. 是不使用语言的交流
- D. 是有意识或无意识进行的
- E. 包括体语、空间效应、反应时间等形式

39. 病人对护士表达自己的想法，护患已建立起信任感是哪一层次的沟通

- A. 一般性沟通
- B. 事务性沟通
- C. 分享性沟通
- D. 情感性沟通
- E. 共鸣性沟通

40. 以下不属于影响沟通的个人因素的是

- A. 年龄
- B. 疲劳
- C. 疼痛
- D. 文化程度
- E. 急于陈述自己的观点

41. 佩皮劳护患关系形成过程不包括

- A. 认识期
- B. 指导期

C. 确认期

D. 开拓期

E. 解决期

42. 佩皮劳人际关系模式认识期结束时护患双方可以

- A. 对如何解决问题心中有数
- B. 澄清和明确存在的问题
- C. 齐心协力地辨别问题
- D. 确定适当的专业性帮助
- E. 开始参与自我照顾

43. 奥伦护理系统结构示意图确定的在支持教育系统中护士主要的活动是

- A. 根据患者需要帮助患者
- B. 支持和保护患者
- C. 实施一些自护手段
- D. 协调自护主体
- E. 调节各项活动

44. 纽曼的服务对象系统结构不包括

- A. 核心部分
- B. 异常防线
- C. 弹性防线
- D. 正常防线
- E. 抵抗线

45. 患者，男，39岁，吸烟15年，有哮喘家族史，某日与邻居争吵后急性哮喘发作，呼吸困难，根据罗伊的适应模式，该患者面临的主要刺激是

- A. 情绪变化
- B. 气温变化
- C. 缺氧
- D. 吸烟史
- E. 家族遗传史

46. 纽曼健康系统模式的核心部分指的是

- A. 正常防线
- B. 基本结构
- C. 弹性结构
- D. 抵抗线
- E. 人与环境互动

47. 提出自我照顾模式的学者是

- A. 纽曼
- B. 马斯洛
- C. 佩皮劳
- D. 奥伦
- E. 汉斯·席尔

48. 罗伊适应模式理论认为健康是指

- A. 个体成为一个完整和全面的人的状态和过程
- B. 个体没有疾病或阳性体征
- C. 个体得以生存成长繁衍主宰及自我实现
- D. 个体能不断适应各种改变
- E. 生理调节器和认知调节器协调一致共同发挥作用

49. 现在的患者角色与健康时承担的角色行为不协调，此属于

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突
- C. 患者角色行为强化
- D. 患者角色行为消退
- E. 患者角色行为适应

50. 患者没有进入患者角色，不承认自己是患者，此属于

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突

C. 患者角色行为强化

D. 患者角色行为消退

E. 患者角色行为适应

51. 患者经过治疗后，恢复了社会生活能力，但表现出依赖性增强，安于患者角色，此属于

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突
- C. 患者角色行为强化
- D. 患者角色行为消退
- E. 患者角色行为适应

52. 以下生理需要中需要立即给予的是

- A. 空气
- B. 水分
- C. 食物
- D. 排泄
- E. 睡眠

53. 病人角色特指

- A. 患有疾病正忍受痛苦的人
- B. 享有卫生医疗保健的人
- C. 主动寻求医学知识与技术帮助的人
- D. 社会对一个人患病时的权利和义务和行为所作的规范
- E. 寻求恢复健康并与医护人员合作的人

54. 塞利的压力理论认为压力是

- A. 人与环境交互作用出现的一种结果
- B. 人体应对环境刺激而产生的非特异性反应
- C. 凡能对身体施加影响而促发机体产生不适反应的因素
- D. 指机体内部或环境中产生的超过人体适应资源的结果

E. 指全身适应综合症和局部适应综合症

55. 开放系统是指与周围环境不断进行着物质、能量和信息交换的系统，下列不属于的是

- A. 人体系统
- B. 医疗系统
- C. 教育系统
- D. 政府系统
- E. 理论系统

56. 指导护士评估病人健康状况，预见病人需要的理论是

- A. 学习的理论
- B. 信息交流理论
- C. 人的基本需要层次理论
- D. 人、环境、健康与护理的理论
- E. 疾病系统论

57. “疲劳、疼痛”属于

- A. 生理性的压力源
- B. 心理性的压力源
- C. 社会性的压力源
- D. 物理性的压力源
- E. 化学性的压力源

58. 根据弗洛伊德的性心理学说，精力主要放在智力活动与身体活动上的时期是

- A. 口欲期
- B. 肛门期
- C. 性蕾期
- D. 潜伏期
- E. 生殖期

59. 皮亚杰是杰出的

- A. 科学家

B. 神经科医生

C. 医学家

D. 护理理论家

E. 心理学家

60. 下列有关系统论的描述正确的是

- A. 开放系统一般没有边界
- B. 反馈是系统对环境进行控制的过程
- C. 人不是孤立存在的，是自然系统中的次系统
- D. 系统的整体功能是各不同组成部分功能的总和
- E. 开放系统与环境的作用是通过输入和输出过程完成的

61. 一级医院指的是

- A. 农村乡、镇卫生院和城市街道医院
- B. 诊治专科疾病而设置的医院
- C. 全国、省、市直属的市级大医院
- D. 医学院的附属医院
- E. 一般市、县医院及省辖市的区级医院

62. 社区人数大约在

- A. 10 万~20 万
- B. 10 万~30 万之间
- C. 20 万~30 万之间
- D. 10 万以下
- E. 30 万以上

63. 一级医院的半径人口通常是指

- A. ≤ 3 万
- B. ≤ 5 万
- C. ≤ 7 万
- D. ≤ 10 万
- E. ≤ 12 万

64. 1860 年南丁格尔创建世界上第一所正式的护士学校的地点是

- A. 美国的纽约
- B. 英国的伦敦
- C. 日本的东京
- D. 法国的巴黎
- E. 德国的柏林

65. 护士需要帮助人群解决的与健康相关的问题是

- A. 促进健康
- B. 预防疾病
- C. 恢复健康
- D. 减轻痛苦
- E. 以上全是

66. 我国于 1922 年加入国际护士会，以加入顺序名列第几个会员国

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 13
- E. 15

67. 卫生部护理中心在北京成立的时间是

- A. 1954 年
- B. 1964 年
- C. 1979 年
- D. 1985 年
- E. 1990 年

68. 在护士姿态训练中，最基础的是

- A. 站姿
- B. 坐姿
- C. 走姿
- D. 躺姿

E. 睡姿

69. 护理(nursing)，源于拉丁语，原意是

- A. 养育
- B. 保护
- C. 照料
- D. 以上 3 项
- E. 照顾

70. 护理的服务对象是

- A. 所有的人
- B. 健康的人
- C. 患病的人
- D. 有残疾的人
- E. 有心理障碍的人

71. 人表达自身所体验的喜、怒、哀、乐的需要属于

- A. 生理性需要
- B. 知识性需要
- C. 社会性需要
- D. 精神性需要
- E. 情感性需要

72. 护理发展成为一门学科的因素除外

- A. 人
- B. 健康
- C. 环境
- D. 社会
- E. 护理

73. 按艾瑞克森心理社会发展学说解决好勤奋对自卑的危机应在

- A. 口腔期
- B. 肛-肌期
- C. 生殖-运动期

- D. 潜在期
- E. 青春期

74. 皮亚杰的认知发展学说中，开始具有逻辑思维能力的时期是

- A. 感觉运动期
- B. 运思期
- C. 前运思期
- D. 具体运思期

- E. 形式运思期

75. 弗洛伊德理论在护理实践中应用的意义是

- A. 评估病人不同发展阶段的心理社会危机
- B. 鼓励个体自立自强和自己做决定
- C. 了解健康人格形成过程中的心理需求
- D. 协助病人发展不同人格
- E. 有目的地影响和改变病人

二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者，男，48 岁，车祸后 ICU 治疗多日，今日出现深度昏迷，对强烈刺激完全无反应，无自主呼吸，瞳孔散大、固定、对光反射消失，脑电波平坦，判断其为

- A. 休克
- B. 脑死亡
- C. 濒死状态
- D. 晕厥
- E. 生物学死亡

2. 重症监护室的患者王先生目前病情稳定，呼吸节律规则，频率为每分钟 22 次。护士长考查护士如果在不方便测量该患者脉搏的情况下，估算其脉搏频率最可能的是

- A. 66 次/分
- B. 78 次/分
- C. 80 次/分
- D. 88 次/分
- E. 100 次/分

3. 春节前后，120 送诊一位流浪者，衣衫单薄，40 岁上下，患者全身冰冷，护士首先给其使用热水袋保暖，水温为

- A. 90~100℃
- B. 80~90℃
- C. 70~80℃
- D. 60~70℃
- E. 50~60℃

4. 患者，孙女士，48 岁，扁桃体摘除术后。医嘱给予冷疗，患者咨询此种做法的目的是

- A. 减轻疼痛
- B. 降低体温
- C. 控制炎症扩散
- D. 减轻局部充血或出血
- E. 促进血液循环利于创面愈合

5. 医师在科普讲座时告知听众，炎症早期使用热疗的目的是

- A. 使肌肉松弛
- B. 减轻深部组织充血
- C. 使患者舒适
- D. 促进白细胞释放蛋白溶解酶，使炎症局限
- E. 可促进炎性渗出物吸收与消散

6. 患者，男性，46 岁。输血后出现荨麻疹，眼睑、口唇水肿并伴呼吸困难，应考虑为

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 酸中毒
- D. 溶血反应
- E. 高钾血症

7. 患者，男性，56 岁，股骨转子间骨折内固定术后，医嘱给予输血，输入 15 分钟后患者感觉头胀，四肢麻木，腰背部剧痛，脉细弱，血压下降。病区护士为患者立即采取针对性的护理措施，但应除外

- A. 热水袋敷腰部
- B. 维持静脉输液通道
- C. 心理护理
- D. 观察记录血压、尿量
- E. 减慢输血速度

8. 患者男，42 岁，部门领导，应酬较多。昨日因患急性胰腺炎入院。今日医嘱补液量共 1000ml，护士于 8: 20am 给予其输液，调节滴数 50 滴/分，输液器滴系数为 15。患者咨询何时输完

- A. 11: 00a. m.
- B. 12: 20a. m.
- C. 1: 20p. m.

三、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题目干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1. 某市一次恶性的集体食物中毒现场，多名医护人员在紧急救护。

D. 2: 00p. m.

E. 2: 20p. m.

9. 姚某，在输液过程中，诉输液部位疼痛，局部肿胀，检查有回血，护士应立即

- A. 减慢输液速度
- B. 调整针头位置
- C. 抬高输液瓶位置
- D. 更换针头，重新穿刺
- E. 热水袋敷注射部位上方血管

10. 患者刘某，因淋球菌感染，医嘱行青霉素皮试，护士的准备工作最重要的是

- A. 环境要清洁、宽阔
- B. 准备好注射用物
- C. 抽药剂量要准确
- D. 选择合适的注射部位
- E. 询问病人有无过敏史

11. 小琴是新工作的护士，某日由于疏忽将 21 床庞某的液体输给了 27 床马某，紧急发现后给予了相关处理，核实药物为马某所共用，并未对患者造成不良影响。此行为属于

- A. 侵权行为
- B. 一级医疗事故
- C. 四级医疗事故
- D. 渎职罪
- E. 不属于医疗事故

(1) 为抢救患者，首先应采用的排出毒物方法为

- A. 口服催吐法
B. 漏斗胃管洗胃法
C. 电动吸引器洗胃法
D. 自动洗胃机洗胃
E. 硫酸镁导泻
- (2) 如若采取上述洗胃法，洗胃液的温度为
- A. 18~22℃
B. 24~26℃
C. 25~38℃
D. 39~41℃
E. 40~45℃
- (3) 其中某病人被转移至就近医院后，为其行电动吸引器洗胃，机器上负压值指示为
- A. 10kPa
B. 13.3kPa
C. 20~33.3kPa
D. 33.3~40kPa
E. 40.0~53.3kPa
2. 患者，男，22岁，近日来感觉身体极度不适，伴发热，遂入院治疗。入院当日体温最高时达 39.4℃，最低时为 37.6℃。
- (1) 此种发热的热型为
- A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 回归热
E. 不规则热
- (2) 护理该患者时，护士为其测量体温的间隔时间是
- A. 2 小时
B. 4 小时
C. 6 小时
D. 8 小时
E. 12 小时

3. 林某，77 岁，脑梗后长期卧床，此次因吸入性肺炎入院，高烧不退，时有躁动，不宜行周围静脉输液，医嘱要求行颈外静脉穿刺。

(1) 穿刺者应如何确定穿刺点

- A. 下颌角和锁骨上缘中点连线的上 1/3 处
B. 下颌角和锁骨上缘中点连线的上 2/3 处
C. 下颌角和锁骨下缘中点连线的上 2/3 处
D. 下颌角和锁骨下缘中点连线的上 1/3 处
E. 下颌角和锁骨下缘中点连线的 1/2 处

(2) 穿刺时病人应取的卧位是

- A. 如穿刺在左侧，应取左侧卧位
B. 如穿刺在左侧，应取右侧卧位
C. 头低脚高位，头偏向对侧并后仰
D. 头高脚低位，头偏向同侧并后仰
E. 去枕仰卧位，头偏向对侧并后仰

(3) 输液后半小时病人出现高热、寒战、脉速伴恶心、呕吐、头痛症状，疑为

- A. 过敏反应
B. 循环负荷过重
C. 空气栓塞
D. 发热反应
E. 脑水肿

4. 患者李某，因细菌性肺炎注射青霉素后，病人主诉腹痛，关节肿痛。查体时发现体温 38.6℃，皮肤瘙痒有抓痕，全身荨麻疹且淋巴结肿大。

(1) 此反应，一般出现在用药后

- A. 2~3 天
B. 3~5 天
C. 5~6 天
D. 7~12 天
E. 12~15 天

(2) 试问病人出现了何种情况

- A. 皮肤过敏反应

- B. 呼吸道过敏反应
- C. 消化系统过敏反应
- D. 血清病型反应
- E. 二重感染

5. 患者女，27 岁，失恋后受到刺激，暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛，不能忍受，并伴有恶心、呕吐。120 急诊入院，诊断为急性胰腺炎。医嘱：禁食、胃肠减压，肠外营养支持。两周后病情稳定，改为要素饮食，鼻饲营养。

(1) 该患者要素饮食的特点不包括

- A. 营养价值高
- B. 营养成分全面
- C. 不需经过消化
- D. 含少量纤维素
- E. 肠道直接吸收

(2) 给该患者要素饮食过程中做法正确的是

- A. 从高浓度、大剂量开始
- B. 溶液温度应保持在 35℃
- C. 若停用应逐渐减量

- D. 鼻饲过程出现恶心立即停用
- E. 长期使用无需补充维生素

6. 患者，男性，62 岁。食管癌中期入院。患者主诉疼痛明显，夜间偶尔会痛醒。查体见患者痛时面色苍白、轻呻吟，有节奏地用鼻深呼吸，并询问止痛药的应用情况。

(1) 患者疼痛程度属于 WHO 疼痛分级的

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

(2) 护士向患者解释“三阶段止痛疗法”，合适患者用的止痛药是

- A. 吗啡
- B. 阿司匹林
- C. 哌替啶
- D. 芬太尼
- E. 曲马朵

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《基础知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】呼吸衰竭按血气分析结果可分为 I 型和 II 型，I 型呼吸衰竭是 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， PaCO_2 正常或下降，常见于急性肺栓塞、严重肺部感染、ARDS 等；II 型呼吸衰竭是 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ ，常见于 COPD 发生呼吸道感染时，故本题选 C。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】大多数支气管扩张症由于支气管、肺组织感染和支气管阻塞所引起。病因以婴幼儿期的麻疹、百日咳、支气管肺炎最为常见。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】窦性心动过速病因：多数属生理现象，健康人常在吸烟，饮茶、咖啡、酒，剧烈运动或情绪激动等情况下发生。在某些病时也可发生，如发热、甲亢、贫血、心肌缺血、心力衰竭、休克等。应用肾上腺素、阿托品等药物亦常引起窦性心动过速。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】胆道疾病时由于壶腹部出口阻塞引起 Oddi 括约肌痉挛，使胆汁反流进入胰管；胰管梗阻导致胰液排泄障碍；酗酒

和暴饮暴食均可使胰液分泌旺盛，导致急性胰腺炎。而上消化道出血与胰腺炎无关。

5. 【正确答案】 B

【答案解析】目前认为慢性胃炎约 90% 由幽门螺杆菌感染所引起。

6. 【正确答案】 B

【答案解析】高钾血症、酸中毒、水中毒是少尿期的主要致死原因。高血钾症是急性肾衰竭最严重的并发症，是起病第一周死亡最常见的原因。

7. 【正确答案】 B

【答案解析】十二指肠及空肠上段是铁的主要吸收部位。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】鉴于女性病人多见且多于 40 岁以前发病，推测特发性血小板减少性紫癜可能与雌激素抑制血小板生成及增强单核-吞噬细胞对与抗体结合的血小板的破坏有关。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】生活性中毒：多由于误服、误用引起；此外还有服毒自杀及谋杀他人而中毒者。

10.【正确答案】 A

【答案解析】 高血压、动脉硬化、血液病、外伤、脑血管畸形等均为脑出血原因，以高血压动脉硬化所致的脑出血最为常见。

11.【正确答案】 C

【答案解析】 血钙增高见于甲状旁腺功能亢进、多发性骨髓瘤、骨转移癌等。血钙减低见于甲状旁腺功能减退、维生素 D 缺乏、佝偻病、婴儿手足搐搦症、急性出血性胰腺炎、低蛋白血症等。

12.【正确答案】 E

【答案解析】 由于肝硬化时肝内大量结缔组织产生，致肝内血流不畅，门静脉高压、脾静脉血回流门静脉障碍，致脾内滞留大量的血液而肿大，脾内的巨噬细胞吞噬血小板、红细胞、白细胞而使血中的各种成分减少。

13.【正确答案】 C

【答案解析】 左心衰竭患者主要表现为呼吸困难，可表现为端坐呼吸、劳力性呼吸困难，夜间阵发性睡眠性呼吸困难，严重者可发生急性肺水肿。

14.【正确答案】 E

【答案解析】 原发性气胸多见于瘦高体形的男性青壮年，肺大疱可能与非特异性炎症瘢痕或先天性弹力纤维发育不良有关。

15.【正确答案】 E

【答案解析】 原发性癫痫原因不明，可能与遗传因素有关。继发性癫痫多为脑部疾病或全身性疾病的临床表现，如颅脑外伤、

脑膜炎、脑部占位性病变、脑血管病、尿毒症等。

16.【正确答案】 B

【答案解析】 本题考核了急性上呼吸道感染的病因，细菌感染以溶血性链球菌多见。

17.【正确答案】 A

【答案解析】 冠心病分为五种类型：无症状性心肌缺血、心绞痛、心肌梗死、缺血性心肌病、猝死。心绞痛是常见的类型。

18.【正确答案】 C

【答案解析】 对于烧伤休克患者，尿量是衡量液体是否补足的简易而重要的指标。

19.【正确答案】 E

【答案解析】 坐骨肛管间隙脓肿较常见，脓肿位于肛提肌以下的坐骨、肛管之间的软组织间隙内，初期表现为局部疼痛，炎症较重时局部红肿热痛明显。炎症波及直肠和膀胱时患者出现直肠刺激症状和膀胱刺激症状。

20.【正确答案】 C

【答案解析】 急性梗阻性化脓性胆管炎其感染程度最严重，发病最急，引起休克的可能性也最大。

21.【正确答案】 B

【答案解析】 股疝为疝囊通过股环、经股管向股部卵圆窝突出形成的疝，多见于 40 岁以上的妇女。在腹外疝中，股疝最易发生嵌顿。

22.【正确答案】D

【答案解析】内脏性腹痛是腹腔内某一脏器的痛觉信号经交感神经传入脊髓引起，有以下特点：①疼痛部位不明确，接近腹中线；②疼痛感觉模糊，多为不适、钝痛、灼痛；③常伴恶心、呕吐、出汗等其他自主神经兴奋症状。

23.【正确答案】A

【答案解析】该患者为重度烧伤，血压偏低提示休克的可能。

24.【正确答案】C

【答案解析】各类休克的共同病理生理基础是有效循环血量锐减和组织灌注不足，由此导致的微循环改变、代谢变化和内脏器官继发性损害。

25.【正确答案】C

【答案解析】血钠浓度低于正常为低渗性脱水，高于正常为高渗性脱水，在正常范围内为等渗性脱水。

26.【正确答案】B

【答案解析】血清钾的正常值是 3.5 ~ 5.5mmol/L。血清钾低于 3.5mmol/L 时属于低血钾，血清钾高于 5.5mmol/L 时属于高血钾。

27.【正确答案】A

【答案解析】感染是 DIC 最常见的病因。感染可使血管内皮细胞损伤，激活凝血因子 XII，启动内源性凝血系统；又能使血小板损伤，促进血小板聚集和释放血小板第 3 因子，加速凝血酶原激活而促进凝血。

28.【正确答案】D

【答案解析】青枝骨折见于儿童。儿童骨骼中有机物质含量多，骨折发生后骨骼不完全断裂，类似折断的树枝。

不完全骨折：骨骼连续性没有完全中断，依骨折形态又分为青枝骨折、裂缝骨折等。

29.【正确答案】A

【答案解析】依据恶性肿瘤的分化程度，分为高分化、中分化和低分化三类。高分化细胞接近正常，恶性程度低；未分化细胞核分裂象较多，恶性程度高，预后差；中分化的恶性程度介于两者之间。

30.【正确答案】C

【答案解析】碱性黏液是由黏液细胞分泌，有保护胃黏膜、对抗胃酸腐蚀的作用；促胃液素是由 G 细胞分泌的，盐酸和抗贫血因子是由壁细胞分泌的，主细胞分泌的是胃蛋白酶和凝乳酶原。

31.【正确答案】B

【答案解析】肾挫伤的病理变化是：肾实质轻微受损，肾包膜完整，形成包膜下血肿，肾若损伤涉及肾集合系统时可有少量血尿，因此本题应选肾包膜完整。

32.【正确答案】A

【答案解析】急性胰腺炎：大量胰酶被腹膜吸收入血液，使血淀粉酶和脂肪酶升高，并可通过激活体内多种活性物质的作用，导致多器官功能受损。

33.【正确答案】D

【答案解析】 本次妊娠对孕产妇及胎婴儿有较高危险性，可能导致难产及危及母婴者，称高危妊娠。

34. **【正确答案】** B

【答案解析】 雌激素的生理功能：①促进卵泡及子宫发育；使子宫内膜增生；增强子宫对缩宫素的敏感性。②增加输卵管上皮细胞的活动。③促进阴道上皮的增生、角化，使细胞内糖原增加。④促进乳腺管增生。⑤促进体内水钠潴留。⑥促进骨中钙质沉着。

35. **【正确答案】** A

【答案解析】 短效口服避孕药用法及注意事项：自月经周期第5日起，每晚1片，连服22日不能间断，若漏服必于次晨补服1片。一般于停药后2~3日发生撤退性出血，犹如月经来潮。若停药7日尚无阴道流血，则当晚开始第2周期用药。若再次无流血，宜停药并检查原因予以治疗。

36. **【正确答案】** E

【答案解析】 根据世界卫生组织的资料，血红蛋白的低限值在6~14岁 $<120\text{g/L}$ ，为贫血的诊断标准。

37. **【正确答案】** E

【答案解析】 小儿肠套叠的主要表现为腹痛、呕吐、血便、腹部“腊肠样包块”，其中血便为肠套叠最重要的症状。发病后6~12小时就可以出现紫红色或果酱样便，并有黏液。

38. **【正确答案】** C

【答案解析】 当小儿的血红蛋白在60~30g/L时，为重度贫血。

39. **【正确答案】** C

【答案解析】 握持反射是一种原始反射，安静觉醒的正常新生儿很容易引起握持反射，可将双示指或小指分别自新生儿两手的尺侧缘伸进手心，轻压其手掌，婴儿会紧紧抓住该手指引起握持反射。正常情况下2个月消失。

40. **【正确答案】** D

【答案解析】 婴幼儿最常见的贫血是营养性缺铁性贫血，6~12个月发病率最高。

41. **【正确答案】** D

【答案解析】 蛋白质供给不足导致血白蛋白下降，引起低蛋白性水肿。

42. **【正确答案】** B

【答案解析】 孕激素的生理功能：使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜，抑制输卵管节律性收缩。

43. **【正确答案】** E

【答案解析】 月经周期的长短决定于增生期长短。月经周期的长短取决于每个女性卵巢内卵泡发育成熟期的长短，而黄体期的长短都是相同的，大约有十四天。如果卵泡发育期长则月经周期长，反之月经周期也就短。

44. **【正确答案】** C

【答案解析】 黄体功能衰退后，若卵子未受精，在排卵后9~10日黄体开始萎缩，血管

减少，细胞呈脂肪变性，黄色消退，最后细胞被吸收，组织纤维化，外观色白，称为白体。

45.【正确答案】 E

【答案解析】 临床上一般将骨盆腔分为三个与分娩有关的假想平面：骨盆入口平面、中骨盆平面和出口平面。每个平面均有自己的特点，该题只有答案 E 描述最准确。

46.【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜残存的基底层可再生新的功能层，故月经后子宫内膜再生层是功能层。而功能层是由基底层进行修复。

47.【正确答案】 D

【答案解析】 约在受精后 6~7 日，晚期囊胚的透明带消失，开始着床。

48.【正确答案】 C

【答案解析】 雌激素和孕激素为甾体激素，在妊娠早期由卵巢妊娠黄体产生，自妊娠 8~10 周起由胎盘合成。

49.【正确答案】 E

【答案解析】 营养不良导致的代谢异常包括血清总蛋白和白蛋白降低，胆固醇浓度下降，血糖偏低，水盐代谢异常（低钠、低钾、低钙等）。营养不良也可导致免疫功能低下，但白细胞水平不会降低。

50.【正确答案】 C

【答案解析】 肥胖症是指长期能量摄入超过人体的消耗，导致体内脂肪蓄积过多，体重超过一定范围的营养障碍性疾病。体重

超过同性别、同身高（长）小儿正常标准的 20% 以上者即为诊断。

51.【正确答案】 A

【答案解析】 根据病程小儿腹泻可分为急性腹泻（病程在 2 周以内）、迁延性腹泻（病程在 2 周~2 个月）和慢性腹泻（病程在 2 个月以上）。

52.【正确答案】 C

【答案解析】 细胞内液以 K^+ 、 Mg_2^+ 、 HPO_4^{2-} 和蛋白质等离子为主， K^+ 是维持细胞内液的渗透压主要离子。

53.【正确答案】 E

【答案解析】 右侧支气管粗短，是由气管直接延伸，因此，异物易进入右侧支气管。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 急性感染性喉炎病因：病毒或细菌感染引起，常为上呼吸道感染的一部分。有时可在麻疹或其他急性传染病的病程中并发。

55.【正确答案】 B

【答案解析】 小儿病理分类可分为大叶性肺炎、小叶性肺炎（支气管肺炎）、间质性肺炎等。支气管肺炎为小儿常见的肺炎。

56.【正确答案】 A

【答案解析】 小儿失钾最重要的原因是经胃肠道失钾，常见于严重腹泻呕吐造成的大量消化液丧失，腹泻时粪便中 K^+ 的浓度可达 30~50mmol/L。此时随粪丢失可比正常时多 10~20 倍。剧烈呕吐时，胃液的丢失

也可失钾，因呕吐所引起的代谢性碱中毒可使肾排钾增多，大量的钾也可经尿丧失，呕吐引起的血容量减少也可通过继发性醛固酮增多而促使肾排钾。

57.【正确答案】 A

【答案解析】 其余选项的结果均为血钾升高：B 醛固酮是由肾上腺分泌的，它的作用是保钠排钾，其分泌减少，排钾减少，引起血钾升高；C 钾进入细胞内减少，那么留在血液中的就多了；D 肾脏排钾减少，血钾必然升高；E 代酸时氢离子和细胞内钾离子交换也会血钾增高。

58.【正确答案】 E

【答案解析】 体内的钾主要靠食物中提供，肠道中 K^+ 很容易吸收。体内钾 90% 存在细胞内，其浓度约为 $140 \sim 160 \text{mmol/L}$ ，而细胞外液钾浓度约为 $4.2 \pm 0.3 \text{mmol/L}$ ，多吃肾多排钾，不吃也排。钾可自由通过肾小球滤过膜，不论机体缺钾或钾过多，在近曲小管和髓袢保持滤过钾的 90%~95% 被重吸收，因此机体主要依靠远曲小管和集合小管对钾的分泌和重吸收来调节，从而维持体内钾的平衡。

59.【正确答案】 D

【答案解析】 麻醉剂作用于周围神经系统，使相应区域的痛觉消失，运动出现障碍，但病人意识清醒，称为局部麻醉。

60.【正确答案】 A

【答案解析】 触摸颈动脉搏动，一手示指和中指并拢，置于患者气管正中旁开 $2 \sim 3 \text{cm}$ ，触摸颈动脉搏动时间小于 10 秒，同时观察

患者有无胸廓起伏，简单判断有无呼吸。

61.【正确答案】 A

【答案解析】 复苏的目的不仅是恢复自主心跳和呼吸，更重要的是恢复中枢神经系统功能。一般认为大脑缺血缺氧超过 $4 \sim 6$ 分钟，即可遭受不可逆的损伤。

62.【正确答案】 C

【答案解析】 气性坏疽属厌氧菌感染，病菌为革兰染色阳性梭状芽孢杆菌，主要是产气荚膜梭菌、水肿杆菌、腐败杆菌和溶组织杆菌等。故选择 C。

63.【正确答案】 E

【答案解析】 特异性感染是指由一种特定的致病菌引起一种特定性的感染，具有比较独特的病理变化过程，有特定的临床表现和治疗方法。

64.【正确答案】 E

【答案解析】 脓毒血症因感染引起的全身性炎症反应，如体温、循环、呼吸等明显改变的外科感染的统称。

65.【正确答案】 E

【答案解析】 创伤性全身反应包括：(1) 发热；(2) 神经内分泌反应；(3) 代谢反应；(4) 免疫反应。

66.【正确答案】 C

【答案解析】 脑疝是颅内压增高的危急并发症，常见的有小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝。

67.【正确答案】 C

【答案解析】成人如果长期缺碘，会引起甲状腺肿大。

68.【正确答案】D

【答案解析】急性乳腺炎是乳腺的急性化脓性感染，多见于产后哺乳期妇女，初产妇更为多见，发病多在产后3~4周。

69.【正确答案】B

【答案解析】肺癌的病理类型有鳞癌、小细胞癌、大细胞癌、腺癌等，其中小细胞癌恶性程度高，生长快，较早出现淋巴和血行广泛转移。虽然对放射和化学疗法敏感，但在各型肺癌中预后较差。

70.【正确答案】A

【答案解析】难复性疝的内容物多数为大网膜。

71.【正确答案】D

【答案解析】按临床经过可分为急性、亚急性和慢性三类；按病因分为细菌性与非细菌性两类；按发病机制分为原发性与继发性两类；按累及范围分为弥漫性与局限性两类。

二、A2型题

1.【正确答案】D

【答案解析】造成甲状腺危象的原因是大量甲状腺素释放入血。

2.【正确答案】C

【答案解析】急性胰腺炎常见的病因胆道疾病、大量饮酒、暴饮暴食。

3.【正确答案】D

【答案解析】乳管内乳头状瘤多见于40~50岁的经产妇。多数病例发生在大乳管近乳头的壶腹部，瘤体很小，带蒂，有绒毛，有很多壁薄的血管，所以易出血。发生于中、小乳管的乳头状瘤常位于乳房周围区域。病人一般无明显自觉症状，常因乳头溢液污染衣服而引起注意，溢液为血性、暗棕色或黄色液体。肿瘤多数较小，常不能触及。

4.【正确答案】B

【答案解析】大阴唇含丰富的血管，易发生血肿。

5.【正确答案】A

【答案解析】大囟门位于8点，小囟门位于2点，可以判断胎儿胎位是枕左前位。

三、B型题

1.(1)【正确答案】D

【答案解析】手法治疗适应于关节粘连已完全机化，关节僵硬已成定型。手法治疗必须在麻醉下进行，手法缓和，护理特别注意的是尽早锻炼。

(2)【正确答案】A

【答案解析】被动运动是完全靠自身以外的力量进行运动，主要依靠他人或健侧肢体带动，适应于瘫痪患者。

(3)【正确答案】E

【答案解析】助力运动是指由于自身力量不足，需要外力协助，尤其在起动时需要帮助。外力可以是他人，也可是健侧肢体或运动器。

(4)【正确答案】C

【答案解析】 靠患者自身力量进行锻炼的为主动运动，是功能锻炼的主要方法，适应于有活动能力的患者。

2. (1) **【正确答案】** B

【答案解析】 咽是呼吸道与消化道的共同通道，吞咽时会厌将喉关闭，防止食物进入下呼吸道。

(2) **【正确答案】** D

【答案解析】 下呼吸道起自气管，止于呼吸性细支气管末端。

3. (1) **【正确答案】** C

【答案解析】 疔一般无全身症状，发生在面部“危险三角区”的疔，如被挤压或处理不当，致病菌可经内眦静脉、眼静脉向颅内扩散，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现眼部及其周围组织的进行性红肿和硬结，伴有疼痛和压痛。

(2) **【正确答案】** A

【答案解析】 丹毒是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症，好发于下肢，反复发作可使淋巴管受阻而发生“象皮肿”。

(3) **【正确答案】** E

【答案解析】 脓性指头炎的初期，有肿胀、针刺样疼痛，当指动脉受压，疼痛转为搏动性跳痛时，如不及时治疗，常可引起骨缺血性坏死，形成慢性骨髓炎。

4. (1) **【正确答案】** D

【答案解析】 甲状腺髓样癌发生于滤泡旁细胞(C细胞)，可分泌降钙素和5-羟色胺。

(2) **【正确答案】** C

【答案解析】 未分化癌属于低分化癌，大多见于70岁左右患者，恶性度高，手术治疗

无效。

5. (1) **【正确答案】** C

【答案解析】 卵巢功能成熟并有性激素分泌及周期性排卵的时期称为性成熟期。一般自18岁左右开始，持续约30年。

(2) **【正确答案】** D

【答案解析】 卵巢功能逐渐衰退，生殖器官开始萎缩向衰退过渡的时期，称围绝经期，包括绝经前期、绝经期和绝经后期。一般60岁以后妇女机体逐渐老化进入老年期。

6. (1) **【正确答案】** A

【答案解析】 新生儿Hb<145g/L；1~4个月Hb<90g/L；4~6个月Hb<100g/L为诊断婴幼儿贫血的标准。

(2) **【正确答案】** D

【答案解析】 6个月~6岁儿童Hb<110g/L；6~14岁儿童Hb<120g/L为诊断儿童贫血的标准。

7. (1) **【正确答案】** A

【答案解析】 注意缺陷多动障碍发病机制不明，已知的有关因素是：该患儿全脑葡萄糖代谢率减低，尤其是运动前回、前额皮质，而前额皮质与注意力形成有关。另外临床和动物实验证明神经递质代谢异常与该病发生也有关。

(2) **【正确答案】** C

【答案解析】 脑瘫的病因及发病机制：①出生前胎儿期的感染、出血、发育畸形以及母亲妊娠时有高血压、糖尿病、腹部外伤、接触放射线等。②出生时羊水阻塞、早产、窒息、难产、产钳夹伤等。③出生后缺氧、感染、外伤、颅内出血、核黄疸等。

(3)【正确答案】 D

【答案解析】 吉兰-巴雷综合征的病因及发病机制：急性感染性多发性神经根神经炎，病因及发病机制并不明确。发病机制仍在研究之中。可能与病毒感染等前驱症状所诱发的脱髓鞘病变，并涉及细胞和体液免疫功能紊乱。65%以上患儿患病前曾有病毒感染史。

8. (1)【正确答案】 A

【答案解析】 心脏容量从妊娠早期至妊娠末期约增加 10%，心率于妊娠晚期每分钟增加 10~15 次。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 循环血容量于妊娠 6 周起开始增加，至妊娠 32~34 周达高峰，约增加 40%~45%。

(3)【正确答案】 D

【答案解析】 肾血浆流量(RPF)及肾小球滤过率(GFR)于妊娠早期均增加，RPF 比非孕时约增加 35%，GFR 约增加 50%。

(4)【正确答案】 E

【答案解析】 肾血浆流量(RPF)及肾小球滤过率(GFR)于妊娠早期均增加，RPF 比非孕时约增加 35%，GFR 约增加 50%。

9. (1)【正确答案】 E

【答案解析】 血行转移：由血液循环将原发病灶的癌细胞带到肺、肝、骨骼及脑部的微血管床，造成转移。是肾癌主要的转移途径。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 淋巴转移：多数为邻近区域淋巴结转移，少数不经区域淋巴结而转移至第二、第三站淋巴结，如膀胱癌等。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《相关专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 D

【答案解析】 CT 扫描：一般不需特殊准备。有时为了增强被检查部位的检查效果，常需配合使用造影剂，故检查前应按照造影检查的要求进行准备。胸腹部扫描前禁食 6~8 小时；盆腔扫描前 3 天进食少渣、少胀气饮食。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 交替脉：脉搏一强一弱交替出现但节律正常。交替脉是左心衰竭的重要体征。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 浅昏迷生理反射存在，深昏迷深、浅反射均消失。浅昏迷与深昏迷均无自主运动，不能被唤醒，对周围事物及声、光等刺激全无反应，都可有大、小便潴留或失禁。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】 血红蛋白尿呈酱油色，见于阵发性睡眠性血红蛋白尿、血型不合的输血反应等溶血性疾病。

5. 【正确答案】 C

【答案解析】 网织红细胞成年人的正常值为 0.5%~1.5%，绝对值 $(24\sim 84)\times 10^9/L$ 。

6. 【正确答案】 B

【答案解析】 内科护理学中正常人两侧瞳孔对称、等大、正圆，直径约 3~4mm。

7. 【正确答案】 A

【答案解析】 血压持续性升高，造成脑、心、肾、眼底等损伤，出现相应表现。所以应选择 A。

8. 【正确答案】 D

【答案解析】 治疗心力衰竭可使用利尿药：排钾利尿药：此类利尿药有噻嗪类利尿药如氢氯噻嗪；利尿药如呋塞米、丁脲胺。排钾利尿药主要不良反应是可引起低钾血症，应补充氯化钾或与保钾利尿药同用。

9. 【正确答案】 C

【答案解析】 心血管系统表现：是洋地黄类药物较严重的毒性反应，常出现各种心律失常，室性期前收缩二联律最为常见。

10. 【正确答案】 B

【答案解析】 易导致洋地黄中毒的情况主要有：急性心肌梗死、急性心肌炎引起的心肌损害、低血钾、严重缺氧、肾衰竭、老年人等情况。故选项 B 不是导致中毒的危险因素。

11.【正确答案】 A

【答案解析】 肝动脉化疗栓塞治疗(TACD)是非手术治疗中的首选方法,可明显提高病人的3年生存率。一般每6~8周重复治疗,可使肝癌缩小,再进行手术。

12.【正确答案】 B

【答案解析】 肝硬化患者出现持续肝区疼痛应考虑有并发肝癌的可能,因此甲胎蛋白有助于确诊。

13.【正确答案】 C

【答案解析】 胃镜检查与黏膜活检可直接观察溃疡病变部位、大小、性质,并可进行HP检测,对消化性溃疡有确诊价值。

14.【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾衰竭尿液检查:尿量可正常但夜尿多,尿比重低,严重者尿比重固定在1.010~1.012。尿蛋白+~+++ ,晚期可阴性。尿沉渣有管型,蜡样管型对诊断有意义。

15.【正确答案】 E

【答案解析】 本题考查肾盂肾炎的实验室检查。急性肾盂肾炎的典型尿液改变为脓尿,镜检可以见到大量白细胞,白细胞管型是急性肾盂肾炎的特征性改变,另外还可以见到红细胞。故本题的答案为E。

16.【正确答案】 E

【答案解析】 肾活检组织病理学检查可以确定慢性肾炎的病理类型。

17.【正确答案】 A

【答案解析】 骨髓检查是诊断白血病的重要依据,骨髓一般增生明显活跃或极度活跃,主要细胞为白血病原始细胞和幼稚细胞,正常粒系、红系细胞及巨核细胞系统均显著减少。

18.【正确答案】 C

【答案解析】 中枢神经系统白血病的防治:常用药物是甲氨蝶呤,在缓解前或后鞘内注射,可同时加地塞米松。

19.【正确答案】 D

【答案解析】 免疫学检查可用于急淋和急非淋的区别,以及T细胞和B细胞白血病的区别。

20.【正确答案】 A

【答案解析】 营养性缺铁性贫血骨髓象:骨髓增生活跃,粒红比例降低,红细胞系统增生明显活跃。中幼红细胞比例增多,体积比一般的中幼红细胞略小,边缘不整齐,胞浆少,染色偏蓝,核固缩似晚幼红细胞,表明胞浆发育落后于核,粒系细胞和巨核细胞数量和形态均正常。

21.【正确答案】 C

【答案解析】 阿卡波糖、伏格列波糖,均需与第一口主食同时嚼服,若食物中不含碳水化合物可不服。主要不良反应为腹胀、排气增多、腹泻。慢性腹泻、胃肠炎症忌用。

22.【正确答案】 C

【答案解析】 调节酸碱平衡的主要缓冲系统最主要的是 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 。当体内酸增多

时，由碳酸氢根与氢离子结合，使酸得以中和。当体内碱增多时，碳酸中的氢离子与碱作用得以中和。缓冲对中 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 的比值正常为 20/1。

23.【正确答案】 C

【答案解析】 严重的高渗性脱水首选补液的液体是 5% 葡萄糖液，但补至一定程度则要注意等渗盐水的补充，以免由高渗转为低渗。

24.【正确答案】 B

【答案解析】 高钾血症是指血清钾浓度大于 5.5mmol/L。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 营养支持应首选肠内途径，要素饮食通常为无渣饮食，最常见的并发症为腹泻，最严重的并发症为误吸，液化饮食通常是天然食品。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 低血容量性休克应首先快速扩容，下列扩容溶液最优越的是平衡盐溶液。

27.【正确答案】 C

【答案解析】 控制并解除痉挛是治疗破伤风的重要环节。

28.【正确答案】 A

【答案解析】 实体肿瘤最有效的治疗方法是手术切除。良性肿瘤手术完整切除可治愈，恶性肿瘤早中期均以手术为主，辅以化疗、放疗、内分泌治疗和中医中药治疗等综合措施。

29.【正确答案】 C

【答案解析】 对 20 岁以下的青少年患有弥漫性甲状腺肿，一般不宜手术治疗，多在青春期后自行缩小，可给予小量甲状腺素。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 急性乳腺炎在脓肿形成前可患乳暂停哺乳，局部热敷或理疗利于早期炎症的消散，同时应用抗菌药物控制感染，在脓肿形成后应及时切开引流。故 D 选项是错误的，只有在形成脓肿后方可切开引流。

31.【正确答案】 D

【答案解析】 食管癌以手术治疗为主，辅以放射、化学药物等综合治疗。手术治疗适用于全身情况和心肺功能良好、无明显远处转移征象的病人。

32.【正确答案】 D

【答案解析】 胃肠道穿孔病人必须禁食，并留置胃管持续胃肠减压。胃肠减压可抽出胃肠道内容物和气体，减少胃肠道内容物继续流入腹腔，减轻胃肠内积气，改善胃壁血运，有利于炎症的局限和吸收，促进胃肠道恢复蠕动。但是胃肠减压会抽出胃肠道内的液体，不能预防体液丢失。

33.【正确答案】 D

【答案解析】 直肠指检是诊断直肠癌最重要且简便易行的方法。

34.【正确答案】 E

【答案解析】 急性阑尾炎形成堪为周围脓肿

后，应当暂不手术，通过输液、抗炎治疗 3 个月后，待肿块消失再行阑尾切除术。

35.【正确答案】 B

【答案解析】 分流术会使门静脉向肝的灌注量减少而加重肝功损害；部分或全部肝门静脉血未经肝处理而直接进入体循环，易致肝性脑病。

36.【正确答案】 C

【答案解析】 由于受肠道内积气的影响，在 B 超检查前应禁食 12 小时、禁饮 4 小时，以保证胆囊、胆管内充盈胆汁，并减少胃肠的内容物和气体的干扰。

37.【正确答案】 D

【答案解析】 禁食和胃肠减压：以减少胃酸分泌，吸出胃内容物，防止进入十二指肠刺激胰液分泌，并可减轻腹胀。应用胰酶抑制剂可抑制胰液分泌。补充液体、加强营养支持，维持水与电解质平衡和补充热量。

38.【正确答案】 A

【答案解析】 抗凝疗法是目前治疗急性深静脉血栓形成最主要的治疗方法，其治疗作用不仅在于防止血栓继续延伸发展和其他部位新血栓的形成，并有利于血栓静脉再管化和减轻血栓形成的后遗症。

39.【正确答案】 D

【答案解析】 静脉肾盂造影检查前限制饮水 12 小时，常规肠道准备，做碘过敏试验，检查前排空尿液，因此答案为 D。

40.【正确答案】 D

【答案解析】 导尿可检查尿道是否连续、完整。若能顺利进入膀胱，说明尿道连续而完整。

41.【正确答案】 D

【答案解析】 肾损伤时血红蛋白与血细胞比容持续降低表明有活动性出血。白细胞计数增高提示有感染。

42.【正确答案】 E

【答案解析】 肾结核手术后继续抗结核治疗 6 个月以上，以防结核复发。

43.【正确答案】 D

【答案解析】 凡保留膀胱的手术治疗，50% 以上的病人在 2 年内肿瘤复发。

44.【正确答案】 E

【答案解析】 骨牵引是利用骨圆针或不锈钢针直接穿入骨的坚硬部位，通过骨科床架上的滑轮进行牵引，也称直接牵引。

45.【正确答案】 C

【答案解析】 石膏固定病人的护理中最重要的评估内容是肢体血运情况，以防石膏过紧压迫动脉。

46.【正确答案】 B

【答案解析】 在对病人进行检查时，不可为了测试骨擦感或骨擦音而故意搬动伤处，以免加重局部损伤，造成病人的痛苦。

47.【正确答案】 E

【答案解析】 早期滑膜结核与类风湿性关节炎

炎都可以有大关节受累，症状也类似，可以引起关节畸形，和血沉增高，故病理活检是金标准。

48.【正确答案】 B

【答案解析】 骨盆牵引、卧硬板床可减轻间盘受压，促进髓核还纳。

49.【正确答案】 B

【答案解析】 第一产程又称宫颈扩张期。从开始出现间歇 5~6 分钟规律宫缩到宫口开全。初产妇约需 11~12 小时，经产妇约需 6~8 小时。

50.【正确答案】 A

【答案解析】 超声检查：是检查早期妊娠快速准确的方法。用超声多普勒仪能听到有节律、单一高调的主音，胎心率多在 120~160 次/分，可确诊为早期妊娠且为活胎，最早出现在妊娠 7 周时。

51.【正确答案】 A

【答案解析】 羊水栓塞一旦发生，首先要改善低氧血症，立即保持气道通畅，尽早实施面罩吸氧、气管插管或人工辅助呼吸，维持氧供以避免呼吸和心搏骤停。

52.【正确答案】 A

【答案解析】 化脓性脑膜炎的治疗原则是早期用药、混合用药，坚持用药，对症处理治疗并发症及支持疗法外主要采取抗生素进行病原学治疗。

53.【正确答案】 C

【答案解析】 会阴有侧切伤口的产妇，宜取

健侧卧位。C 的做法不利于侧切伤口愈合，所以是不正确的护理措施。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 急性胎儿窘迫时胎心率高于 160 次/分或低于 120 次/分，均提示胎儿窘迫。胎心率不规则，胎心音减弱，是胎儿严重缺氧的征象，最终胎心音消失，胎儿死亡。缺氧早期，表现为胎动频繁，如缺氧继续加重，引起迷走神经兴奋，肠蠕动增强，肛门括约肌松弛，胎粪排于羊水中。破膜后取胎儿头皮血测定 pH 值，进行血气分析，如果其 pH 值低于 7.20 提示胎儿有酸中毒，可诊断为胎儿窘迫。

55.【正确答案】 C

【答案解析】 HBeAg 是肝细胞内有 HBV 活动性复制，具有传染性。

二、A2 型题

1.【正确答案】 D

【答案解析】 尿激酶是目前国内临床应用最多的溶栓药，亦可用链激酶。

2.【正确答案】 D

【答案解析】 患者急性起病，有明显的腹膜刺激征伴胃肠道症状，可初步认为是急腹症。常见的急腹症有急性阑尾炎、急性肠梗阻、急性胰腺炎、急性胆囊炎和急性胃、十二指肠穿孔。急性阑尾炎以转移性右下腹痛为特征，急性肠梗阻以腹痛、腹胀、呕吐和停止排便排气为特征，急性胃、十二指肠穿孔一般有溃疡病史，以持续性上腹刀割样痛并很快扩散至全腹，急性胆囊炎 Murphy 征(+)，通过患者的症状和体征

可判断急性胰腺炎可能性大，而饮酒又是急性胰腺炎的常见诱因，确诊急性胰腺炎最有价值的指标为血淀粉酶含量。

3.【正确答案】 E

【答案解析】应用局麻后可能出现过敏反应或局麻药毒性反应，但此病人应用的利多卡因较少出现过敏反应，故考虑为 E。局麻药毒副作用表现为中枢神经系统、循环系统及呼吸系统表现，该病人目前情况符合上述表现。

4.【正确答案】 D

【答案解析】观察液体复苏效果根据尿量、心率、末梢循环、精神状态及中心静脉压等判断液体复苏的效果。尿量：成人应维持在 30~50ml/h，若尿量过少，说明有效循环血量不足，应加快补液速度，反之则成减慢补液速度；若病人心率快、烦躁、口渴、皮肤弹性差等，提示液体量不足，应加快补液速度。中心静脉压：有助了解循环血量和右心功能，小于 0.49kPa (5cmH₂O) 表示血容量不足，大于 1.47~1.96kPa (15~20cmH₂O) 表示右心功能不良。尿量是最重要和最简洁的指标，故答案为 D。

5.【正确答案】 D

【答案解析】脾破裂，出血量往往很大，进行输血是为了扩充血容量，维持有效循环，防止失血性休克。故选择 D。

6.【正确答案】 C

【答案解析】高热惊厥的患儿日后发热仍有可能出现惊厥，应告知家长物理降温的重

要性及方法，讲解惊厥发作时的急救方法；对癫痫患儿应嘱咐家长遵医嘱按时给患儿服药，不能随便停药，以免诱发惊厥，并嘱咐患儿避免到危险的地方及易受伤的环境中，以免发作时出现危险。

7.【正确答案】 C

【答案解析】流行性脑脊髓膜炎应用药 7~10 天；肺炎链球菌、流感嗜血杆菌脑膜炎应静脉滴注给药 10~14 天；金黄色葡萄球菌和革兰阴性菌脑膜炎，应用药 21 天以上。

8.【正确答案】 B

【答案解析】脐下 3 指可触及宫底，无压痛，阴道流血不多，无恶心、呕吐，此症状尚属正常，无需处理。

9.【正确答案】 A

【答案解析】先兆子宫破裂应与胎盘早剥相鉴别。先兆子宫破裂可有子宫瘢痕史，常发生在产程中，由于头盆不称、梗阻性难产等使产程延长或停滞。子宫先兆破裂时，患者宫缩强烈，下腹疼痛拒按，胎心异常，可有少量阴道流血，腹部可见子宫病理缩复环，伴血尿。胎盘早剥多伴有妊娠期高血压疾病或外伤史，剧烈腹痛，阴道流血量与贫血程度不成正比，子宫有压痛，B 超检查可见胎盘后血肿，胎儿在宫腔内。

三、B 型题

1. (1)【正确答案】 A

【答案解析】当腹部腹水量超过 1000ml 时，腹部可叩及移动性浊音。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 上消化道大出血时多有呕血，呕血多棕褐色，呈咖啡渣样，这是血液经胃酸作用形成正铁血红素所致。

(3) **【正确答案】** E

【答案解析】 健康人口中无特殊气味，糖尿病酮症酸中毒者有烂苹果味。

(4) **【正确答案】** D

【答案解析】 浅昏迷患者对声、光等刺激全无反应，但对强刺激可出现痛苦表情、呻吟和下肢的防御性躲避动作。生理反射存在，生命体征一般无明显变化。大、小便可有潴留或失禁。

2. (1) **【正确答案】** A

【答案解析】 此题考查抗结核药的副作用。链霉素主要不良反应是损害听神经，病人出现眩晕、耳鸣、耳聋和共济失调，严重者应及时停药，肾功能严重损害者不宜使用。

(2) **【正确答案】** C

【答案解析】 此题考查抗结核药的副作用。利福平不良反应除消化道不适、流感综合征外，有肝功能损害及过敏反应。

3. (1) **【正确答案】** D

【答案解析】 对于营养性缺铁性贫血患者，除了纠正病因，最重要的是给予含铁丰富的食物及药物。一般铁剂以口服为宜，常用口服铁剂有硫酸亚铁、琥珀酸亚铁(速力菲)；口服铁剂不能耐受，或病情要求迅速纠正贫血等情况下，可使用注射铁剂。常用肌肉注射铁剂为右旋糖酐铁或山梨醇铁。

(2) **【正确答案】** A

【答案解析】 巨幼红细胞贫血是由于叶酸和(或)维生素 B₁₂ 缺乏所引起的一类贫血，表

现为大细胞性贫血。本病中营养性巨幼红细胞贫血占 90%，以叶酸缺乏为主。由于人体不能合成叶酸，全部从食物中获得，且叶酸易被光照、煮沸分解破坏，体内贮量仅供 1~4 个月使用，故缺乏叶酸多见。故营养性巨幼红细胞贫血主要补充叶酸。

4. (1) **【正确答案】** E

【答案解析】 膀胱镜检查：最重要的检查手段。能直接观察肿瘤位置、大小、数目、形态、浸润范围等，并可取活组织检查，进行病理分级和分期，有助于确定诊断和治疗方案。

(2) **【正确答案】** D

【答案解析】 由于超声波检查方法简便，无创伤性，可反复进行，B 型超声扫描在肾癌诊断中占有极重要地位。现已于体检时常规应用，并作为临床肾癌首选检查方法。

5. (1) **【正确答案】** A

【答案解析】 腹腔穿刺是协助诊断腹腔疾病常用的检查方法，可根据穿刺液的颜色、气味、混浊度做细菌培养及淀粉酶的测定有助于诊断。胃十二指肠溃疡穿孔有食物流入腹腔，穿刺液为黄色、混浊状，含有食物残渣液体。

(2) **【正确答案】** B

【答案解析】 结核性腹膜炎产生草绿色透明腹水。

(3) **【正确答案】** C

【答案解析】 绞窄性肠梗阻肠管发生血运障碍，导致肠坏死。

(4) **【正确答案】** D

【答案解析】 坏死性胰腺炎胰腺被膜下有出血斑或血肿，最终导致胰腺周围组织的出

血和坏死，同时大量胰酶被吸收，使淀粉酶增高。

(5)【正确答案】 E

【答案解析】 实质性脏器破裂腹腔穿刺液的性质为不凝固的血液。

6. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 第一产程(宫颈扩张期)：从有规律宫缩开始至宫口开全。初产妇约需 11~12 小时，经产妇 6~8 小时。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 第二产程(胎儿娩出期)：从宫口开全到胎儿娩出。初产妇需 1~2 小时，经产妇约需几分钟至 1 小时。

7. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 宫颈和宫颈管活组织检查是确定宫颈癌前病变和宫颈癌的最可靠方法。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】 悬滴检查：玻片滴 10% 氢氧化钾或生理盐水与少许阴道分泌物混合，在

光镜下检查见到白色假丝酵母菌芽孢和菌丝可确诊。

8. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥时迅速使用镇静剂控制惊厥。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 维生素 D 缺乏性手足搐搦症窒息时将舌尖拉出口外，防止舌后坠，保证呼吸道通畅。

9. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 宫底高度为 26cm (22.4 ~ 29.0cm)，其孕周最可能为 28 周末。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 宫底高度为 32cm (29.8 ~ 34.5cm)，孕周最可能为 36 周末。

(3)【正确答案】 E

【答案解析】 不同妊娠周数的子宫底高度及子宫长度

妊娠周数	妊娠月份	手测子宫底高度	尺测耻上子宫底高度
满 12 周	3 个月末	耻骨联合上 2~3 横指	
满 16 周	4 个月末	脐耻之间	
满 20 周	5 个月末	脐下 1 横指	18(15.3~21.4) cm
满 24 周	6 个月末	脐上 1 横指	24(22.0~25.1) cm
满 28 周	7 个月末	脐上 3 横指	26(22.4~29.0) cm
满 32 周	8 个月末	脐与剑突之间	29(25.3~32.0) cm
满 36 周	9 个月末	剑突下 2 横指	32(29.8~34.5) cm
满 40 周	10 个月末	脐与剑突之间或略高	33(30.0~35.3) cm

10. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 异烟肼的毒副作用包括精神兴奋、周围神经炎、肝功受损和皮疹，可同

服维生素 B₆ 预防周围神经炎，并每月查肝功。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】链霉素的毒副反应包括对第8对脑神经的损害、肾损害、周围神经炎和过敏反应，因此需定期监测前庭和听力功能(此内容新版教材已删除，了解即可)。

(3)**【正确答案】** D

【答案解析】乙胺丁醇的毒副反应包括球后视神经炎、周围神经炎、消化道反应和肝功能损害等，应每月查视力、视野及辨色力。

(4)**【正确答案】** A

【答案解析】利福平的毒副反应包括肝功损害、消化道症状、过敏反应等，与异烟肼合用会增加对肝脏的毒性，多在治疗头两个月内出现，应每月查肝功。

11. (1)**【正确答案】** C

【答案解析】流行性腮腺炎治疗原则主要是：对症治疗，发生脑膜脑炎病例可短期使用肾上腺皮质激素及脱水药。

(2)**【正确答案】** A

【答案解析】对麻疹患儿可适当补充维生素A，有利于疾病的恢复，并可减少并发症的发生。

12. (1)**【正确答案】** C

【答案解析】营养性缺铁性贫血是由于体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少而引起的一种贫血。主要的治疗是去除病因和铁剂治疗。

(2)**【正确答案】** B

【答案解析】营养性巨幼细胞贫血是由于缺乏维生素B₁₂和(或)叶酸所引起的一种大细胞性贫血。主要的治疗原则：去除病因、补充维生素B₁₂和(或)叶酸是治疗的关键。

13. (1)**【正确答案】** B

【答案解析】白细胞总数降低提示病毒感染。

(2)**【正确答案】** A

【答案解析】白细胞总数及中性粒细胞总数增多提示细菌感染。

(3)**【正确答案】** C

【答案解析】过敏性肠炎会引起嗜酸性粒细胞增多。

(4)**【正确答案】** C

【答案解析】寄生虫引起的肠炎嗜酸性粒细胞增多。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 II 型呼吸衰竭患者应给予低浓度(25%~29%)、低流量(1~2L/min)鼻导管持续吸氧。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺气肿主要是因为肺泡弹性回缩力减低，小气道阻力增高，呼气时小气道提早闭合使气体滞留在肺泡内，呼吸效率降低。通过缩唇呼吸和腹式呼吸等呼吸功能锻炼可以降低呼吸阻力，防止呼气时小气道过早闭合，利于肺泡内气体排出，提高呼吸效率。故呼吸功能锻炼对于改善肺气肿早期症状具有重要意义。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】 此题考查支气管哮喘病人的护理要点。支气管哮喘发作时应根据病情提供舒适体位，并提供床桌等支撑物，以减少疲劳；加强监护，及时发现病情的变化，积极处理并发症；遵医嘱用药；给予氧疗，必要时进行机械通气；需特别注意的是哮喘发作时患者因张口呼吸、大汗及摄入不足等易出现脱水，因此，应鼓励病人饮水，水量>2500ml/d，以补充丢失的水分，稀释痰液，重症者应给予静脉补液，故限制水摄入是不正确的。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查了血压的分级标准，这个需要考生清楚地掌握。一级高血压是收缩压 140~159mmHg，舒张压 90~99mmHg。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 期前收缩>5次/分钟称频发性期前收缩。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 左心功能不全出现呼吸困难是由于肺淤血导致。急性左心衰竭会导致肺水肿的发生，从而影响肺泡壁毛细血管的气体交换及妨碍肺的扩张与收缩，引起通气与换气功能的障碍，刺激和兴奋呼吸中枢，病人感觉呼吸费力。

7. 【正确答案】 B

【答案解析】 右心衰竭主要表现为体循环静脉淤血，其症状以食欲不振、恶心、呕吐、水肿、腹胀、少尿、肝区胀痛等为特征。

8. 【正确答案】 C

【答案解析】 三腔两囊管适用于肝硬化食管-胃底静脉曲张患者，一般不用于单纯消化性溃疡大出血患者。

9. 【正确答案】 B

【答案解析】低血压或休克：常见于出血坏死型病人，由于胰腺发生大片坏死，病人烦躁不安、皮肤苍白、湿冷，少数病人可在起病数小时突然出现，甚至发生猝死。

10. **【正确答案】** B

【答案解析】原发性肝癌患者腹部疼痛常局限于右上腹部，呈持续性胀痛或钝痛，肝痛原因与肿瘤增长迅速使肝包膜被牵拉有关。患者突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征，根据病史，应首先考虑肝癌结节破裂，并破入腹膜。

11. **【正确答案】** A

【答案解析】当大便次数超过每日 3 次，且稀薄、容量及水分增加时，即为腹泻。

12. **【正确答案】** C

【答案解析】慢性肾衰竭终末期病人常发生高钾血症，主要因进食水果、肉类多，尿量少及使用保钾利尿药造成。

13. **【正确答案】** D

【答案解析】减轻疼痛的方法为卧床休息，采用屈曲位，尽量不要站立或坐立，因为站立时肾脏受到牵拉，会加重疼痛。

14. **【正确答案】** E

【答案解析】原发性肾病综合征临床表现：①大量蛋白尿 $>3.5\text{g/d}$ ；②低白蛋白血症：血清白蛋白 $<30\text{g/L}$ ；③水肿：是肾病综合征最突出的体征，全身性、体位性、凹陷性，程度不一；④常伴有高脂血症。

15. **【正确答案】** D

【答案解析】蛋白尿为慢性肾小球肾炎患者必有表现，尿蛋白量常在 $1\sim 3\text{g/d}$ 。

16. **【正确答案】** A

【答案解析】本题考查肾病综合征的饮食护理措施。肾病综合征的病人因大量蛋白尿导致低蛋白血症，所以饮食上要保证每日蛋白质的摄入，同时又要避免因摄入蛋白质过多导致体内含氮的废物产生过多，故应该给予正常蛋白饮食。正常蛋白饮食的标准是蛋白质 $0.8\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。故本题的答案为 A。

17. **【正确答案】** B

【答案解析】急性白血病患者出血最主要原因是血小板减少。多数病人有出血表现，但出血程度不同。

18. **【正确答案】** E

【答案解析】丙酸睾酮副作用及护理：①该药为油剂，需深层注射；由于吸收慢，注射部位易发生肿块，要经常检查注射部位，发现硬块要及时理疗；②男性化，如胡须增多、声音变粗、痤疮、女性闭经等，上述副作用于停药后短期内会全部消失；③肝功能受损，用药过程中应定期检查肝功能。

19. **【正确答案】** E

【答案解析】白消安可引起骨髓抑制、皮肤色素沉着、阳痿、停经。

20. **【正确答案】** E

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜一般不出现关节痛，而以身体各个部位出血为

主要表现。

21.【正确答案】 A

【答案解析】 各种贫血患者最常见的护理诊断是“营养失调：低于机体需要量：与铁补充不足，或叶酸和/或维生素 B₁₂ 缺乏，或骨髓造血功能异常等因素有关”。如果贫血程度严重，患者可出现活动无耐力、心排出量减少、呼吸型态改变等护理问题；如果合并正常白细胞数量减少、功能异常，则可能有感染的危险。

22.【正确答案】 B

【答案解析】 为满足甲状腺功能亢进病人机体代谢亢进的需要，应给予高热量、高蛋白、高维生素及矿物质饮食。禁止摄入刺激性的食物及饮料，如浓茶、咖啡等，以免引起病人精神兴奋。含碘食物可使甲状腺功能亢进症状加重，并影响抗甲状腺药物的疗效。

23.【正确答案】 E

【答案解析】 甲状腺功能亢进症患者由于 T₃、T₄ 分泌过多，促进营养物质代谢，产热与散热明显增多，以致出现怕热、多汗、食欲亢进等代谢率增高的表现，神经过敏、失眠，心动过速、收缩压增高，肠蠕动增快、腹泻等为甲状腺功能亢进症的神经系统、循环系统及消化系统表现甲状腺弥漫性肿大是甲状腺功能亢进症的典型体征。

24.【正确答案】 D

【答案解析】 类风湿结节的出现提示患者病情处于活动期。

25.【正确答案】 D

【答案解析】 类风湿关节炎关节病变的特点是：早期常为游走性，以后逐渐固定于数个对称性关节，因此呈对称性改变。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 几乎所有 SLE 患者均有肾脏损害，约 50% 患者有狼疮性肾炎。表现为肾小球肾炎或肾病综合征，可见不同程度的水肿，血尿、蛋白尿、管型尿、高血压及肾功能不全，一旦发展为尿毒症，则成为患者死亡的常见原因。

27.【正确答案】 E

【答案解析】 有机磷农药中毒副交感神经末梢兴奋，导致瞳孔缩小。

28.【正确答案】 B

【答案解析】 劳累、雨淋、游泳常为急性感染性多发性神经根神经炎发病的诱发因素。

29.【正确答案】 A

【答案解析】 脑桥出血轻者仅有头痛、呕吐，重者表现为出血灶侧周围性面瘫，对侧肢体中枢性瘫痪，称交叉瘫。当出血波及两侧时可出现四肢瘫，瞳孔呈针尖样。

30.【正确答案】 C

【答案解析】 预防呼吸道感染，去除义齿，每日清洁口腔 2 次，口腔溃疡可涂溃疡膏或锡类散。

31.【正确答案】 B

【答案解析】 癫痫患者禁止参加有危险的活动，如登高、游泳、驾驶以及在炉火或高

压电机旁作业，以免发作时危及生命，相比太极拳动作柔和、速度较慢适合癫痫患者修养身心，增强体质。

32.【正确答案】D

【答案解析】等渗性脱水一般可用等渗盐水或平衡盐溶液补充血容量，但等渗性盐水因其氯含量高于血清氯含量，大量补充有致高氯性酸中毒的危险。而平衡盐溶液内电解质含量与血浆相似，用于治疗将更为合理和安全，常用的有乳酸钠和复方氯化钠溶液。故正确答案为D。

33.【正确答案】D

【答案解析】低磷血症时，实验室检查血清无机磷低于0.96mmol/L。

34.【正确答案】A

【答案解析】静脉补钾应注意以下事项：尿量要在40ml/h以上；氯化钾浓度一般不超过0.3%；速度不超过1.5g/h；总量不宜超过3~6g/d。

35.【正确答案】C

【答案解析】胃肠有一定功能的，需要营养疗法的病人均可采用肠内支持。

36.【正确答案】E

【答案解析】休克的治疗原则是：1. 迅速恢复有效循环血量，采取扩容疗法，并注意强心和调节血管张力；2. 消除休克的致病因素，这是抗休克的根本措施；3. 保护重要器官功能，纠正水电解质紊乱及酸中毒。

37.【正确答案】E

【答案解析】成人24小时总尿量少于400ml成为少尿，不足100ml为无尿。

38.【正确答案】A

【答案解析】急性肾衰病人主要表现为少尿、无尿、尿毒症和水、电解质、酸碱平衡紊乱。少尿期初期禁食蛋白质3天，热量供应以糖为主。3~4天以后采用低蛋白、高糖、多种维生素饮食。

39.【正确答案】A

【答案解析】择期手术前应尽量常规排空胃，避免围手术期发生胃内容物的反流、呕吐和误吸，以及由此而造成的窒息和吸入性肺炎。正常人的胃排空时间约为4~6小时，因此病人在麻醉前应禁食8~12小时，禁水4~6小时。

40.【正确答案】B

【答案解析】局部麻醉的不良反应护理：局部不良反应多为局麻药和组织直接接触所致，若局麻药浓度高或与神经接触时间过长可造成神经损害。故用药必须遵循最小有效剂量和最低有效浓度的原则。

41.【正确答案】C

【答案解析】胸外按压的深度需达到至少5cm而不超过6cm。过浅的按压没有效果，而按压过深则会增大骨折发生的风险。

42.【正确答案】D

【答案解析】平均肺动脉压(MPAP)升高常见于肺血流量增加、肺血管阻力升高、二尖瓣狭窄、左心功能不全；而动脉瓣狭窄会出现MPAP降低。故选择D。

43.【正确答案】 B

【答案解析】 人体在术后早期应激状态下出现的代谢改变是高血糖。

44.【正确答案】 E

【答案解析】 应用镇咳剂会抑制咳嗽反射，从而导致不能有效咳出肺内分泌物，容易引起术后肺炎。

45.【正确答案】 E

【答案解析】 无菌包被浸湿后不可作为无菌物品使用，应重新灭菌。

46.【正确答案】 A

【答案解析】 表浅的急性蜂窝织炎，局部明显红肿、剧痛，并向四周迅速扩大，病变区与正常皮肤无明显分界，病变中央部位常因缺血发生坏死，常伴发热、寒战等全身症状；致病菌主要是溶血性链球菌，其次为金黄色葡萄球菌，亦可为厌氧性细菌。

47.【正确答案】 C

【答案解析】 破伤风的潜伏期一般为 7~8 天。

48.【正确答案】 E

【答案解析】 目前化疗特别强调联合用药方案，目的是减少药物毒性，提高疗效。

49.【正确答案】 A

【答案解析】 恶性肿瘤病人放疗期间每周应检查一次白细胞和血小板，当白细胞降至 $3 \times 10^9/L$ ，或血小板降至 $80 \times 10^9/L$ 时，应暂停放疗。

50.【正确答案】 C

【答案解析】 颅内压增高病人床头抬高 $15^\circ \sim 30^\circ$ 的主要目的是有利于颅内静脉回流，减轻脑水肿。

51.【正确答案】 C

【答案解析】 促进脑脊液外漏通道早日闭合：颅底骨折病人神志清醒者，取半坐卧位，昏迷者床头抬高 30° ，患侧卧位。维持半坐卧位体位至停止脑脊液漏后 3~5 日，目的是借助重力作用使脑组织移向颅底，使脑膜逐渐形成粘连而封闭脑膜破口。

52.【正确答案】 C

【答案解析】 甲亢病人术前要药物准备的方法主要有两种，一种是口服碘剂；另一种是先用硫脲类药物，待症状基本控制后改服碘剂。其中碘剂的作用是抑制甲状腺素的释放，硫脲类药物的作用是抑制甲状腺素的合成。

53.【正确答案】 E

【答案解析】 骨折的特殊体征是骨摩擦感。

54.【正确答案】 A

【答案解析】 胸腔引流可迅速排出胸腔内的气体，使肺及早复张，缓解呼吸困难。

55.【正确答案】 A

【答案解析】 疝囊经腹壁下动脉内侧的直疝三角区直接由后向前突出形成的疝为腹股沟直疝，不经过内环，也不进入阴囊。

56.【正确答案】 D

【答案解析】 由于腹膜有脱纤维作用，腹腔内的血液不会凝固，因此腹腔诊断性穿刺抽到不凝固血液是诊断腹腔内实质性脏器损伤的依据。腹胀程度有助于判断病情轻重，腹胀加重常提示病情恶化。膈下游离气体常提示病人发生了胃穿孔。腹痛性质不能成为诊断实质性脏器损伤的依据。

57. **【正确答案】** A

【答案解析】 消化性溃疡患者饮食应忌生冷食物，防止胃内出血。

58. **【正确答案】** D

【答案解析】 传统的肠道准备法：①控制饮食：术前 2~3 日流质饮食，以减少粪便的产生，有利于清洁肠道；术前禁食 12 小时、禁水 4 小时；②使用药物：术前 3 日口服新霉素或卡那霉素；由于肠道菌群被抑制，影响了维生素 K 的合成与吸收，故同时给予口服维生素 K；③清洁肠道：术前 3 日，每晚用番泻叶 10g 开水冲泡饮服，或口服泻剂硫酸镁，术前 2 日晚用肥皂水灌肠，术前 1 日晚清洁灌肠。

59. **【正确答案】** C

【答案解析】 腹水形成较多时病人表现腹部膨胀，能叩出腹部移动性浊音。

60. **【正确答案】** C

【答案解析】 白色恶露：黏稠，色泽较白。含大量白细胞、坏死蜕膜组织、表皮细胞及细菌等。

61. **【正确答案】** B

【答案解析】 正常产妇产后的生命体征特

点：①体温：大多在正常范围，偶尔产后一日内稍有体温升高，一般不超过 38℃，多在 24 小时后降至正常。体温超过 38℃ 者要考虑感染的情况。②脉搏：缓慢，约 60~70 次/分。脉搏过快要考虑发热、产后出血引起休克的早期症状。③呼吸：深慢，约 14~16 次/分。④血压：平稳。

62. **【正确答案】** D

【答案解析】 臀红护理：臀红原因是尿液及粪便长时间的刺激所致。处理方法是每次大小便后用温水洗净，适当暴露患部，用烤灯疗法。照射时以保持皮肤温热为适宜的距离，谨防烫伤。另外，要勤换尿布，氧化锌软膏涂抹患部。

63. **【正确答案】** C

【答案解析】 肌肉注射作用时间长，但局部刺激性强。注射时应注意使用长针头、深部肌肉内注射，也可加利多卡因于硫酸镁溶液中，以缓解疼痛刺激，注射后注意预防注射部位感染。硫酸镁的滴注速度以 1g/h 为宜，不超过 2g/h。中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失，随着血镁浓度的增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制，严重者心跳可突然停止。

64. **【正确答案】** D

【答案解析】 子宫张力较高，胎心音不易闻及是胎盘早剥的特点，不是前置胎盘的特点，故 D 答案错误。其他四项都是前置胎盘的特点。

65. **【正确答案】** A

【答案解析】 慢性羊水过多：较多见。多发

生于妊娠晚期，羊水可在数周内逐渐增多。孕子宫大于妊娠月份，腹部膨隆、腹壁皮肤发亮、变薄，检查时胎位不清，胎心遥远或听不到。

66.【正确答案】D

【答案解析】妊娠合并糖尿病的孕妇，属于高危妊娠的范畴，所以应该增加产前检查次数，定期产科和内科复查。由于新生儿处于一个体内高糖环境，其发育不太成熟，所以应按照早产儿护理，所以 A 和 B 均正确。注意预防感染发生，保持新生儿皮肤清洁，清理胎脂，产后积极提倡母乳喂养（糖尿病不影响母乳喂养），所以注意不能使用药物避孕。糖尿病产妇，即使接受胰岛素的治疗，哺乳也不会对新生儿产生不良影响。

67.【正确答案】E

【答案解析】不协调性子宫收缩乏力这种宫缩不能使子宫颈口扩张和先露下降，属无效宫缩。

68.【正确答案】A

【答案解析】子宫痉挛性狭窄环：指子宫壁某部肌肉在外因下呈痉挛性不协调性子宫收缩所形成的环状狭窄，持续不放松，称子宫痉挛性狭窄环。此环特点是不随宫缩上升，阴道检查可触及狭窄环。产妇持续性腹痛、烦躁、子宫颈扩张缓慢、胎先露下降停滞、胎心律不规则。

69.【正确答案】B

【答案解析】初乳是指产后 4 天内分泌的乳汁，量少，内含脂肪较少而免疫球蛋白

为主的蛋白质多。

70.【正确答案】B

【答案解析】破伤风起病初期，患儿烦躁不安，咀嚼肌先受累，张口及吸吮困难，随后牙关紧闭，面肌抽搐，口唇皱缩、引起口角上牵，出现苦笑面容，此特征为本病主要表现。

71.【正确答案】B

【答案解析】胎龄越小，出生体重越低，每次喂奶量越少，喂奶间隔越短，并且根据喂奶后有无腹胀、呕吐、胃内残留（管饲喂养）及体重增长情况调整（理想者每日增长 10~15g）。

72.【正确答案】D

【答案解析】新生儿窒息应及时按国际公认的 ABCDE 方案进行复苏，A 指首先要保持呼吸道畅通，患儿仰卧，垫高肩部使颈部伸展，迅速清除口、鼻、咽及呼吸道分泌物，选项 A、B、C、E 为建立呼吸与药物治疗的范围，故选择 D。

73.【正确答案】A

【答案解析】营养不良患儿皮下脂肪消瘦最早的部位是腹部。

74.【正确答案】C

【答案解析】6 个月以上小儿腕、踝部堆积的骨样组织形成钝圆形环状隆起，称佝偻病手镯或脚镯。

二、A2 型题

1.【正确答案】E

【答案解析】 当病人脉搏 <60 次/分或节律不规则应暂停服用洋地黄类药物并通知医生。

2. **【正确答案】** D

【答案解析】 轻、中度贫血或贫血发生缓慢、机体已获得代偿能力者，可轻度活动，以不加重症状、病人不感觉疲劳为度。

3. **【正确答案】** D

【答案解析】 急性 CO 中毒病人苏醒后，应该休息观察 2 周，以防迟发性脑病和心脏后发症的发生。

4. **【正确答案】** D

【答案解析】 老年男性，活动时发病，以意识障碍、肢体瘫痪、面瘫为主要症状，考虑脑出血可能性大。脑出血患者如果病情严重，脑内压力不均匀，脑组织从高压区向低压区移位，引起严重的并发症脑疝，患者可出现双侧瞳孔不等大的表现。

5. **【正确答案】** C

【答案解析】 心室颤动时，及时胸外按压和人工呼吸虽可部分维持心脑功能，但极少能将室颤转为正常心率，而迅速恢复有效的心率是复苏成功至关重要的一步。终止室颤最有效的办法是电除颤。

6. **【正确答案】** B

【答案解析】 硬膜外阻滞麻醉虽不会引起头痛，但因交感神经阻滞后，血压多受影响，因此术后观察血压、脉搏平稳后才可按手术本身的需要采取适当卧位。

7. **【正确答案】** A

【答案解析】 甲状腺大部分切除手术后病人出现呼吸困难和窒息的主要原因有切口内血肿压迫、喉头水肿、气管塌陷、痰液阻塞、双侧喉返神经损伤等。甲状腺血液循环丰富，手术中和手术后容易发生切口内出血，从而引起手术后呼吸困难和窒息。

8. **【正确答案】** D

【答案解析】 吻合口梗阻时大量呕出不含胆汁的胃内容物，呕吐后腹痛症缓解。输出袢梗阻时可呕出含有胆汁的胃内容物。输入袢梗阻呕吐频繁，量少，不含胆汁。十二指肠残端破裂有典型的腹膜刺激征表现。倾倒综合征多因吻合口过大，大量高渗食物快速进入小肠而出现腹痛、呕吐、腹泻、大汗等表现。

9. **【正确答案】** E

【答案解析】 根据提干描述，产妇为乳汁淤积，此时让新生儿多吮吸乳头可缓解症状。

10. **【正确答案】** C

【答案解析】 心功能 II 级的产妇，可以考虑经阴道分娩，但要缩短第二产程。目前产妇宫口已开全，虽然疲劳，但经过适当的休息后也是可以经阴道分娩的，所以不应再选用剖宫产结束分娩。

11. **【正确答案】** B

【答案解析】 对新生儿肺透明膜病的患儿，需要根据患儿的每日所需热量计算奶量，保证机体营养所需。不能吸吮吞咽者，可用鼻饲法或静脉营养液。

三、A3/A4 型题

1. (1)【正确答案】 D

【答案解析】 胰岛素各人剂量差异很大，需严格个体化。一般初始先用速效制剂，小量开始，逐渐增量。根据病情轻重，开始可按 0.2~1.0U/kg 计算一日总量，早、中、晚餐前或加上睡前分别皮下注射；依据各餐前、后及睡前血、尿糖水平，每 3~4 日调整 1 次剂量，每次可增减 2~4U，至血糖水平达到空腹 5~6.7mmol/L (90~120mg/dl)，餐后 \leq 8.3mmol/L (150mg/dl) 为宜，老年人治疗标准可适当放宽；血糖达稳定水平后，可继续用速效制剂维持治疗，也可改为中、长效制剂。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 胰岛素注射部位的选择与轮换：常用部位有臀大肌、上臂外侧、腹部、股外侧，将每个部位分为 15 个注射点，每天 3 次，可用 5 日，1 周内同一部位不应注射 2 次。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】 低血糖反应：最常发生，危险性也较大，主要与用量过大、进食过少或运动过多有关。

2. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 目前患儿最主要的问题是肾小球滤过率下降所引起的水肿和少尿，故该患儿的首优护理问题是体液过多。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 该患儿如不采取治疗会出现严重水肿，由于水钠潴留，血浆容量增加而出现严重的循环充血。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】 目前患儿的首优护理问题是体

液过多。休息可减轻心脏负担，改善心功能，增加心排血量，使肾血流量增加，提高肾小球滤过率，减少水钠潴留，减少潜在并发症发生；同时由于静脉压下降，降低了毛细血管血压，而能使水肿减轻。故此时护理措施最应强调的是使患儿绝对卧床休息。

3. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 宫体大、软是子宫内膜癌的体征。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜癌病变发生在子宫内膜，分段诊断性刮宫是目前早期诊断子宫内膜癌最常用的刮取子宫内膜组织的方法。先环刮宫颈管，后探宫腔，再行宫腔搔刮内膜，标本分瓶做好标记，送病理检查。此检查简单经济，其结果是确诊子宫内膜癌的依据。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】 淋巴转移是子宫内膜癌最主要的转移途径。

4. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 胰腺炎常与腮腺炎同时发生，表现为上腹疼痛、压痛、伴发热、寒战、呕吐等。严重者少见，多为轻型或亚临床床感染。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 病程早期血清和尿液淀粉酶增高，并发胰腺炎者显著增高，且脂肪酶也增高。血清或脑脊液中特异性 IgM 抗体增高。

(3)【正确答案】 C

【答案解析】 减轻腮腺肿痛，采用局部冷敷

收缩血管，减轻炎症充血程度及疼痛。用茶水或食醋调中药如意金黄散敷于患处，保持药物湿润，以发挥药效并防止干裂引起疼痛。

5. (1)【正确答案】 E

【答案解析】 患儿已 12 小时未排尿，重度脱水患儿常伴有低钾血症，补钾的原则是见尿补钾，故补液中对该患儿的病情观察最为重要的是否排尿。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 腹泻患儿进食少及从大便中丢失钙，在脱水和酸中毒时由于血液的浓缩和离子钙的增加，可不出现低血钙的症状，输液后血钙被稀释和酸中毒被纠正，离子钙减少，易出现低钙症状。

(3)【正确答案】 C

【答案解析】 根据患儿的临床特点：意识模糊，四肢发凉、皮肤弹性极差，前囟及眼窝凹陷明显，已 12 小时未排尿，可判断为重度脱水。血清钠 138mmol/L 为等渗性脱水。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《专业实践能力》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 B

【答案解析】 患者使用化学制冷袋过程中，需观察有无破损，漏液现象，以防损伤皮肤。

2.【正确答案】 B

【答案解析】 烤灯使用时应观察有无过热、心慌、头昏感觉及皮肤反应，皮肤出现红斑为剂量合适。

3.【正确答案】 B

【答案解析】 如需反复使用，中间必须给予 1 小时的休息时间，让组织有一个复原过程，防止产生继发效应而抵消应有的生理效应。

4.【正确答案】 B

【答案解析】 发热反应是常见的输液反应。常因输入致热物质所致，见于输液器灭菌不彻底或再次被污染，有效期已过；输入的液体或药物制剂不纯、消毒灭菌不彻底或已经过期、变质；输液过程中未严格遵守无菌操作原则等。

5.【正确答案】 B

【答案解析】 发生溶血反应是受血者血清中的凝集素和输入血中红细胞表面的凝集原

发生凝聚反应，红细胞凝聚成团，继而凝集的红细胞发生溶解，大量血红蛋白释放到血浆中出现黄疸和血红蛋白尿。

6.【正确答案】 E

【答案解析】 输液过程中出现静脉痉挛的主要原因是：患者所穿刺肢体长时间暴露在冷环境中，或所输入的药液温度过低。

7.【正确答案】 E

【答案解析】 病人的性别并不影响输液滴速调节。

8.【正确答案】 B

【答案解析】 严重脱水的病人输液速度宜快。

9.【正确答案】 C

【答案解析】 白蛋白液：从血浆提纯而得，能提高机体血浆蛋白和胶体渗透压，用于低蛋白血症病人。

10.【正确答案】 D

【答案解析】 血制品中不能随意加入其他药物，如钙剂、高渗或低渗溶液、酸性或碱性药物，以防止血制品变质，出现血液凝集或溶解。

11.【正确答案】 A

【答案解析】 低分子右旋糖酐属于胶体溶液，分子量较中分子右旋糖酐小，其溶液在血管内存留的时间长，因此可以降低血液黏稠度，减少红细胞聚集，改善血液循环和组织灌流量。

12.【正确答案】 C

【答案解析】 青霉素过敏性休克多在用药后 5~20 分钟内，甚至在用药后数秒内发生，既可发生于青霉素皮内过敏试验过程中，也可发生于初次肌肉注射时(皮内过敏试验结果阴性)，甚至也有极少数病人发生于连续用药的过程中。

13.【正确答案】 E

【答案解析】 氨茶碱使用前无需作过敏试验。

14.【正确答案】 D

【答案解析】 数种药片可放在同一药杯内；多种药液分别放置在不同药杯中。

15.【正确答案】 B

【答案解析】 雾化吸入法时调节氧流量达 6~8L/min。

16.【正确答案】 A

【答案解析】 糖衣片易潮解，因此应装瓶盖紧。

17.【正确答案】 B

【答案解析】 国家药典规定用药剂量：60 岁以上为老人剂量。

18.【正确答案】 C

【答案解析】 磺胺药服后，应多喝水。

19.【正确答案】 B

【答案解析】 s. o. s. 代表需要时(限用 1 次，12 小时有效)。

20.【正确答案】 D

【答案解析】 必要时(长期)医嘱应该是 p. r. n. 。

21.【正确答案】 D

【答案解析】 PSE 公式，P(problem, 护理诊断名称)+S(symptoms and signs, 症状和体征，也包括其他检查结果)+E(etiology, 相关因素)。

22.【正确答案】 B

【答案解析】 护理诊断依据 NANDA 提出的分类法，分为交换、沟通、关系、赋予价值、选择、移动、感知、认知、感觉/情感 9 个反应型态。

23.【正确答案】 D

【答案解析】 护理诊断是对个体或人群的健康问题或生命过程的现存的、潜在的或健康的反应的判断；医疗诊断是用来确定个体的具体疾病或病理状态，侧重对疾病病因、病理生理变化等的临床判断。

24.【正确答案】 C

【答案解析】 护理活动是一个过程，这个过程由一系列有序的步骤组成，包括评估、

诊断、计划、实施、评价。

25.【正确答案】D

【答案解析】白细胞减少是护理解决不了的问题。

26.【正确答案】A

【答案解析】护理程序是护士在对护理对象进行护理时所应用的工作程序，是一种系统解决问题的方法，是一个持续的、循环的、动态变化的过程。包括 5 个步骤：

1. 评估
2. 护理诊断
3. 计划阶段
4. 实施阶段
5. 评价阶段

27.【正确答案】C

【答案解析】实行合议制的原则是医疗事故鉴定工作的基本制度。

28.【正确答案】A

【答案解析】疏忽大意是行为人因一时粗心或遗忘而造成客观上的过失行为。

29.【正确答案】A

【答案解析】国务院与卫生部于 2002 年制定了《医疗事故处理条例》，并于 2002 年 9 月 1 日起施行。

30.【正确答案】D

【答案解析】维护护士的权益：护理法规定了护理人员的地位、作用和职责范围，使他们在从事法定的护理工作时，会受到法

律保护。

31.【正确答案】C

【答案解析】护士不注重患者的主诉或尊严，引起患者的不满，属于侵权行为（侵犯患者的生命权和隐私权）。

32.【正确答案】C

【答案解析】三级医疗事故指造成病人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的。

33.【正确答案】C

【答案解析】护士随意修改医嘱属于违法行为。

34.【正确答案】A

【答案解析】英国于 1919 年颁布了世界上第一部护理法。

35.【正确答案】C

【答案解析】语言性沟通是指沟通者通过语言或文字的形式与接受者进行信息的传递与交流。除外 C 均为非语言性沟通。

36.【正确答案】E

【答案解析】倾听时，护士要做到注意力集中，全神贯注，避免分心；耐心，不随意打断病人的谈话；不急于作判断；除关注病人的语言信息外还要关注病人的非语言信息，以了解病人真正要表达的意思。此外，护士应注意做到与病人经常保持眼神的交流，进行适当的提问以及采用适当的非语言信息时常给病人以响应。

37.【正确答案】 E

【答案解析】 倾听时，护士要做到注意力集中，全神贯注，避免分心；耐心，不随意打断病人的谈话；不急于作判断；除关注病人的语言信息外还要关注病人的非语言信息，以了解病人真正要表达的意思。此外，护士应注意做到与病人经常保持眼神的交流，进行适当的提问以及采用适当的非语言信息时常给病人以响应。

38.【正确答案】 A

【答案解析】 非语言性沟通包括的信息是通过身体运动、面部表情、利用空间、利用声音和触觉产生的，它可以伴随着语言性沟通而发生。不使用语言，但是可以用声音。比如笑声，哭声。

39.【正确答案】 C

【答案解析】 分享性沟通比陈述事实的沟通高一层次。病人对护士表达自己的想法，表示护患之间已建立起信任感，如病人向护士表达其对治疗的要求等。此时，护士应注意理解病人，不要随意反对病人。

40.【正确答案】 E

【答案解析】 影响沟通的个人因素包括生理因素、情绪状态、知识水平、社会背景和个性特征、外观形象，而急于陈述自己的观点是影响沟通的不适当的沟通方式。

41.【正确答案】 B

【答案解析】 佩皮劳将人际关系(护患关系)分为 4 个连续的阶段：认识期、确认期、开拓期、解决期。

42.【正确答案】 C

【答案解析】 认识期阶段结束时，双方已能齐心协力地辨别问题，相处得比较自然，并做好准备进入下一阶段。

43.【正确答案】 E

【答案解析】 因为在支持教育系统中患者有能力执行或学习一些必需的自理方法，但必须在护士的帮助下完成，所以护士的主要活动是调节其各项活动。

44.【正确答案】 B

【答案解析】 纽曼的服务对象系统结构包括：核心部分、弹性防线、正常防线、抵抗线。

45.【正确答案】 A

【答案解析】 该患者是由于与邻居争吵后急性哮喘发作，是受情绪影响，所以选择 A。

46.【正确答案】 B

【答案解析】 纽曼健康系统模式的核心部分为基本结构，是机体的能量源。

47.【正确答案】 D

【答案解析】 提出自我照顾模式的学者是奥伦；纽曼提出的是健康系统模式；马斯洛提出的是人类基本需要层次论；佩皮劳提出的是人际关系模式；汉斯·席尔提出的是压力理论。

48.【正确答案】 A

【答案解析】 罗伊认为健康是“个体成为一

个完整和全面的人的状态和过程”，人的完整性表现为有能力达到生存、成长、繁衍、主宰和自我实现，若个体能不断适应各种变化即能保持健康。

49.【正确答案】 B

【答案解析】 患者角色行为冲突指在适应患者角色过程中，与患病前承担的各种角色发生心理冲突而引起的行为不协调。

50.【正确答案】 A

【答案解析】 患者角色行为缺如是指患者不能正确对待自己的疾病或不承认自己是患者，而不能正确的履行患者的权利和义务。

51.【正确答案】 C

【答案解析】 患者角色行为强化，即患者经过治疗后，恢复了社会生活能力，但表现出依赖性增强，安于患者角色。

52.【正确答案】 A

【答案解析】 有些需要需立即和持续予以满足(如空气)，而有些需要可以暂缓(如食物、睡眠)，但它们最终是需要得到满足的。

53.【正确答案】 D

【答案解析】 病人角色就是社会对一个人患病时的权利、义务和行为所作的规范。

54.【正确答案】 B

【答案解析】 压力是环境中的刺激所引起的人体的一种非特异性反应。

55.【正确答案】 E

【答案解析】 开放系统是指与周围环境不断进行着物质、能量和信息交换的系统，如人体系统、医疗系统、教育系统等。E 属于按组成系统的内容和要素的性质分类的。

56.【正确答案】 C

【答案解析】 人的基本需要层次论为估计病人健康状况、预见病人的需要提供了理论依据。

57.【正确答案】 A

【答案解析】 “疲劳、疼痛”属于来自于对身体不适的感受，属于生理性范畴。因此 A 选项正确。

58.【正确答案】 D

【答案解析】 潜伏期：6 岁至青春期，此期孩子把性和攻击的冲动埋在潜意识中，而将精力集中在智力和身体活动上。

59.【正确答案】 E

【答案解析】 皮亚杰是瑞士杰出的心理学家。

60.【正确答案】 C

【答案解析】 一般系统论是关于次系统与超系统的学说，指出一个系统是由许多相互关联、相互作用的要素组成的整体，每个要素都具有其独特的功能，系统本身具有整体功能，且几个系统可联合成更大系统，系统是按复杂程度的层次排列组织的。较简单、低层次的系统称为次系统，较复杂、高层次的系统称为超系统。

61.【正确答案】 A

【答案解析】 一级医院是直接为一定人口的社区提供预防、治疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。

62.【正确答案】 B

【答案解析】 社区是一个有代表性的社会单元，人数大约在 10 万~30 万之间，面积在 5000~50000 平方公里。总之，社区是指一定地域内具有某些共同特征的人群在社会生活中所形成的共同体。

63.【正确答案】 D

【答案解析】 一级医院：是直接向具有一定人口(≤ 10 万)的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构。

64.【正确答案】 B

【答案解析】 1860 年，南丁格尔在英国的圣托马斯医院创办了世界上第一所护士学校。从 1860 年到 1890 年，学校共培养学生 1005 名，为护理教育奠定了基础。

65.【正确答案】 E

【答案解析】 护士需要帮助人群解决以下四个与健康相关的问题：①促进健康；②预防疾病；③恢复健康；④减轻痛苦。

66.【正确答案】 C

【答案解析】 1922 年加入国际护士会，以加入顺序名列第十一个会员国。

67.【正确答案】 D

【答案解析】 1985 年，卫生部护理中心在北京成立，进一步取得了 WHO 对我国护理学科发展的支持。

68.【正确答案】 A

【答案解析】 在护士姿态训练中，站姿是基础，是保持良好姿态的关键。

69.【正确答案】 D

【答案解析】 护理(nursing)，源于拉丁语，原意是“养育、保护、照料”等。

70.【正确答案】 A

【答案解析】 护理的服务对象既包括个人、家庭、社区和社会四个层面。

71.【正确答案】 E

【答案解析】 情感性需要指人有表达自身所体验的喜、怒、哀、乐各种情感的需要。

72.【正确答案】 D

【答案解析】 护理学的基本概念是人、健康、环境和护理。这四个概念的核心是人，即护理实践是以人的健康为中心的活动，缺少其中任何一个因素，护理都不可能发展成为一门学科。

73.【正确答案】 D

【答案解析】 阶段：学龄期(潜在期)

年龄：6~12 岁

危机：勤奋-自卑

正性解决指标：求得创造与自我发展，并能控制自己的世界。

负性解决指标：对自己失望，并从学校的

学习及同学的交往中退缩下来。

74.【正确答案】D

【答案解析】具体运思期：7~11岁，此期儿童摆脱了自我为中心，能同时考虑问题的两个方面或更多方面，如能接受物体数目、长度、面积、体积和重量的改变。想法较具体，开始具有逻辑思维能力。

75.【正确答案】C

【答案解析】弗洛伊德理论可以帮助护理人员了解身心发展过程，特别是健康人格形成过程中的心理需求，按照不同的性心理发展时期提供护理，以保证服务对象健全人格的形成。

二、A2型题

1.【正确答案】B

【答案解析】脑死亡的判断标准：

- (1)不可逆的深度昏迷。
- (2)自发呼吸停止。
- (3)脑干反射消失。
- (4)脑电波平直。

2.【正确答案】D

【答案解析】呼吸与脉搏的比例为1:4。

3.【正确答案】D

【答案解析】成人使用热水袋时水温为60~70℃。对意识不清、老年人、婴幼儿、麻醉未清醒、末梢循环不良等患者，水温应调至低于50℃。

4.【正确答案】D

【答案解析】冷疗可使局部血管收缩，毛细血管通透性降低，减轻局部充血；同时冷疗还可使血流减慢，血液的黏稠度增加，有利于血液凝固而控制出血。因而适用于局部软组织损伤的初期、扁桃体摘除术后、鼻出血等。

5.【正确答案】E

【答案解析】热疗使局部血管扩张，血液循环速度加快，促进组织中毒素废物的排出，血量增多，白细胞数量增多，吞噬能力增强和新陈代谢增加，营养状态改善使机体局部或全身抵抗力的修复力增强，因而炎症早期用热，可促进炎性渗出物吸收与消散。

6.【正确答案】B

【答案解析】大多数病人发生在输血后期或即将结束时。表现轻重不一，轻者出现皮肤瘙痒、荨麻疹、轻度血管性水肿，如眼睑、口唇水肿；重者因喉头水肿出现呼吸困难，两肺闻及哮鸣音，甚至发生过敏性休克。

7.【正确答案】E

【答案解析】根据患者的症状和体征可判断患者出现了溶血反应，处理措施应该是立即停止输血，而不是减慢输血速度。

8.【正确答案】C

【答案解析】已知每分钟滴数与输液总量，计算输液所需的时间。

输液时间(小时)=[输液总量(ml)×滴系数]/[每分钟滴数×60(分钟)]。该患者的

输液时间为 $1000 \times 15 / 50 \times 60 = 5$ 小时，从上午 8:20 开始输液，结束时间为 13:20，故选 C。

9.【正确答案】D

【答案解析】针头滑出静脉外：液体注入皮下组织，局部有肿胀、疼痛，应另选血管重新穿刺。

10.【正确答案】E

【答案解析】为了合理使用药物，充分发挥药效，防止过敏反应的发生，在使用某些高致敏药物前，应详细询问用药史、过敏史、家族史，并做药物过敏试验。

11.【正确答案】E

【答案解析】虽然存在过失行为，但没有造成损害后果，或虽存在损害后果，但医疗结构和医务人员没有过失行为，则都不属于医疗事故。

三、A3/A4 型题

1. (1)【正确答案】A

【答案解析】口服催吐法适用于清醒而能合作的病人尤其是紧急情况下的排出毒物。

(2)【正确答案】C

【答案解析】口服催吐法指病人口服洗胃溶液，再自动呕出的方法。适用于清醒、能主动配合的病人。洗胃溶液，液量为 10000~20000ml，温度为 25~38℃。

(3)【正确答案】B

【答案解析】电动吸引器洗胃时负压宜保持在 13.3kPa 左右，并留取第一次标本送检。

2. (1)【正确答案】B

【答案解析】弛张热是指体温常在 39℃ 以上，波动幅度大，24 小时内波动范围超过 1℃，但最低体温都超过正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核。

(2)【正确答案】B

【答案解析】对高热病人，测量体温应每隔 4 小时一次，待体温恢复正常 3 天后改为每天 2 次。

3. (1)【正确答案】A

【答案解析】下颌角和锁骨上缘中点连线的上 1/3 处，颈外静脉外缘进针。

(2)【正确答案】E

【答案解析】选择体位：协助病人去枕平卧，头偏向一侧，肩下垫一薄枕，使病人头低肩高，颈部伸展平直，充分暴露穿刺部位。

(3)【正确答案】D

【答案解析】输液反应及处理：

(1) 发热反应症状：病人发冷、寒战和发热，轻者发热在 38℃ 左右，严重者可达 40℃ 以上，伴有事业心、呕吐、头痛、脉速等症状。

处理：减慢滴速或停止输液，报告医生；高热患者给予物理降温，按医嘱给予抗过敏药物或激素治疗；必要时将剩余溶液和输液器送检验室做细菌培养。

(2) 循环负荷过重(肺水肿)

症状：患者突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳泡沫痰或血性泡沫痰。

处理：立即停止输液，报告医生，给患者于端坐卧位，腿下垂，以减少静脉回流；加压给氧并使氧气经过 20%~30% 酒精湿化

吸入，改善肺部气体交换；用止血带在四肢轮流结扎（5~10 分钟轮流放松一个肢体上的止血带）；按医嘱给予镇静剂、扩血管药及洋地黄等强心剂。

(3) 静脉炎症状：沿静脉走向出现条索状红线，局部红、肿、热、痛，有时伴有畏寒、发热等全身症状。

处理：患肢抬高并制动；局部用 95% 酒精或 50% 硫酸镁湿热敷；超短波理疗；如合并感染，根据医嘱给抗生素治疗。

(4) 空气栓塞症状：患者感胸部异常不适，呼吸困难，严重时紫绀。

处理：立即置患者于左侧卧位和头低足高位。

4. (1)【正确答案】 D

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 青霉素血清病型反应临床上少见，一般于用药后 7~12 天内发生，临床表现和血清病相似，有发热、关节肿痛、皮肤发痒、荨麻疹、全身淋巴结肿大、腹痛等。本例患者就是在青霉素应用第 7 天出现局部皮肤红、肿、热、痛等反应，由于症状不很典型，起初曾疑为静脉炎、丹毒等，最后考虑为青霉素血清病型过敏反应，停用青霉素后症状缓解。该病例告知我们，在应用青霉素静脉滴注治疗 7 天后，一旦局部皮肤出现红、肿、热、痛及发热、关节肿痛、皮肤发痒、荨麻疹、全身淋巴结肿大、腹痛等，应考虑到青霉素血清病型反应，并立即停用青霉素。

5. (1)【正确答案】 D

【答案解析】 主要特点是由无渣小分子物质组

成，不含纤维素，不需经过消化过程，可直接被肠道吸收，且营养全面，营养价值高。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 给要素饮食一般原则是由低浓度、少剂量、慢速度开始，等待病人可以耐受未出现不良反应后，逐渐增加浓度、剂量和注入速度。长期使用要素饮食者，需要补充维生素、矿物质及微量元素。管喂要素饮食过程中，加强对病人的巡视，如出现恶心、呕吐、腹胀、腹泻等症状时应查找原因，轻度反应者可适当调整浓度、剂量、温度和注入速度。重度反应者可暂停管喂。停用要素饮食时，需要逐渐减量，不可突然停用，否则会出现心慌、脉速、出汗、乏力等低血糖等症状。

6. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 世界卫生组织 (WHO) 对疼痛程度的分级：

0 级：无疼痛。

1 级（轻度疼痛）：有疼痛感但不严重，可忍受，睡眠不受影响。

2 级（中度疼痛）：疼痛明显，不能忍受，睡眠受干扰，要求用镇痛药。

3 级（重度疼痛）：疼痛剧烈，不能忍受，睡眠严重受干扰，需要用镇痛药。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 临床普遍推行 WHO 建议的三阶梯止痛疗法。其原则是：根据药效的强弱按阶梯顺序使用；使用口服药；联合用药；用药剂量个体化。

其方法是：①第一阶段：适用于轻度疼痛病人。可选用非阿片类、解热镇痛类、抗炎类药物，如：布洛芬、阿司匹林、对乙

酰氨基酚等。②第二阶段：适用于中度疼痛病人。使用非阿片类药物止痛无效时，可选用弱阿片类药物，如：可待因、氨酚

待因、曲马朵等。③第三阶段：适用于重度疼痛和剧烈性癌痛病人。可选用强阿片类药物，如：吗啡、哌替啶、美沙酮等。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网
www.med66.com

医学教育网（www.med66.com）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App