

仿真  
密卷

✓ 学霸同款

✓ 精华提炼

✓ 实战练习

卫生专业技术资格考试

**护理学（中级）**

医学教育网命题组 编

**绝密·内部**

依据考纲  
精心研发

考前爆料  
命题规律

精选考题  
仿真练习

## 《基础知识》仿真密卷

### 一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 急性上呼吸道感染最常见的致病微生物是

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 真菌

2. 洋地黄制剂治疗心衰最主要的机制是

- A. 兴奋肾上腺素受体
- B. 兴奋交感神经
- C. 增强心肌收缩力
- D. 抑制迷走神经系统
- E. 兴奋心脏传导系统

3. 上消化道大出血且不易控制的常见病因是

- A. 十二指肠球后溃疡出血
- B. 应激性溃疡出血
- C. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- D. 胆道出血
- E. 胃癌出血

4. 急性炎性脱髓鞘性多发性神经根病患者脑脊液的蛋白-细胞分离现象是指

- A. 蛋白增高而细胞数降低
- B. 蛋白降低而细胞数正常

C. 蛋白正常而细胞数升高

D. 蛋白正常而细胞数降低

E. 蛋白增高而细胞数正常

5. 对流行性脑脊髓膜炎哪项检查有助于快速诊断本病

- A. 血象
- B. 脑脊液检查
- C. 影像学检查
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 免疫学检测

6. 特发性血小板减少性紫癜的发病机制主要是

- A. 骨髓造血功能破坏
- B. 血小板抗体的存在
- C. 小血管炎性反应
- D. 凝血因子的缺乏
- E. 血小板生成抑制

7. 在我国引起急性胰腺炎的最常见病因为

- A. 大量饮酒和暴饮暴食
- B. 手术创伤
- C. 胆道疾病
- D. 并发于流行性腮腺炎
- E. 高钙血症

8. 输入贮存过久的库存血时，易引起

- A. 高钠血症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 高钾血症
- E. 低钠血症

9. 慢性肺源性心脏病形成最关键的病理基础是

- A. 气道不畅
- B. 肺组织弹性下降
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

10. 在我国导致慢性肾衰竭的主要病因为

- A. 梗阻性肾病
- B. 糖尿病肾病
- C. 狼疮性肾炎
- D. 高血压肾疾病
- E. 原发性肾小球疾病

11. 甲硫氧嘧啶的作用机制是

- A. 甲状腺素的合成
- B. 甲状腺激素效应
- C. 甲状腺对碘的吸聚
- D. 甲状腺释放甲状腺激素
- E. 肝脏对甲状腺激素的降解代谢

12. 引起肝硬化的病因不包括

- A. 甲型肝炎
- B. 酒精中毒
- C. 胆汁淤积
- D. 营养障碍
- E. 血吸虫病

13. 心源性水肿最常见的病因是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 继发性高血压
- D. 心肌肥厚
- E. 感染性心肌炎

14. 肺癌组织学分类中，女性多见的是

- A. 鳞状上皮细胞癌
- B. 小细胞未分化癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 腺癌
- E. 细支气管肺泡癌

15. 心脏骤停的心电图表现包括

- A. 室性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 心室颤动
- D. 房速
- E. 室性早搏

16. 心脏传导系统中自律性最高的是

- A. 窦房结
- B. 房室束
- C. 普肯耶纤维
- D. 左、右束支
- E. 房室结

17. 肾盂肾炎的最主要致病菌为

- A. 大肠杆菌
- B. 厌氧菌
- C. 真菌感染
- D. 支原体
- E. 衣原体

18. 机械性肠梗阻的病因为

- A. 肠管受压  
B. 慢性铅中毒  
C. 腹膜后血肿或感染  
D. 肠系膜血管栓塞  
E. 肠功能紊乱致肠痉挛
19. 诊断胃癌可靠的方法是  
A. 大便隐血阳性  
B. 消化道钡剂检查  
C. 胃 B 超检查  
D. 纤维胃镜检查  
E. 胃 CT 检查
20. 确诊前列腺癌的主要检查方法是  
A. CT 检查  
B. MRI 检查  
C. 前列腺活检  
D. 直肠 B 超检查  
E. 全身核素骨扫描
21. 诊断腰椎间盘突出症，有较高价值的检查是  
A. X 线平片  
B. CT  
C. MRI  
D. 椎管造影  
E. 屈颈试验
22. 急性腹膜炎发生休克的主要原因  
A. 剧烈疼痛  
B. 肠内积液刺激  
C. 腹膜吸收大量毒素，血容量减少  
D. 大量呕吐失液  
E. 腹胀引起呼吸困难
23. 等渗性脱水的主要原因是  
A. 反复呕吐  
B. 急性肠梗阻  
C. 长期禁食  
D. 昏迷而未补充液体  
E. 高热
24. 大肠癌的初步筛查选择  
A. 腔内 B 超检查  
B. CEA 测定  
C. 内镜检查  
D. 直肠指检  
E. 大便潜血检查
25. 腹外疝发生嵌顿最多的是  
A. 斜疝  
B. 直疝  
C. 股疝  
D. 脐疝  
E. 切口疝
26. 低渗性脱水时，体液的容量变化特点为  
A. 细胞外液正常，细胞内液减少  
B. 细胞外液减少，细胞内液正常  
C. 细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少  
D. 细胞外液轻度减少，细胞内液显著减少  
E. 细胞外液、内液按比例减少
27. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹部的机制是  
A. 胃肠功能紊乱  
B. 内脏神经反射  
C. 躯体神经反射  
D. 阑尾位置不固定  
E. 阑尾管壁痉挛
28. 确诊肠痿的首选检查是

- A. 大便常规  
B. B 超  
C. 磁共振检查  
D. 钡剂  
E. 口服亚甲蓝
29. 肛裂好发生于膝胸位时的  
A. 12 点处  
B. 8 点处  
C. 10 点处  
D. 4 点处  
E. 3 点和 6 点处
30. 肾移植术前，组织配型检查项目不含  
A. ABO 血型  
B. HLA 抗原  
C. 3P 试验  
D. 混合淋巴细胞培养  
E. 淋巴细胞毒性试验
31. 各种肠梗阻病人 X 线检查表现应除外  
A. 杯口状阴影  
B. 鱼肋骨刺状阴影  
C. 立位腹部 X 线平片见多个气液平面  
D. 气胀肠襻  
E. 龛影
32. 颅内压增高的病因除外  
A. 脑积水  
B. 婴幼儿颅骨未闭  
C. 脑寄生虫病  
D. 脑水肿  
E. 颅内肿瘤
33. 用于确诊原发性肝癌的最佳检查是  
A. 甲胎蛋白测定  
B. MRI 检查  
C. CT 检查  
D. 肝穿刺细胞学检查  
E. 血清白蛋白检查
34. 可确诊食管癌的检查方法是  
A. X 线钡剂检查  
B. 磁共振  
C. 食管镜  
D. 食管拉网脱落细胞学检查  
E. 核素扫描
35. 肠套叠病人特征性 X 线表现为  
A. 杯口状阴影  
B. 鸟嘴状阴影  
C. 立位 X 线片见多个气-液平面  
D. 鱼肋骨刺征  
E. 充盈缺损
36. 股骨下 1/3 骨折，易造成  
A. 股动脉损伤  
B. 腘动脉损伤  
C. 皮神经损伤  
D. 肱静脉损伤  
E. 坐骨神经损伤
37. 脊髓损伤最严重的病理类型是  
A. 脊髓挫伤  
B. 脊髓震荡  
C. 脊髓断裂  
D. 脊髓水肿  
E. 脊髓受压
38. 《医疗机构从业人员行为规范》不适用于  
A. 销售人员  
B. 财务人员

- C. 医师  
D. 药学技术人员  
E. 后勤人员
39. 断肢再植属于
- A. 自体移植  
B. 同种移植  
C. 异质移植  
D. 结构移植  
E. 异体移植
40. 下列属于深 2 度烧伤的是
- A. 伤及表皮浅层，皮肤红斑，局部温度高  
B. 伤及真皮层，小水疱，感觉迟钝，皮温较低  
C. 伤及真皮层，大小不一水疱，感觉过敏，皮温增高  
D. 伤及皮肤全层，达到皮下、肌肉、无水疱  
E. 伤及表皮生发层，有水疱，泡壁较薄，内含黄色液体
41. 颅底骨折诊断的最可靠依据是
- A. 颅底 X 线片  
B. 脑脊液耳鼻漏  
C. 头颅皮下出血  
D. 颅底骨质凹陷  
E. 颅神经损伤
42. 宫内节育器的主要避孕原理是
- A. 抑制排卵过程  
B. 杀死精子  
C. 抑制受精卵着床  
D. 改变卵子的运行方向  
E. 抑制性激素的分泌
43. 引起产后出血最常见的原因是
- A. 软产道裂伤  
B. 子宫收缩乏力  
C. 胎盘滞留  
D. 凝血功能障碍  
E. 胎盘剥离不全
44. 正常妊娠时孕妇血清或尿中绒毛膜促性腺激素的高峰出现于
- A. 妊娠 6~8 周  
B. 妊娠 8~10 周  
C. 妊娠 10~12 周  
D. 妊娠 12~14 周  
E. 妊娠 14~16 周
45. 早产发生的原因不包括
- A. 胎膜早破  
B. 骨盆狭窄  
C. 宫颈内口松弛  
D. 子宫畸形  
E. 胎儿畸形
46. 正常妊娠孕妇在整个妊娠期体重平均增加约
- A. 5.5kg  
B. 8.5kg  
C. 10.5kg  
D. 12.5kg  
E. 15.5kg
47. 异位妊娠破裂出血常见部位是
- A. 壶腹部  
B. 峡部  
C. 间质部  
D. 子宫角  
E. 伞部

48. 下列选项中，对雌激素的生理功能的描述，正确的是

- A. 促进卵泡和子宫发育
- B. 降低子宫对缩宫素的敏感性
- C. 减少输卵管上皮细胞的活动
- D. 使阴道上皮细胞内糖原减少
- E. 促进体内水钠排泄

49. 糖尿病孕妇合并心力衰竭时，其终止妊娠的时间最好是

- A. 妊娠小于 35 周
- B. 妊娠小于 26 周
- C. 妊娠 37 周
- D. 妊娠 39 周
- E. 妊娠 40 周

50. 年长儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是

- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 脑膜炎双球菌
- D. 表皮葡萄球菌
- E. 大肠杆菌

51. 急性肾小球肾炎发病与哪种病原体感染有关

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 原虫和寄生虫

52. 临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是

- A. 窒息、产伤
- B. 脑血管先天畸形

- C. 脑膜炎
- D. 血友病
- E. 输注高渗液体

53. 黏液血便、右下腹腊肠样包块，应首选的检查是

- A. 胃钡餐
- B. MRI
- C. 腹部 CT
- D. 腹部 B 超
- E. 结肠镜检查

54. 新生儿肺透明膜病的原因是

- A. 窒息
- B. 产时感染
- C. 羊水吸入
- D. 胎粪吸入
- E. 肺泡表面活性物质缺乏

55. 小儿出血性疾病中最常见的是

- A. 急性型血小板减少性紫癜
- B. 慢性型血小板减少性紫癜
- C. 维生素 C 缺乏症
- D. 血友病
- E. 血小板无力症

56. 惊厥持续状态是指惊厥发作时间持续超过

- A. 10min
- B. 15min
- C. 20min
- D. 25min
- E. 30min

57. 主动脉瓣关闭不全的病人会出现周围血管征，其主要原因是

- A. 心率加快
- B. 回心血量增加
- C. 收缩压升高
- D. 收缩压升高，舒张压降低
- E. 以上都不是

58. 某产妇，28 岁。足月分娩一重度窒息男婴，经抢救后复苏。产妇娩出胎盘后，

阴道出血呈间歇性，约 600ml，色暗红。检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道出血量明显减少。关于胎儿缺氧最早期的表现是

- A. 胎心减慢
- B. 胎心加快
- C. 胎动频繁
- D. 胎动减少
- E. 胎动消失

## 二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者女性，54 岁。既往无消化性溃疡病史，全身大面积烧伤 2 天，3 小时前突然出现呕血、黑便，针对该患者首选的检查方法是

- A. X 线钡餐检查
- B. 选择性血管造影
- C. 纤维胃镜
- D. CT 检查
- E. 腹部透视

2. 患者，男性，30 岁，自诉近期头晕，乏力，注意力不集中。实验室检查：小细胞低色素贫血，其原因可能是

- A. 缺维生素 K
- B. 缺维生素 B
- C. 缺叶酸
- D. 缺钙
- E. 缺铁

3. 患者男性，41 岁。饮酒后上腹部剧痛 12 小时，伴有恶心、呕吐，疼痛向右肩部放射。查体：上腹部压痛、反跳痛明显，Murphy 征(-)，肠鸣音消失。为明确诊断首选的化验检查是

- A. 血常规检查
- B. 尿常规检查
- C. 肝功能检查
- D. 血淀粉酶含量测定
- E. 血中胆红素测定

4. 王女士突然出现发作性呼气性呼吸困难，怀疑哮喘，去医院就诊时已经缓解，有助于诊断的血象变化是

- A. 白细胞计数增高
- B. 单核细胞增高
- C. 淋巴细胞增加
- D. 嗜酸性粒细胞增高
- E. 嗜碱性粒细胞增高

5. 男，32 岁，上腹部疼痛已 1 天，进食后加剧，伴呕吐，呕吐后疼痛不缓解，疑为急性胰腺炎。应避免的病因中不包括哪项

- A. 胆道感染
- B. 胰管结石
- C. 慢性胃炎
- D. 酗酒
- E. 暴饮暴食

6. 患者，男 38 岁，半小时前呕血 300ml，2 小时前大量饮酒，无肝病及胃病史，查体：BP16/10kPa ( 120/75mmHg )，P90 次/分，上腹部有轻压痛，临床疑诊急性糜烂性胃炎。为明确诊断，首选的检查是

- A. 紧急胃肠钡餐检查
- B. 急诊内镜检查
- C. 急诊剖腹探查
- D. 吞线试验
- E. 出血停止 1 周后做有关检查

7. 女，45 岁，轻度肥胖，无明显口渴、多饮和多尿现象，空腹血糖 6.8mmol/L。为确定是否有糖尿病，应检查

- A. 糖化血红蛋白
- B. 24 小时尿糖定量
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. 复查空腹血糖
- E. 餐后 2 小时血糖

8. 男性，72 岁，慢性胃炎 30 年，近 2 周出现发作性胸痛，伴反酸、烧心、呃逆，此时首先要进行以下哪种检查

- A. 胃镜
- B. 心电图
- C. 冠脉造影
- D. 食管 24 小时 pH 监测
- E. 食管测压

9. 女性，34 岁，全身化脓性感染，需抽血做血培养及抗生素敏感试验，最佳时间应是

- A. 高热时
- B. 间歇期
- C. 寒战时
- D. 静脉滴注抗生素时

E. 抗生素输入后

10. 患者，男性，50 岁。有便血症状，大便带血，一天前出现腹痛、肛门停止排便排气。X 线检查示结肠胀气，最有可能是

- A. 菌痢
- B. 左半结肠癌
- C. 右半结肠癌
- D. 肠结核
- E. 克罗恩病

11. 男，46 岁，因足底刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致病人死亡的常见原因是

- A. 休克
- B. 窒息
- C. 肺部感染
- D. 心脏损害
- E. 脱水、酸中毒

12. 患者男，56 岁。需做大便潜血试验，护士指导其在标本采集前三天内，可食用的食物为

- A. 肉类
- B. 动物肝
- C. 绿叶蔬菜
- D. 豆制品
- E. 动物血

13. 男性，35 岁，阑尾切除术后第 5 天，体温升高，大便次数增多，解黏液便，有里急后重，考虑并发了盆腔脓肿，首选的检验方法是

- A. 腹部 B 超
- B. 腹腔穿刺
- C. 直肠指检

- D. 大便细菌培养
- E. X 线腹部透视

14. 患者男性，65 岁。尿频、夜尿增多已 5 年，常有排尿困难和尿潴留，反复发作尿路感染已 1 年。发作时有尿频、尿急、尿痛和发热，经用抗生素治疗后退热，症状缓解，但不久又再复发。本例进一步检查最有价值的是

- A. 腹部 X 线平片
- B. 静脉肾盂造影
- C. 中段尿培养
- D. 尿找抗酸杆菌
- E. 肛门指诊前列腺检查

15. 25 岁，已婚妇女。平素月经规律，现停经 54 天，入院检查：每日肌注黄体酮 20mg，连用 5 天，停药后 8 天仍未出现阴道流血，最可能的诊断是

- A. 继发闭经
- B. 早期妊娠
- C. 卵巢早衰
- D. 子宫性闭经
- E. 垂体性闭经

16. 女，24 岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，平常月经规律，5~7 天/33 天，拟妊娠生育，末次月经为 3 月 27 日，其下次排卵期大约为

- A. 3 月 30 日
- B. 4 月 1 日
- C. 4 月 4 日
- D. 4 月 10 日
- E. 4 月 15 日

17. 某妊娠合并糖尿病产妇，孕期无其他合并症，于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴，对

于该新生儿应重点监测的内容是

- A. 大小便
- B. 体重
- C. 黄疸
- D. 血糖
- E. 体温

18. 女性，23 岁，婚后 2 年，因漏服避孕药后停经 50 天，妊娠试验阳性，阴道流血 1 周，略少于经量，时伴有腹痛，最佳的处理措施是

- A. 口服大量甲羟孕酮
- B. 卧床休息，服用苯巴比妥
- C. 注射黄体酮保胎
- D. 复查妊娠试验
- E. 咨询孕妇的意见后决定

19. 女，30 岁。结婚 4 年未孕，平素下腹隐痛，经期加重，阴道后穹窿触痛明显，为确诊最可靠的辅助检查是

- A. 腹腔镜检查
- B. 子宫输卵管碘油造影
- C. 超声检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 宫腔镜检查

20. 患者，女性，28 岁。孕 2 产 1，孕 39 周，见红 3 小时、阵发腹痛 2 小时入院。检查：枕左前位，胎心 126 次/分，宫缩持续 40~45 秒，间歇 1~3 分钟，肛查：宫口开大 4cm，先露头，S<sup>0</sup>，前羊水囊明显。入院后首选的处理是

- A. 肥皂水灌肠
- B. 入待产室待产
- C. 胎儿电子监护
- D. 缩宫素静脉滴注

E. 入产房准备接生

21. 6 月女婴，因贫血住院，实验检查血清叶酸 3ug/L，诊断营养性巨幼红细胞贫血，给予叶酸治疗，为了提高疗效同时服

- A. VitB<sub>12</sub>
- B. VitD
- C. VitC
- D. VitA
- E. VitE

22. 患儿 1 岁，间断高热一周，眼结膜充血，口唇皲裂伴出血，草莓舌，肛周皮肤发红，血常规提示白细胞及中性粒细胞增多，血沉增快，诊断为川崎病，以下哪项表现不可能出现在该患儿症状中

- A. 胆囊炎
- B. 无菌性脑膜炎
- C. 颈部淋巴结肿大
- D. 腹痛、呕吐及腹泻
- E. 肝大

23. 男，4 岁。2 周前曾患感冒，今晨发现全身散发瘀点，下肢有瘀斑。病后不发热。检查：肝、脾(-)，血小板  $40 \times 10^9/L$ ，其他未见异常。患者诊断为原发性血小板减少性紫癜。导致患儿皮肤出现瘀点(斑)的最主要的原因是

### 三、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1. A. 产生血小板抗体
- B. 骨髓造血功能衰竭

- A. 凝血因子增加
- B. 血小板数量减少
- C. 血小板功能减低
- D. 毛细血管脆性增加
- E. 毛细血管通透性降低

24. 女，5 岁。发现心脏杂音、全身发绀 3 年半，活动后突然晕厥、抽搐。听诊胸骨左缘第 3 肋间闻及 II 级收缩期杂音，肺动脉第 2 音减弱。该患儿晕厥发作的机制是

- A. 脱水
- B. 血栓形成
- C. 肺动脉漏斗部痉挛
- D. 感染侵犯脑实质
- E. 心功能不全

25. 患儿男，3 岁半。生长发育缓慢，反应迟钝，2 岁半时会走、说话。身高 80cm，体重 12.5kg，皮肤粗糙，面色苍白，眼睑水肿，鼻梁低，表情呆滞，进食少，大便每 3~4 天一次，腹部膨隆，Hb90g/L。最可能的诊断是

- A. 巨结肠
- B. 营养不良性贫血
- C. 佝偻病
- D. 先天愚型
- E. 先天性甲状腺功能减低症

- C. 机体免疫功能缺陷
- D. 铁缺乏

E. 凝血因子缺乏

- (1) 再生障碍性贫血的主要发病机制
- (2) 白血病的主要发病机制
- (3) ITP 的主要发病机制
- (4) 小细胞低色素性贫血的主要发病机制

2. A. 增加对氨的吸收

B. 引起代谢性碱中毒，促使氨通过血-脑屏障

C. 蛋白质分解，肠内产氨增多

D. 脑组织缺氧降低了对氨的耐受性

E. 降低血氨的代谢

- (1) 上消化道出血诱发肝性脑病的原因是
- (2) 大量放腹水诱发肝性脑病的原因是

3. A. 全血细胞减少

B. 红细胞与血红蛋白减少

C. 血小板减少

D. 白细胞减少

E. 幼稚白细胞增多

- (1) 急性白血病骨髓象显示
- (2) 再生障碍性贫血血液检查显示
- (3) 特发性血小板减少性紫癜血液检查显示

4. A. 全脓胸

B. 局限性脓胸

C. 包裹性脓胸

D. 脓气胸

E. 多房脓胸

(1) 脓胸病人胸腔内有气体，出现液平面称为

(2) 脓胸病人脓液布满全胸膜腔称为

5. A. 白带悬滴检查

B. 分泌物涂片检查

C. 宫颈组织检查

D. 分段诊断性刮宫检查

E. 宫颈刮片检查

- (1) 宫颈癌患者确诊的方法是
- (2) 阴道假丝酵母菌病患者确诊的方法是
- (3) 子宫内膜癌患者确诊的方法是
- (4) 宫颈癌普查选择

6. A. 滴虫阴道炎

B. 外阴阴道假丝酵母菌病

C. 细菌性阴道炎

D. 非特异性阴道炎

E. 萎缩性阴道炎

- (1) 抗生素可导致的阴道炎
- (2) 患者女，52 岁，绝经 3 年，雌激素水平低落所致的阴道炎为

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《相关专业知 识》仿真密卷

### 一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 根据受传者对信息的选择性，受传者更容易接受或记住的信息是
  - 自己需要、关心的信息
  - 与自己观念不一致的信息
  - 令自己费解的信息
  - 令自己反感的消息
  - 令自己气愤的信息
- 区别高可变性行为与低可变性行为属于
  - 社会诊断
  - 生活诊断
  - 行为诊断
  - 环境诊断
  - 流行病学诊断
- 健康教育中最常用的体语是
  - 手语
  - 身体运动
  - 姿势
  - 面部表情
  - 眼睛运动
- 以下选项不属于医院健康教育意义的是
  - 提高患者依从性
  - 消除致病因素
  - 提高医院的知名度
  - 降低医疗成本
  - 心理治疗
- 以下属于糖尿病患者“自我效能”的是
  - 对正确使用胰岛素的认识
  - 对进行运动疗法困难的认知
  - 对药物治疗糖尿病有效性的肯定
  - 对自觉进行饮食控制能力的自信
  - 对引发糖尿病并发症危害及后果的判断
- 关于小组讨论的组织技巧，错误的是
  - 讨论开始首先确定讨论提纲
  - 常用座位排列为圆形
  - 谈论时间宜在 1 小时左右
  - 人数多控制在 6~10 人
  - 常用座位排列为马蹄铁形
- 健康教育的核心为
  - 促进人们自身护理能力和行为
  - 促进人们住院适应能力
  - 促进人们自我保健能力和行为
  - 促进人们的健康行为和生活方式
  - 帮助人们建立健康行为
- 行为诊断的主要目的是
  - 形成的时间已久的行为
  - 找出主要健康问题以及引起健康问题的行为因素和环境因素

- C. 核实刚刚形成的行为
- D. 确定目标人群疾病或健康问题发生的行为危险因素
- E. 找出正处在发展期的行为
9. 属于人际传播的是
- A. 医生对病人的咨询
- B. 出版书籍
- C. 小群体内的传播活动
- D. 出租车上的广告
- E. 个人接受外界信息后，在头脑中进行信息加工
10. 通过电视、报刊、宣传册等手段传播健康信息属于
- A. 人际传播
- B. 群体传播
- C. 大众传播
- D. 组织传播
- E. 自我传播
11. “您今天的气色好多了，是吧？”属于常见提问方式中的
- A. 封闭式
- B. 开放式
- C. 复合式
- D. 探索式
- E. 偏向式
12. 在对糖尿病患者进行教育需求评估时，以下不是考虑的主要内容的是
- A. 患者糖尿病的相关知识水平
- B. 患者的学习能力
- C. 糖尿病患者所处的环境
- D. 应当采用什么药物进行治疗
- E. 患者对健康教育的态度
13. 以下行为不属于“人类本能行为”的是
- A. 摄食
- B. 睡眠
- C. 模仿
- D. 性行为
- E. 躲避行为
14. 根据格林模式，“生活质量”属于健康教育诊断中的
- A. 社会诊断
- B. 行为诊断
- C. 流行病学诊断
- D. 环境诊断
- E. 教育诊断
15. 健康信念模式解释健康相关行为所运用的方法是
- A. 医学基础
- B. 社会心理
- C. 临床医学
- D. 医学管理
- E. 卫生管理
16. 调查居民艾滋病防治相关知识知晓率属于什么评价
- A. 效应评价
- B. 结局评价
- C. 总结评价
- D. 综合评价
- E. 远期评价
17. 当被观察者知道自己成为观察对象，从而表现出的异乎寻常的现象被称为
- A. 回归因素
- B. 霍桑效应
- C. 马太效应

- D. 从众心理
- E. 选择效应

18. 人类成年后由于环境、社会及个人状况的不断变化，会对自己的行为进行不断地调整、完善，这属于人类行为发展的

- A. 被动发展阶段
- B. 主动发展阶段
- C. 自主发展阶段
- D. 巩固发展阶段
- E. 自我发展阶段

19. 贯穿于计划执行全过程的评价活动是指

- A. 形成评价
- B. 总结评价
- C. 过程评价
- D. 效应评价
- E. 结局评价

20. 造成病人中度残疾，器官组织损伤，导致严重功能障碍的属于哪级医疗事故

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 五级医疗事故

21. 有效控制特征中，“强调例外”是指

- A. 控制的标准必须是先进、合理的
- B. 有效控制系统应是合理、适用的
- C. 控制手段应顾及到例外情况的发生
- D. 有效控制系统能够提供及时的反馈
- E. 有效控制系统依赖于准确的数据

22. 一种用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能，称为

- A. 规划
- B. 组织树
- C. 政策
- D. 程序
- E. 策略

23. 计划工作的原则包括

- A. 系统性原则、可评估原则
- B. 弹力原则、整体性原则
- C. 可评估原则、创新原则
- D. 重点原则、整体性原则
- E. 弹性原则、可考核性原则

24. 下列属于非正式沟通的优点的是

- A. 效果较好
- B. 易于保密
- C. 内容广泛
- D. 信息较可靠
- E. 易于保持沟通的权威性

25. PDCA 循环管理的四个阶段是

- A. 计划、执行、检查、反馈
- B. 组织、执行、检查、处理
- C. 计划、执行、反馈、处理
- D. 计划、执行、检查、处理
- E. 组织、执行、评价、处理

26. 梅奥人际关系管理理论的核心是

- A. 提高劳动生产力
- B. 实行科学化管理
- C. 调动人的积极性
- D. 公平的分配制度
- E. 合理地任用人员

27. 韦伯(M. Weber)提出的行政组织理论是

- A. 科学管理理论

- B. 管理活动中要遵循 14 项原则  
C. 管理分工原则  
D. “理想的行政组织体系”理论  
E. 实行差别工资制
28. 护士长根据病人情况、护理人员的人数、水平等进行有效组合，体现了护理排班的
- A. 按职上岗原则  
B. 公平原则  
C. 合理结构原则  
D. 满足需要原则  
E. 效率原则
29. 按决策的重复性划分，可分为
- A. 战略性决策和战术性决策  
B. 常规决策和非常规决策  
C. 长期决策和短期决策  
D. 重复决策和单一决策  
E. 确定型决策和风险型决策
30. 协调的实质是
- A. 处理人际关系  
B. 处理利益  
C. 努力做到公平合理  
D. 掌握原则性和灵活性  
E. 科学管理
31. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等，体现了领导的
- A. 管理权  
B. 决策权  
C. 决定权  
D. 用人权  
E. 指挥权
32. 著名的“霍桑实验”对管理理论的主要贡献是证明了
- A. 人的从众心理  
B. 人是“经济人”  
C. 人是“社会人”  
D. 人具有二重性  
E. 人是“自然人”
33. 目标管理的执行阶段包括
- A. 咨询指导、调节平衡、奖惩兑现  
B. 协议授权、咨询指导、奖惩兑现  
C. 咨询指导、调节平衡、反馈控制  
D. 协议授权、咨询指导、反馈控制  
E. 协议授权、调节平衡、反馈控制
34. 在卫生部 1985 年试行的专业技术职务聘任中规定，一般病区护师的设置是
- A. 每 10~20 张床设 1 名  
B. 每 5~10 张床设 1 名  
C. 每 15~25 张床设 1 名  
D. 每 20~25 张床设 1 名  
E. 每 15~20 张床设 1 名
35. 直线型组织结构的局限性是
- A. 结构简单  
B. 责权明确  
C. 权力过于集中  
D. 联系不便  
E. 管理成本较高
36. 知人善任，扬长避短，充分发挥人员的才能，属于
- A. 职务要求明确原则  
B. 责权利一致原则  
C. 公平竞争原则  
D. 用人之长原则

E. 系统管理原则

37. 不属于 ICU 护理质量管理原则的是

- A. 制度化
- B. 针对性
- C. 延续性
- D. 提倡介入性监护方法
- E. 持续质量改进

38. “冲突是与生俱来的，组织应当接纳冲突，使之合理化”，这一观点来自于

- A. 现代观点
- B. 传统观点
- C. 动态观点
- D. 人际关系观点
- E. 相互作用观点

39. 管理的首要职能是

- A. 组织
- B. 领导
- C. 人力资源管理
- D. 计划
- E. 控制

40. 我国护理组织的最高行政职能机构是

- A. 国务院
- B. 各省省政府
- C. 中华护理学会
- D. 国家人社部
- E. 国家卫生计生委

41. 信息的发送者将信息译成接收者能够理解的一系列符号，如语言、文字、图表、照片、手势等的过程称为

- A. 信息源
- B. 编码

C. 传递信息

D. 解码

E. 反馈

42. PDCA 循环管理中，D 代表什么

- A. 计划
- B. 执行
- C. 检查
- D. 处理
- E. 评价

43. 下列选项中，属于个案护理的缺点是

- A. 护理缺乏整体性
- B. 对护士业务知识要求较高
- C. 护士工作压力较大
- D. 所需费用高
- E. 对管理者要求较高

44. 制订计划时必须留有一定调节余地，以确保计划目标的实现，这遵循的是

- A. 系统性原则
- B. 可考核性原则
- C. 重点原则
- D. 创新原则
- E. 弹性原则

45. 下列选项中，不属于时间管理的方法的是

- A. ABC 时间管理法
- B. 四象限时间管理法
- C. 区域管理法
- D. 记录统计法
- E. 特定时间进度法

46. 在 ABC 时间管理方法中，C 级目标指

- A. 必须完成的目标

- B. 最重要的目标
- C. 较重要的目标
- D. 很想完成的目标
- E. 不太重要的目标

47. 建设性冲突对组织效率有积极作用，它是指冲突双方由于手段或认识不同而产生的冲突，但

- A. 方法一致
- B. 途径一致
- C. 目标一致
- D. 感情一致
- E. 目的一致

48. 数字化的计划被称为

- A. 规划
- B. 决策
- C. 预报
- D. 预算
- E. 方案

49. 属于团体决策方法的是

- A. 期望值准则法
- B. 头脑风暴法
- C. 最大收益值法
- D. 决策树法
- E. 最小的后悔值法

50. 医院的灭菌合格率必须达到

- A. 100%
- B. 99.99%
- C. 99.9%
- D. 99%
- E. 95%

51. 入院时无明确潜伏期的感染，规定为医

院感染的时间是

- A. 12h 后
- B. 24h 后
- C. 36h 后
- D. 48h 后
- E. 72h 后

52. 对不耐热、不耐湿物品进行消毒时可选用

- A. 紫外线消毒
- B. 环氧乙烷气体灭菌
- C. 高压蒸汽灭菌
- D. 消毒液浸泡消毒
- E. 电离辐射灭菌

53. 以下消毒灭菌方法中，应用最广泛、效果最好的是

- A. 环氧乙烷气体熏蒸法
- B. 紫外线照射
- C. 高压蒸汽法
- D. 消毒液浸泡法
- E. 电离辐射法

54. 医院感染监测可分为

- A. 综合性监测和目标监测
- B. 危险因素监测和高危人群监测
- C. 耐药情况监测和抗菌药物监测
- D. 消毒灭菌效果监测和医护人员卫生习惯监测
- E. 危险因素监测和病原体监测

55. 需要预防性使用抗生素的是

- A. 脑脊液鼻漏者
- B. 甲状腺手术
- C. 疝修补术
- D. 扁桃体摘除术

E. 子宫肌瘤切除术

56. 凡医用器材中属于高度危险性物品的，必须选用

- A. 高效消毒法
- B. 中效消毒法
- C. 低效消毒法
- D. 灭菌法
- E. 机械清洗法

57. 正常菌群发生种类结构上的变化的现象属于

- A. 原位菌群失调
- B. 变异
- C. 定植
- D. 转移
- E. 移位菌群失调

58. 以下可以诊断为医院感染的是

- A. 患者入院 48 小时内发生的感染
- B. 皮肤黏膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现
- C. 新生儿在分娩过程中或产后获得的感染
- D. 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现
- E. 新生儿经胎盘获得的感染

59. 紫外线消毒，照射时间应在

- A. 10 分钟以上
- B. 20 分钟以上
- C. 30 分钟以上
- D. 40 分钟以上
- E. 50 分钟以上

60. 关于艾滋病的叙述，不正确的是

- A. HIV 对外界的抵抗力大于 HBV

B. HIV 感染者是主要传染源

C. 不能通过蚊虫叮咬传播

D. 共用剃刀可以传播

E. 人工受精也会感染

61. 下列选项中，不属于目标性监测方法的是

- A. 轮转监测
- B. 高危科室监测
- C. 综合性监测
- D. 暴发监测
- E. 其他监测

62. 因为抗生素使用不当，病人大肠内的铜绿假单胞菌转移到呼吸道定居，这种现象称

- A. 转移
- B. 共生
- C. 定植
- D. 定居
- E. 易位

63. 护士在接连进行治疗和操作时，每接触一位患者后，不正确的做法是

- A. 用肥皂和流动水洗手
- B. 用快速手消毒剂搓擦 2 分钟
- C. 用氧化电位水洗手消毒
- D. 使用避污纸
- E. 必要时戴一次性无菌手套

64. 戊型肝炎病毒主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 接触传播
- C. 体液传播
- D. 血液传播
- E. 呼吸道传播

65. 隔离的目的不包括

- A. 切断传播途径
- B. 治疗疾病
- C. 保护易感者
- D. 控制传染病
- E. 消灭感染源

66. 以下属于手卫生的是

- A. 外科手消毒
- B. 内科手消毒
- C. 隔离消毒
- D. 皮肤消毒
- E. 器官消毒

67. 表浅手术切口感染是指发生在手术后

- A. 10 天内
- B. 30 天内
- C. 60 天内
- D. 80 天内
- E. 100 天内

68. 患者，男，52 岁。脊髓外伤导致尿失禁，留置导尿 7 天，近日出现发热，尿液检出大量白细胞，患者最可能出现泌尿系

- A. 金黄色葡萄球菌感染
- B. 克雷伯杆菌感染
- C. 铜绿假单胞菌感染
- D. 溶血性链球菌感染
- E. 大肠埃希菌感染

69. B-D 实验用于常规检测的时间是

- A. 每日开始灭菌前
- B. 每日灭菌结束后
- C. 新安装的灭菌器
- D. 灭菌器维修后
- E. 每日下班前

70. 人体内的正常菌群大部分是

- A. 需氧菌
- B. 厌氧菌
- C. 寄生菌
- D. 杆菌
- E. 球菌

71. 医院感染监测中，查阅病例的重点对象不包括

- A. 细菌及真菌培养阳性的病人
- B. 长期使用免疫抑制剂的病人
- C. 接受过手术或侵入性操作的病人
- D. 恶性肿瘤和长期卧床的病人
- E. 女性和少数民族病人

72. 食用低盐饮食的方法预防动脉粥样硬化的措施属于

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 早期预防
- E. 中期预防

## 二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 韩女士，60 岁，1 型糖尿病，在参加医院举行的健康教育讲座时对于有关糖尿病

方面的知识特别关注，这是对信息的

- A. 选择性接受

- B. 选择性理解
- C. 选择性记忆
- D. 选择性应用
- E. 选择性遗忘

2. 李某，6 岁。总是不停地问妈妈“为什么”的问题，对周围的东西充满了好奇，喜欢表现自己。表示其正处在人生发展的

- A. 被动发展阶段
- B. 主动发展阶段
- C. 巩固发展阶段
- D. 自主发展阶段
- E. 晚年发展阶段

3. 病人，男，60 岁。平时脾气暴躁，常常因为别人的微小失误或无心得罪而大发雷霆，经常匆忙打断别人的讲话，并且语言带有明显的敌意。他的行为从致病性行为模式上来说，容易引发

- A. 胃癌
- B. 冠心病
- C. 胃溃疡
- D. 肠炎
- E. 甲亢

4. 护士告诉某新入院患者到放射科去做检查，但是忘了给申请单，也未告诉患者在哪儿做检查，导致患者在门诊耽误了很长时间，该护士的行为属于沟通障碍中的

- A. 目的不明，导致信息内容的不准确
- B. 表达模糊，导致信息传递错误
- C. 选择失误，导致信息误解的可能性增大
- D. 言行不当，导致信息理解错误
- E. 过度加工，导致信息的模糊或失真

5. 患者男性，65 岁。因肝癌住院，术后使

用头孢噻肟钠预防感染，第 5 天出现发热（39℃）、腹痛、腹泻。大便培养：真菌感染。此种情况最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 二重感染
- C. 菌群移位
- D. 阿米巴痢疾
- E. 急性肠炎

6. 女性，62 岁。行心脏介入治疗手术后，术后使用头孢噻肟钠和甲硝唑预防感染，第 5 天出现发热（39℃）、腹痛、腹泻，大便培养可见有大量白色念珠菌生长。此种情况最可能的诊断为

- A. 急性菌痢
- B. 急性肠炎
- C. 菌群交替症
- D. 败血症
- E. 菌群移位

7. 某儿科病房于 2017 年 10 月 3~10 日共收治患儿 60 例，其中新生儿病房 15 例，有 3 例发生轮状病毒感染，计算新生儿轮状病毒感染率为

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

8. 手术室某护士准备用 2% 戊二醛灭菌剂浸泡内镜，为达到防锈目的，该护士应该在戊二醛溶液里加入

- A. 0.2% 硝酸钾
- B. 0.3% 硝酸钾
- C. 0.5% 亚硝酸钠

- D. 0.2%亚硝酸钾
- E. 0.3%碳酸氢钠

9. 患者女性，30岁，急性呼吸道感染入院，体温39℃。患者应用抗生素后症状消失、体温恢复正常，继续使用抗生素的时间

- A. 症状消失即可停药
- B. 2~3天
- C. 3~4天
- D. 5~6天
- E. 6~7天

10. 某地医院收治1例炭疽病人，现对该病人产生的医疗废物进行处理，正确的做法是

- A. 消毒2小时后，深埋地下2米
- B. 焚烧处理
- C. 过氧化氢过氧乙酸熏蒸消毒
- D. 环氧乙烷消毒
- E. 置于双层黑色不透水塑料袋内

11. 患者，男，56岁。8个月前行二尖瓣置换术，目前局部有疼痛和压痛，有中等以上热度，从深部切口穿刺抽到脓液，影像学检查发现涉及深部切口脓肿，脓肿分泌物细菌培养阳性。诊断为

- A. 组织的排异反应
- B. 器官或腔隙感染
- C. 关节腔感染
- D. 表浅手术切口感染
- E. 深部手术切口感染

12. 某护士用紫外线灯对病房进行消毒，发现灯管灰尘较多，用酒精球擦拭后打开紫外线灯，此外室内温度17℃，湿度40%，照射20分钟后(开灯7分钟后计时)关灯。对该操作的判断是

- A. 错误，照射时间不够
- B. 正确
- C. 错误，计时方法不对
- D. 错误，照射前不能擦拭灯管
- E. 错误，不能用酒精擦拭灯管

### 三、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1. A. 时间因素
- B. 测试因素
- C. 回归因素
- D. 选择因素
- E. 失访

(1)“在某项健康教育的评价过程中，由于偶然因素，测试对象的某种特征水平过高，但在以后的测试中可能又恢复到原有实际水平。”此现象属于哪种偏倚因素

(2)“在某项健康教育的评价过程中，由于突发地震，从而影响评价效果。”此现象属于哪种偏倚因素

- 2. A. 咨询
- B. 交谈
- C. 劝服
- D. 指导
- E. 讨论

(1) 针对健康问题，答疑解惑，帮助服务对象澄清观念、做出决策的人际传播形式称为

(2) 通过与教育对象面对面的直接交流，传递健康信息和知识以帮助其改变相关态度的人际传播形式是

(3) 针对教育对象存在的健康问题，说服其改变不正确的健康态度、信念及行为习惯的人际传播形式是

(4) 通过向健康教育对象传授相关的知识和技术，使其学习、掌握自我保健的技能的人际传播形式是

3. A. 形成评价

B. 过程评价

C. 效应评价

D. 结局评价

E. 总结评价

(1) 通过查阅档案资料、目标人群调查和现场观察等方法完成的健康教育评价属于

(2) 对目标人群因健康教育项目所导致的相关行为及其影响因素的变化进行评价，属于健康教育评价中的

4. A. 被动发展阶段

B. 巩固发展阶段

C. 主动发展阶段

D. 自主发展阶段

E. 持续发展阶段

(1) 在人类行为的发展过程中 12 岁至成年阶段属于

(2) 好攻击、易激惹属于人类行为发展过程中的

(3) 成年后人的行为发展属于

5. A. 基础质量评价

B. 服务质量管理

C. 环节质量评价

D. 过程质量管理

E. 终末质量管理

(1) 一人一针一管执行率属于

(2) 对组织机构、设施、仪器设备的评价是

6. A. 卢因

B. 德鲁克

C. 法约尔

D. 西蒙

E. 梅奥

(1) 发现决定工作效率最重要的是人际关系和安全感，强调护理管理者要建立良好的关系的是

(2) 提出群体力学理论的心理学家是

(3) 对组织管理进行了系统地研究，被公认为“管理过程之父”的是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《专业知识》仿真密卷

### 一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 主动脉瓣关闭不全病人的首发症状是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 乏力、心悸
- C. 全心衰竭表现
- D. 心悸、头部强烈搏动感
- E. 身体下垂部位可凹性水肿

2. 伤寒最严重的并发症是

- A. 肠出血
- B. 肠穿孔
- C. 中毒性肝炎和中毒性心肌炎
- D. 中毒性脑病
- E. 溶血性尿毒综合征

3. 乙脑主要的死亡原因是

- A. 持续高热
- B. 惊厥
- C. 呼吸衰竭
- D. 脑疝
- E. 休克

4. 肝性脑病人最有意义的体征是

- A. 肌张力增高
- B. 腱反射亢进
- C. 踝阵挛阳性
- D. 扑翼样震颤
- E. 巴宾斯基征阳性

5. 急性心肌梗死病人最早和最突出的症状是

- A. 胸痛
- B. 休克
- C. 心律失常
- D. 胃肠道症状
- E. 充血性心力衰竭

6. 高血压病人并发脑出血的常见部位是

- A. 小脑
- B. 脑桥
- C. 间脑
- D. 大脑皮质
- E. 内囊及基底节

7. 急性肾盂肾炎病人一般不出现的临床表现是

- A. 血尿
- B. 贫血
- C. 肾区叩击痛
- D. 尿路刺激征
- E. 畏寒、发热

8. 支气管扩张病人的病变部位在肺下叶背部，体位引流时应采用的体位是

- A. 平卧位
- B. 俯卧位，腰部抬高

- C. 仰卧位，腰臀部抬高  
D. 左侧卧位，腰部抬高  
E. 右侧卧位，腰部抬高
9. 下列选项中，属于肺心病代偿期病人的特征是
- A. 肺动脉瓣区第二心音亢进  
B. 颈静脉怒张  
C. 腹水  
D. 心脏叩诊浊音界向右扩大  
E. 二尖瓣区舒张期杂音
10. 下列哪项是心脏骤停最可靠和迅速的判断依据
- A. 瞳孔对光反射消失  
B. 呼吸停止  
C. 心音消失  
D. 瞳孔散大  
E. 意识丧失和大动脉搏动消失
11. 系统性红斑狼疮的主要临床表现是
- A. 育龄女性多发  
B. 皮肤黏膜与关节表现  
C. 肾炎  
D. 浆膜炎  
E. 贫血
12. 有助于减轻肾病综合征病人尿蛋白的药物为
- A. 细胞毒药物  
B. 血小板解聚剂  
C. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI类)  
D. 免疫抑制剂  
E. 氨基糖苷类抗生素
13. 急性胰腺炎的主要表现和首发症状是
- A. 发热  
B. 恶心、呕吐及腹胀  
C. 腹痛  
D. 水、电解质及酸碱平衡紊乱  
E. 低血压
14. 肝性脑病最早的表现是
- A. 昏睡  
B. 性格和行为的改变  
C. 定向力障碍  
D. 扑翼样震颤  
E. 脑电图异常
15. 高位小肠梗阻病人，临床表现除腹痛外，最主要症状是
- A. 呕吐频繁  
B. 腹胀明显  
C. 叩诊呈鼓音  
D. 停止排便排气  
E. 腹部包块
16. 血栓闭塞性脉管炎病人的早期症状主要有
- A. 小腿和足部酸痛  
B. 游走性静脉炎  
C. 患肢萎缩  
D. 静息痛  
E. 间歇性跛行
17. 神经根型颈椎病的病人多见的体征是
- A. Thomas 征(+)  
B. 臂丛牵拉试验(+)  
C. 拾物试验(+)  
D. 直腿抬高试验(+)  
E. “4”字征(+)
18. 颅前窝骨折的病人最易伤及
- A. 展神经

- B. 嗅神经  
C. 面神经  
D. 听神经  
E. 滑车神经
19. 原发性肝癌病人最常见的早期临床表现是  
A. 肝区持续性疼痛  
B. 肝脏进行性肿大  
C. 进行性黄疸  
D. 腹水  
E. 上消化道出血
20. 颅内动静脉畸形最常见的症状是  
A. 出血  
B. 癫痫  
C. 精神症状  
D. 头痛  
E. 偏瘫
21. 腰椎间盘突出症的主要症状是  
A. 腰痛  
B. 腰和臀部痛  
C. 腰和大腿前方痛  
D. 坐骨神经痛  
E. 腰痛伴坐骨神经痛
22. 肛裂患者肛门疼痛的特点是  
A. 疼痛为隐痛  
B. 排便前出现括约肌挛缩痛  
C. 排便后出现肛门隐痛可延续到数小时  
D. 排便时与排便后疼痛之间有间歇期  
E. 疼痛无规律
23. 颅内肿瘤病人最常见的共有表现是  
A. 意识障碍  
B. 癫痫  
C. 颅内压增高  
D. 运动障碍  
E. 视力障碍
24. Reynolds 五联征是指  
A. 腹痛腹胀、寒战高热、恶心呕吐、腹泻、黄疸  
B. 腹痛腹胀、恶心呕吐、昏迷、黄疸、胸背部胀痛  
C. 剧烈腹痛、寒战高热、恶心呕吐、精神症状、黄疸  
D. 腹痛腹胀、寒战高热、黄疸、休克、精神症状  
E. 剧烈腹痛、恶心呕吐、黄疸、腹泻、精神症状
25. 小脑幕切迹疝瞳孔变化特点是  
A. 伤后一侧瞳孔立即散大  
B. 同侧瞳孔进行性散大  
C. 双侧瞳孔大小多变  
D. 对侧瞳孔散大  
E. 双侧瞳孔不等圆
26. 骨折和脱位共有的特殊体征是  
A. 异常活动  
B. 弹性固定  
C. 骨擦音  
D. 畸形  
E. 正常关节部位空虚感
27. 子宫内膜癌病人最典型的临床表现是  
A. 下腹及腰骶部疼痛  
B. 贫血、消瘦、恶病质  
C. 绝经后不规则阴道流血  
D. 白带增多伴阴部痒  
E. 下腹部可触及包块

28. 下列选项中，符合妊娠合并心脏病的病人在妊娠期易发生心力衰竭的时间是

- A. 孕 20~24 周
- B. 孕 25~30 周
- C. 孕 32~34 周
- D. 孕 35~36 周
- E. 孕 37~39 周

29. 下列选项中，属于绒毛膜癌病人的处理原则

- A. 进行放疗
- B. 同位素治疗
- C. 子宫切除
- D. 以化疗为主
- E. 子宫及附件切除

30. 硫酸镁治疗重度妊娠高血压综合征的药理作用是

- A. 降压
- B. 解痉
- C. 利尿
- D. 镇静
- E. 扩容

31. 产程进展的标志为

- A. 宫缩强度
- B. 宫缩频度
- C. 产妇一般情况
- D. 胎头下降及宫口的扩张
- E. 胎儿心率及胎位

32. 妊娠合并心脏病的孕妇，临产时的处理不正确的是

- A. 临产用抗生素，至产后 1 周
- B. 可适当用镇静药
- C. 常规不使用洋地黄预防心力衰竭
- D. 尽量缩短产程

E. 产后出血较多时应尽量避免输血

33. 新生儿 Apgar 评分指标不包括

- A. 心率
- B. 体温
- C. 呼吸
- D. 皮肤颜色
- E. 喉反射

34. 正式临产的标志是

- A. 见红
- B. 胎膜早破
- C. 下腹隐痛
- D. 有规律的子宫收缩
- E. 先露入盆

35. 下列哪项不是子痫前期的标志

- A. 血压  $\geq 160/100$ mmHg
- B. 24 小时尿蛋白定量  $\geq 3.0$ g
- C. 头痛，视觉障碍
- D. 频繁抽搐
- E. 眼底动脉痉挛伴有视网膜水肿

36. 维生素 D 缺乏性佝偻病在早期的临床表现主要是

- A. 睡眠不安、多汗、枕秃
- B. 颅骨软化
- C. 方颅
- D. 前囟晚闭
- E. 出牙延迟

37. 急性感染性喉炎患儿的咳嗽的特点是

- A. 喘息性咳嗽
- B. 阵发性咳嗽
- C. 刺激性干咳
- D. 犬吠样咳嗽
- E. 高音调金属音

38. 小儿急性上呼吸道感染时易并发中耳炎的原因是

- A. 耳咽管较窄、长，呈斜位
- B. 耳咽管易充血水肿
- C. 咽鼓管较宽、短，呈水平位
- D. 耳咽管淋巴组织丰富
- E. 小儿免疫力低下

39. 新生儿窒息时，护士应首选的复苏措施是

- A. 吸氧
- B. 静注肾上腺素
- C. 复苏气囊加压给氧
- D. 清除呼吸道黏液
- E. 肌注尼可刹米

40. 《传染病法》规定：乙类传染病的上报时间是发病后

- A. 6 小时内
- B. 12 小时内
- C. 24 小时内
- D. 36 小时内

## 二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 某糖尿病酮症酸中毒病人，突然意识丧失，呼之不醒，护士在眶上加压，病人有皱眉及上肢活动等反应，其意识障碍属于

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊

2. 病人，男，70 岁。独居，冬天生有煤炉

E. 48 小时内

41. 急性坏死性小肠结肠炎的首发症状是

- A. 腹痛
- B. 休克
- C. 高热
- D. 脱水
- E. 烦渴

42. 新生儿颅内出血的治疗原则错误的是

- A. 降低颅内压
- B. 指导患儿下床活动
- C. 保持安静，避免刺激
- D. 止血
- E. 控制惊厥

43. 风湿热的临床主要表现不包括

- A. 关节炎
- B. 舞蹈病
- C. 心脏炎
- D. 皮下小结、环形红斑
- E. 稽留热

取暖，邻居发现其神志不清，面色潮红，口唇呈樱桃色，大汗，应考虑病人出现

- A. 有机磷农药中毒
- B. 一氧化碳中毒
- C. 安眠药中毒
- D. 乐果中毒
- E. 低血糖昏迷

3. 患者女性，39 岁，既往体健，近 1 月来发现记忆力减退、反应迟钝、乏力、畏寒，

住院检查：体温 35℃，心率 60 次/分，黏液水肿，血清 TSH 升高，血 FT4 降低，可能的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 甲状腺功能减退
- C. 呆小症
- D. 痴呆
- E. 幼年型甲减

4. 患者女，65 岁。结核病史 10 年，未接受正规治疗，X 线胸片示右上肺 3.5cm 大小球形病灶，内有 2cm 大小的空洞，两下肺散在钙化灶。最可能的诊断是

- A. 浸润型肺结核
- B. 结核球
- C. 慢性血行播散性肺结核
- D. 纤维空洞型肺结核
- E. 慢性肺脓肿

5. 病人，女，32 岁。经前乳房胀痛并出现肿块，经后自行消退，应考虑为

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺肉瘤
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳管内乳头状瘤

6. 病人，男，28 岁。大面积烧伤后，突然出现寒战、高热，体温 40~41℃，每日波动在 0.5~1.0℃，血细菌培养阳性，首先应考虑的是

- A. 脓毒症
- B. 菌血症
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 脓毒血症
- E. 破伤风

7. 患者男，40 岁，肛门左侧皮肤间断破溃流脓 2 年，体检肛门左侧 3 厘米处有一乳头状突起，有少量脓液流出，直肠指检可触及一条索状物，考虑可能是

- A. 肛周脓肿
- B. 肛瘘
- C. 外痔
- D. 肛裂
- E. 直肠癌

8. 患者男，65 岁。进行性吞咽困难 2 个月，病检报告示食管鳞状细胞癌。行食管癌根治术后第 4 天出现胸闷、呼吸困难，血白细胞  $14 \times 10^9/L$ 。该患者最可能发生了

- A. 坠积性肺炎
- B. 肺不张
- C. 吻合口瘘
- D. 乳糜胸
- E. 急性肺水肿

9. 患者，女性，34 岁。月经不调，婚后数年未育。体检“满月脸”、面部有痤疮，“水牛背”、呈向心性肥胖、体毛浓密。首先考虑该患者为

- A. 内分泌紊乱
- B. 肥胖
- C. 皮质醇症
- D. 性功能紊乱
- E. 不孕症

10. 某孕妇进行产前检查，其末次月经第 1 日是公历 2007 年 8 月 20 日，则其预产期是

- A. 2008 年 5 月 24 日
- B. 2008 年 5 月 27 日
- C. 2008 年 6 月 29 日
- D. 2008 年 5 月 11 日

E. 2008 年 6 月 20 日

11. 患者女，足月临产，LOA，宫口开 3cm，胎心 30 秒/5 分，胎膜未破，遵医嘱予静滴缩宫素加强宫缩，3 小时后感肛门坠胀，胎膜自然破裂，流出棕黄色羊水，查体：宫口开全，S<sup>+3</sup>，下列不正确的是

- A. 立即吸氧
- B. 左侧卧位，即听胎心
- C. 立刻停止使用缩宫素
- D. 胎头吸引产钳助产
- E. 剖宫产

12. 患者，女性，32 岁。孕 1 产 0，孕 39 周，规律宫缩 8 小时，近 50 分钟宫缩时腹痛剧烈，宫底部收缩不强而中段或下段强，间歇期子宫放松不佳，胎心 160 次/分，宫口开大 5cm，先露头 S<sup>-1</sup>。该患者可诊断为

- A. 持续性枕后位
- B. 先兆子宫破裂
- C. 子宫痉挛性狭窄环
- D. 不协调性子宫收缩乏力
- E. 宫颈扩张活跃期停滞

13. 某孕妇临产 12 小时，胎心 170 次/分，S<sup>+2</sup>，胎膜尚未破，肉眼可见羊水混浊。此时应采取的措施是

- A. 产钳助产
- B. 胎头吸引助产
- C. 待其自然分娩
- D. 人工破膜
- E. 立即剖宫产

14. 患儿女，11 岁，患 1 型糖尿病，近日因肺部感染诱发酮症酸中毒。特征性的临床症状是

- A. 多饮多尿
- B. 呼气烂苹果味
- C. 皮肤干燥，弹性差
- D. 呼吸深大
- E. 昏迷

15. 患儿男，5 岁。2 周前有上呼吸道感染，近 3 日晨起出现眼睑水肿，浓茶色尿，诊断为急性肾小球肾炎。1 日后测得患儿 24 小时尿量 200ml，尿蛋白(++)，血钾 5.6mmol/L。此时应当注意预防患儿出现

- A. 严重水肿
- B. 低蛋白血症
- C. 大量蛋白尿
- D. 脑水肿
- E. 急性肾衰竭

16. 5 岁女孩，颜面四肢轻度浮肿 2 月，血压 120/80mmHg，查尿常规：蛋白(+++)，红细胞 15 个/HP，血总蛋白 40g/L，白蛋白 25g/L。该患儿最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 单纯性肾病综合征
- D. 肾炎性肾病综合征
- E. 急进性肾炎

17. 10 个月小儿患化脓性脑膜炎，脑脊液培养为脑膜炎双球菌，首选的药物是

- A. 青霉素
- B. 磺胺嘧啶钠
- C. 氯霉素
- D. 庆大霉素
- E. 红霉素

18. 1 岁半小儿，烦躁易哭，前囟未闭，方颅、鸡胸、“O”型腿，血钙低，血磷低，钙

磷乘积 $<30$ ，碱性磷酸酶 20 菩氏单位，诊断为

- A. 佝偻病早期
- B. 佝偻病激期

- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 以上都不是

### 三、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1. 女，65 岁，风湿性心脏瓣膜病，近 1 周来，腹胀、食欲减退、恶心，出现双下肢水肿，颈静脉充盈、怒张。

(1) 根据上述临床表现，病人最可能是出现了

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 慢性左心衰竭
- E. 慢性右心衰竭

(2) 以下对该病人的治疗，不妥的是

- A. 休息，避免精神刺激和情绪紧张
- B. 控制钠盐的摄入
- C. 使用利尿剂
- D. 使用血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)
- E. 使用吗啡

2. 病人，女，22 岁。多饮、多尿、消瘦 2 个月，空腹血糖 8.0mmol/L。

(1) 午饭前病人主诉头晕、乏力、心慌、躁动，护士应立即检查的项目是

- A. 尿糖
- B. 电解质
- C. 头颅 CT
- D. 原酮体
- E. 血糖

(2) 下列选项中，可以鉴别 1 型和 2 型糖尿病最有意义的指标是

- A. 胰岛 B 细胞分泌功能

- B. 血糖的高低
- C. 是否肥胖
- D. 年龄大小
- E. 胰岛细胞抗体

3. 病人，女，75 岁。既往有慢性阻塞性肺疾病病史。最近出现咳嗽、咳脓痰伴气急加重 1 周，今晨神志恍惚。查体：嗜睡，口唇发绀，两肺湿啰音，心率 118 次/分，血压 185/105mmHg。

(1) 该病人最可能的诊断是

- A. 急性左心衰
- B. 脑血管意外
- C. 右心衰竭
- D. 高血压危象
- E. 呼吸衰竭

(2) 为明确病人的诊断，还需做

- A. CT
- B. 心电图
- C. X 线检查
- D. 脑电图
- E. 动脉血气分析

(3) 此时最主要的治疗原则是

- A. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
- B. 使用抗生素
- C. 去除诱因
- D. 用降压药
- E. 用利尿剂

4. 病人，女，76 岁，既往患有风心病病史 25 年，高血压史 20 年，心房颤动 10 年，吸烟 40 年，10 根/天。近日因天气寒冷、房颤诱发心衰而入院接受治疗。今日卧床休息时，突然出现肢体抽搐、偏盲，意识模糊，半小时后右侧肢体完全呈弛缓性瘫痪状态，且出现严重感觉障碍，并伴失语。

(1) 该病人目前的病情最有可能是

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 短暂性脑缺血发作

(2) 该病人本次发病的最主要的病因是

- A. 高血压
- B. 心衰
- C. 心房颤动
- D. 吸烟
- E. 高脂血症

(3) 下列选项中，关于该患者的治疗原则，错误的是

- A. 积极治疗风心病
- B. 积极控制心衰
- C. 防治脑水肿
- D. 应用钙离子通道阻断剂
- E. 积极抗凝治疗

(4) 为病人提供的护理措施中，不正确的是

- A. 密切观察病人生命体征、意识状态、皮肤黏膜情况等
- B. 用热水袋给患者取暖
- C. 指导病人早期进行活动
- D. 保持患肢关节功能位置
- E. 指导病人避免各种诱因

5. 患者男，21 岁。半小时前不慎自 10m 高处坠下，右胸部首先撞至砖墙上，即感气短、呼吸困难，外伤后无昏迷、头痛及呕

吐，无腹痛及小便失禁。查体：P110 次/分，BP12.0/9.1 kPa (90/68mmHg)。气管左移明显，右侧胸部饱满，肋间饱满增宽，未见局部软化浮动现象，右侧触觉语颤及呼吸动度消失，呼吸音消失，左胸未见明显异常。

(1) 本病例初步诊断为

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 少量血胸
- E. 多根多处肋骨骨折

(2) 对协助诊断最有意义的辅助检查是

- A. B 超
- B. CT
- C. MBI
- D. X 线片
- E. 血常规

(3) 最主要的处理措施是

- A. 吸氧
- B. 静脉输液
- C. 输血
- D. 排气减压
- E. 剖胸探查手术

6. 女，35 岁，既往胆囊结石，一日参加同学聚会后出现上腹痛，刀割样疼痛，向左肩及两侧腰背部放射，伴有恶心呕吐，体温 38.5℃，急诊入院，血清淀粉酶 400 苏氏 (Somogyi) 单位。

(1) 根据上述症状，病人最可能出现了

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胃炎
- D. 急性肠炎
- E. 急性化脓性胆管炎

(2) 下列选项中，提示病人病情严重，预后

差的是

- A. 体温 38.0℃
- B. 呕吐粪样物
- C. 手足抽搐
- D. 尿淀粉酶增高
- E. 血清脂肪酶增高

(3)以下治疗措施不正确的是

- A. 单独使用吗啡止痛
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 给予抗胆碱药物
- E. 针刺治疗

7. 男, 45 岁, 大货车司机, 排便时出现无痛性出血, 呈喷射状, 有肿物脱出, 但便后可自行回纳。

(1)根据上述临床表现, 病人最可能出现了

- A. 肛瘘
- B. 肛裂
- C. 内痔
- D. 外痔
- E. 混合痔

(2)病人病情分期为

- A. I 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. IV 期
- E. V 期

8. 男, 23 岁, 夏季在外作业, 高温曝晒, 出现高热, 口渴, 黏膜干燥, 眼窝凹陷, 确诊为高渗性脱水。

(1)该病人的血清钠应高于

- A. 140mmol/L
- B. 145mmol/L
- C. 150mmol/L
- D. 155mmol/L

E. 160mmol/L

(2)若病人出现烦躁不安、躁动、幻觉等神经精神症状, 其脱水程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 危重度

(3)病人出现昏迷, 此时应静脉滴注

- A. 5%葡萄糖液
- B. 10%葡萄糖液
- C. 5%葡萄糖酸钙溶液
- D. 10%葡萄糖盐溶液
- E. 平衡盐溶液

9. 女, 45 岁。烧伤后 2 小时入院。患者疼痛剧烈, 口渴。心率 145 次/分, 血压 85/55mmHg, 头、面、颈、躯干部布满大小不等的水疱, 创面潮红, 双上肢呈焦黄色, 无水疱。

(1)该患者的烧伤总面积估计为

- A. 62%
- B. 56%
- C. 53%
- D. 50%
- E. 40%

(2)该患者Ⅲ度烧伤面积为

- A. 18%
- B. 28%
- C. 35%
- D. 36%
- E. 49%

10. 患者, 男性, 67 岁。上腹部不适及隐痛半年, 近日食欲减退, 消瘦乏力, 皮肤黄染来院就医。

(1)为了明确诊断不适宜的检查为

- A. 血清胆红素
- B. 血尿酸淀粉酶
- C. CT 检查
- D. 内镜逆行胰胆管造影
- E. 细胞学检查

(2) 患者血清胆红素  $>30\mu\text{mol/L}$ ，B 超示胆囊肿大，胰管扩张，此患者最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 胆总管下端结石
- D. 胰腺癌
- E. 胆囊癌

(3) 对于晚期胰腺癌患者主要治疗手段是

- A. 全胰切除术
- B. 胰头十二指肠切除术
- C. 放疗
- D. 化疗
- E. 不能切除的胰腺癌的转流术

11. 女，45 岁，已婚，有糖尿病病史，近日发现外阴瘙痒、白带增多。检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑。

(1) 可能诊断为

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 非特异性阴道炎

(2) 为确定诊断，进一步应检查

- A. 双合诊
- B. 尿常规
- C. 阴道窥器检查
- D. 阴道分泌物悬滴检查
- E. 宫颈黏液检查

(3) 如镜检有假菌丝，首选药物是

- A. 广谱抗生素
- B. 制霉菌素
- C. 甲硝唑
- D. 黄体酮
- E. 己烯雌酚

(4) 局部用哪种溶液冲洗最好

- A. 1% 乳酸
- B. 2%~4% 碳酸氢钠
- C. 0.2% 苯扎溴铵
- D. 1:5000 高锰酸钾
- E. 生理盐水

12. 某孕妇妊娠 35 周，在乘坐的公共汽车急刹车后突感剧烈腹痛难忍。血压 140/105mmHg。检查：阴道无流血，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，胎位不清，胎心率约 90 次/分。

(1) 该孕妇最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 前置胎盘
- C. 妊娠期高血压疾病
- D. 胎盘早期剥离
- E. 不完全性子宫破裂

(2) 对该孕妇的正确处理是

- A. 及时终止妊娠
- B. 期待疗法
- C. 积极降压治疗
- D. 及时抑制宫缩
- E. 积极补充血容量

13. 男，1 岁，出现不明原因的发热，体温  $39^{\circ}\text{C}$ ，入院治疗，持续 1 周，抗生素治疗无效，全身有荨麻疹样皮疹，手足皮肤有硬性水肿，舌乳头突起呈“杨梅舌”，单侧颈部淋巴结肿大。

(1) 根据上述症状，判断病人出现了

- A. 风湿热

- B. 猩红热
- C. 幼年特发性关节炎
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 皮肤黏膜淋巴结综合征

(2) 该疾病的主要死亡原因是

- A. 心力衰竭
- B. 心肌梗死
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

14. 男，4岁，外出春游后出现皮肤紫癜，集中在下肢及臀部，对称分布，入院途中突发腹痛，位于脐周，伴有呕吐，检查：毛细血管脆性试验阳性，外周血白细胞轻度增高，嗜酸性粒细胞增多，血小板计数正常。

(1) 该患儿最可能出现了

- A. 白血病
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 幼年特发性关节炎

(2) 对该患儿最有效的药物是

- A. 卡巴克洛
- B. 阿司匹林
- C. 环磷酰胺
- D. 肾上腺皮质激素
- E. 免疫球蛋白

15. 男，3岁，因肺炎入院，现在出现呼吸困难加重，呼吸 70 次/分，烦躁不安，面色苍白，心率 175 次/分，心音低钝。

(1) 该患儿最可能并发了

- A. 心肌炎
- B. 脑水肿
- C. 中毒性肠麻痹
- D. 脓胸
- E. 心力衰竭

(2) 在治疗过程中，患儿突然口吐粉红色泡沫痰，给予患儿酒精湿化吸氧，其酒精湿化的浓度为

- A. 10%~20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 40%~50%
- E. >50%

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《专业实践能力》仿真密卷

### 一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列哪项是类风湿关节炎消炎止痛的首选药物

- A. 中成药
- B. 抗胆碱能药
- C. 非甾体抗炎药
- D. 慢作用抗风湿药
- E. 肾上腺糖皮质激素

2. 下列哪项是急性肾小球肾炎水肿期的最适宜的饮食

- A. 无盐、高糖、高蛋白
- B. 低盐、高糖、高蛋白
- C. 低盐、高糖、低蛋白
- D. 无盐、高糖、低蛋白
- E. 低盐、普通饭

3. 下列关于急性肾小球肾炎急性期症状明显者应卧床休息的时间是

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 4~6 周
- D. 7~8 周
- E. 9~10 周

4. 某下肢瘫痪的病人，经查肢体可在床面移动，但不能自行抬起，此肌力应判断为

- A. 0 级

B. 1 级

C. 2 级

D. 3 级

E. 4 级

5. 下列哪项是预防急性胰腺炎最重要的护理措施

- A. 注意饮食卫生
- B. 经常应用抗生素
- C. 防治胆道疾病
- D. 控制糖尿病
- E. 经常服用消化酶类药物

6. 下列关于慢性阻塞性肺气肿病人恢复期需长期家庭氧疗的指征，应除外的是

- A.  $\text{PaO}_2 52\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 54\text{mmHg}$
- B.  $\text{PaO}_2 52\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
- C.  $\text{SaO}_2 90\%$ ,  $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$
- D.  $\text{PaO}_2 58\text{mmHg}$ , 有肺动脉高压
- E.  $\text{PaO}_2 58\text{mmHg}$ , 有心力衰竭、水肿

7. 护理人员给心力衰竭病人发放地高辛之前，应先数心率，若心率低于多少时应暂停给药

- A. 60 次/分
- B. 70 次/分
- C. 80 次/分

- D. 90 次/分
- E. 100 次/分

8. 下列哪项是白血病化疗期间口服别嘌醇的目的

- A. 抑制尿素合成
- B. 加强化疗药的疗效
- C. 抑制尿酸合成
- D. 加强尿酸的排泄
- E. 加强尿素的排泄

9. 一氧化碳中毒吸氧浓度为

- A. 8~10L/min
- B. 4~6L/min
- C. 2~4L/min
- D. 1~3L/min
- E. 1~2L/min

10. 肝性脑病患者的护理措施中，最重要的环节是

- A. 加强安全措施
- B. 去除和避免一切诱发因素
- C. 注意休息
- D. 合理饮食
- E. 密切观察病情变化

11. 急性心肌炎病人，反复出现阿-斯综合征，心电图示三度房室传导阻滞，最恰当的处理是

- A. 静滴异丙肾上腺素
- B. 静滴阿托品
- C. 静滴硝酸甘油
- D. 安置人工心脏起搏器
- E. 静滴肾上腺素

12. 中暑使用氯丙嗪降温时，应注意观察

- A. 瞳孔
- B. 血氧
- C. 血压
- D. 过敏
- E. 出血

13. 肝昏迷病人灌肠或导泻时应禁用

- A. 25%硫酸镁
- B. 生理盐水
- C. 弱酸溶液
- D. 肥皂水
- E. 乳果糖加水

14. 关于晨僵的护理措施叙述正确的是

- A. 睡眠时使用弹力手套保暖
- B. 起床后用热水、冷水交替浸泡僵硬的关节
- C. 起床后可行冷水浴
- D. 减少关节的活动
- E. 避免做任何家务

15. 急性胰腺炎病人，为减轻疼痛，护士可协助其采取的卧位是

- A. 俯卧
- B. 去枕平卧
- C. 头低脚高
- D. 屈膝侧卧
- E. 半坐卧位

16. 肾功能不全患者在使用 ACEI 时要特别注意监测

- A. 磷代谢异常
- B. 低血钙
- C. 高血钙
- D. 低血钾
- E. 高血钾

17. 下列哪项是腰椎间盘突出症患者手术后第一天进行直腿抬高练习的目的是为了预防

- A. 肌肉萎缩
- B. 水肿形成
- C. 骨质疏松
- D. 伤口感染
- E. 神经根粘连

18. 下列关于血栓闭塞性脉管炎患者护理措施的描述，错误的是

- A. 绝对戒烟
- B. 患肢避免受寒
- C. 保证局部清洁
- D. 患肢用热水袋保暖
- E. 防止患肢外伤

19. 下列哪项是经皮肝穿刺胆管造影前注射维生素 K 的主要目的

- A. 防止胆绞痛
- B. 防止胆汁漏
- C. 预防腹膜炎
- D. 预防感染
- E. 预防出血

20. 当患者的神志丧失，诊断心搏骤停的指标是

- A. 呼吸停止
- B. 瞳孔散大
- C. 脉搏扪不清
- D. 血压测不到
- E. 大动脉波动消失

21. 急性脑疝病人首要的治疗是

- A. 急诊手术

B. 低温冬眠

C. 静脉输入高渗脱水剂

D. 静脉输入抗生素

E. 腰椎穿刺引流脑脊液

22. 成人呼吸心跳骤停，单人心脏复苏，心脏按压与人工呼吸之比是

- A. 7: 1
- B. 10: 1
- C. 30: 2
- D. 15: 2
- E. 5: 1

23. 改善血栓闭塞性脉管炎病人肢体血液循环的措施不包括

- A. 禁忌吸烟
- B. 肢体保暖
- C. 勃格运动
- D. 肌肉注射吗啡
- E. 使用扩血管药物

24. 乳房自我检查最好在月经后

- A. 1~2 天
- B. 3~4 天
- C. 2~3 天
- D. 7~10 天
- E. 11~12 天

25. 行开颅手术后病人出现脑脊液鼻漏，正确的处理方法是

- A. 头低位
- B. 用无菌棉球阻塞鼻孔
- C. 用无菌生理盐水冲洗
- D. 避免用力咳嗽、打喷嚏
- E. 用氯霉素眼药水滴鼻

26. 脊柱骨折患者的急救运送方法正确的是
- A. 一人背负搬运  
B. 一人抱持搬运  
C. 二人抱持搬运  
D. 用软担架搬运  
E. 三人平托放于硬板搬运
27. 下列关于侵蚀性葡萄胎治疗原则的描述，不正确的是
- A. 化疗为主要治疗手段  
B. 手术切除子宫辅以化疗  
C. 化疗原则为治愈后再巩固 2 个疗程  
D. 手术原则是切除残存或耐药病灶  
E. 转移灶有大出血时行手术治疗
28. 对于胎膜早破，胎先露尚未衔接的孕妇，下列护理中不妥的是
- A. 绝对卧床休息  
B. 观察羊水情况  
C. 监测胎心  
D. 指导孕妇自测胎动  
E. 头高足低位
29. 关于急性乳腺炎预防，下列哪项是错误的
- A. 避免积乳  
B. 防止乳头外伤  
C. 纠正乳头凹陷  
D. 保持正确的哺乳方法，清洗乳头  
E. 预防性使用抗菌药物
30. 对外阴炎患者的护理，错误的是
- A. 为促进炎症尽快吸收，应给予高浓度的溶液坐浴  
B. 坐浴液的水温一般在 41~43℃ 左右  
C. 禁食辛辣刺激食物  
D. 严禁搔抓局部皮肤  
E. 月经期不予以局部坐浴
31. 胎膜早破，胎先露尚未衔接者，护理中错误的是
- A. 绝对卧床休息  
B. 头高足低位  
C. 监测胎心  
D. 指导孕妇自测胎动  
E. 观察羊水情况
32. 关于羊水栓塞的产科处理，正确的是
- A. 羊膜腔穿刺过程中发生羊水栓塞时可继续手术  
B. 第一产程发病者可考虑待产等待自然分娩  
C. 第二产程发病者可根据情况行阴道助产手术结束分娩  
D. 若患者子宫出血无法控制仍可考虑保留子宫  
E. 发生羊水栓塞时若正在滴注缩宫素可继续进行
33. 关于猩红热患儿的护理措施，错误的叙述是
- A. 急性期患儿绝对卧床休息  
B. 高热时可予以酒精擦浴  
C. 提供充足水分  
D. 及早使用青霉素 G  
E. 复方硼砂溶液漱口
34. 为新生窒息患儿建立静脉通路，首选
- A. 手背静脉  
B. 足背静脉  
C. 头皮静脉  
D. 脐静脉

E. 贵要静脉

35. 光照疗法的叙述错误的是

- A. 给患儿带黑色眼罩，保护视网膜
- B. 采用单面照射时，患儿应每 4 小时翻身 1 次
- C. 光疗前清洁、消毒光疗箱
- D. 调节箱温至 30~32℃，湿度 55%~65%
- E. 一般采用光亮度约 150~300W 的蓝色荧光

36. 关于小儿感知的发育，其中属于人对事物各种属性的综合反映是

- A. 皮肤感觉
- B. 知觉
- C. 视觉
- D. 听觉
- E. 味觉和嗅觉

37. 化脓性脑膜炎腰椎穿刺后让患儿去枕平卧

## 二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者男，14 岁。患 1 型糖尿病多年，近日因血糖控制不理想，胰岛素用量每餐增加 2U。患者自述注射胰岛素后 4~5 小时，有头晕、心悸、软多汗、软弱无力感。此时，该患者最可能出现了

- A. 过敏反应
- B. 心律失常
- C. 自主神经紊乱
- D. 低血糖反应
- E. 虚脱

A. 2 小时

B. 5 小时

C. 6 小时

D. 10 小时

E. 24 小时

38. 重症寒冷损伤综合征患儿恢复正常体温所用的时间为

- A. 越快越好
- B. 3~4h
- C. 6~12h
- D. 12~24h
- E. 24~48h

39. 冬眠低温疗法肛温降至的适宜度数为

- A. 28~31℃
- B. 31~34℃
- C. 32~35℃
- D. 25~31℃
- E. 35℃左右

2. 患者，女性，25 岁，小腿紫癜 1 周余。2 周前因受凉出现上呼吸道感染，自服“感冒冲剂”后出现腹痛、腹泻及便血。次日双侧膝关节以下出现散在性紫癜。血小板  $160 \times 10^9/L$ ，尿蛋白 (+)，红细胞 10~20 个/HP，白细胞 5~10 个/HP，颗粒管型 1~2 个/HP。考虑患者可能为过敏性紫癜，护士对患者进行健康教育，其内容应除外

- A. 帮助患者寻找致病因素
- B. 急性期卧床休息
- C. 避免接触致敏原

- D. 让患者学会自我观察  
E. 补充优质蛋白，如鱼、虾、蟹等
3. 某患者既往曾有肾小球肾炎史，因病情稳定而坚持上班工作。近日，在单位体检时发现血压升高，来医院复查，证实为慢性肾小球肾炎急性发作。为迅速而有效地缓解症状，你考虑下列哪项措施最佳
- A. 卧床休息  
B. 低盐饮食  
C. 利尿降压  
D. 激素疗法  
E. 中医疗法
4. 患者，男性，21 岁。用燃气热水器淋浴时出现头痛，头晕，无力、胸闷，心悸、恶心等症状。现场护士首要的抢救措施是
- A. 穿上衣物，注意保暖  
B. 卧床休息  
C. 保持呼吸道通畅  
D. 吸氧  
E. 立即将患者搬离淋浴室至空气新鲜处
5. 患者男，29 岁。腹部被刀扎伤后，有少量肠管脱出，现场正确的处理原则是
- A. 立即送回腹腔  
B. 用清洁碗覆盖后再包扎  
C. 用无菌溶液冲洗后送回腹腔  
D. 用等渗盐水冲洗后敷料包扎  
E. 用清洁敷料覆盖
6. 患者男，21 岁。从 3m 高处跌下骑跨于木杆上，经检查阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血，应考虑为
- A. 会阴部挫伤  
B. 下腹部挫伤

- C. 前尿道损伤  
D. 后尿道损伤  
E. 膀胱损伤
7. 患者女，59 岁。外伤性肠穿孔修补术后第 2 天，腹胀明显，肠蠕动未恢复，目前最重要的处理措施是
- A. 胃肠减压  
B. 禁食、输液  
C. 肛管排气  
D. 半坐卧位  
E. 针刺穴位
8. 患者男，18 岁。从楼上摔下，当即出现意识不清，约 11 分钟后清醒，有轻度呕吐，头痛，并有逆行性遗忘。该患者可能发生了
- A. 硬膜下血肿  
B. 脑震荡  
C. 硬膜外血肿  
D. 脑挫裂伤  
E. 脑干损伤
9. 患者男，27 岁。右腰部被扭伤 2 小时来院急诊。右腰部疼痛、肿胀，有淡红色血尿排出。生命体征稳定，诊断为右肾挫伤。应采取的护理措施不包括
- A. 绝对卧床休息  
B. 输液、使用止血药  
C. 按医嘱应用抗生素  
D. 血尿消失即可下床活动  
E. 做好术前准备
10. 甲亢病人行甲状腺大部切除术后 24 小时，出现烦躁不安，高热大汗，测体温 39℃，脉搏 120 次/分，血压 120/70mmHg。

切口无渗血，引流管流出 30ml 淡血性液。

首先考虑的并发症是

- A. 喉头水肿
- B. 切口内血肿形成
- C. 甲状旁腺损伤
- D. 甲状腺危象
- E. 气管塌陷

11. 患者，男，52 岁。左肺根治性手术后当日胸管引流 50ml 血性液，次日胸管内突然引流出暗红色液 100ml，患者心率血压无明显改变。以下说法正确的是

- A. 活动性出血
- B. 陈旧性出血
- C. 切口裂开
- D. 切口渗血
- E. 缝线脱落

12. 某初产妇，32 岁，因胎儿宫内窘迫行低位产钳助产术娩出一活婴。产后 3 天诉会阴部疼痛难忍。查体：会阴部肿胀，左侧切口红肿、有触痛，以下处理错误的是

- A. 1:500 高锰酸钾液坐浴
- B. 50% 硫酸镁湿敷切口
- C. 每日冲洗外阴
- D. 取健侧卧位
- E. 红外线照射

13. 患者，女，G2P1，现妊娠 36 周，出现腹痛、阴道流血来诊，诊断为胎盘早剥。此时首要的护理措施是

- A. 做好阴道检查的准备
- B. 细致全面地了解病史
- C. 立即建立静脉通道
- D. 做超声检查的准备
- E. 做阴道分娩的准备

14. 初孕妇，24 岁。妊娠 33 周，轻度子痫前期。为防止发展为重度子痫前期，处置不适当的是

- A. 适当增加产前检查次数
- B. 适当减轻工作，保证睡眠 10 小时
- C. 适当服用镇静药物
- D. 严格限制食盐摄入量
- E. 休息和睡眠时取左侧卧位

15. 患者，女性，49 岁。月经紊乱 1 年，月经周期 3~4 个月，经期延长，经量时多时少，且频繁发作潮热、出汗。患者自诉最近看什么都不顺眼，家属也陈述患者近年来性情大变，易激惹。拟诊为绝经综合征，并计划采用雌激素替代疗法治疗。对该患者采取的护理措施中不妥当的是

- A. 向患者和家属讲解围绝经期的常识
- B. 指导患者进行自我情绪调整
- C. 指导患者摄入富含蛋白质、铁和钙的食物
- D. 告知患者雌激素非常安全，可放心使用，以解除不必要的思想顾虑
- E. 指导患者坚持进行适度体育锻炼

16. 患者女性。孕 1 产 0，孕 36 周，四步触诊结果：子宫底部为圆而硬的胎头，耻骨联合上方触到宽而软、不规则的胎臀，胎背位于母体腹部右前方。该患者胎心听诊的位置是

- A. 脐上方左侧
- B. 脐上方右侧
- C. 脐周
- D. 脐下方左侧
- E. 脐下方右侧

17. 患者，女性。产后 2 周，主诉小腿疼痛、肿胀、皮肤发白，考虑为血栓性静脉炎。关于该患者的护理措施，正确的是

- A. 告知患者不必焦虑，属产后正常生理现象
- B. 嘱患者卧床休息
- C. 鼓励患者下床活动
- D. 帮助患者按摩下肢
- E. 鼓励患者进行盆底及下肢锻炼

18. 1 岁小儿，发热、咳嗽、气促 1 周，近 1 天惊厥 4 次，意识不清。查体：嗜睡，双眼凝视，球结膜水肿，前囟隆起，双肺散在的中细湿啰音，脑膜刺激征阳性，巴氏征阳性，脑脊液除压力增高外，其他均正常。根据病例诊断最大的可能是

- A. 肺炎合并轻度缺氧
- B. 肺炎合并结脑
- C. 肺炎合并化脑
- D. 肺炎合并心衰
- E. 肺炎合并脑水肿

19. 患儿，男，7 岁，2 岁前诊断为原发性血小板减少性紫癜，常反复发作。为了尽量减少复发，护士对其进行的健康指导应不包括

- A. 卧床为主，避免活动
- B. 定期复查
- C. 进行自我保护
- D. 识别出血征象
- E. 避免过度劳累

20. 在家中早产的患儿出生后 7 天出现烦躁

不安，张口困难，面肌痉挛，最可能是发生了

- A. 新生儿颅内出血
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿溶血
- D. 新生儿破伤风
- E. 新生儿脑膜炎

21. 患儿，男，2 岁。重度营养不良。晨起突然出现出汗、肢冷、脉弱、血压下降等休克表现及呼吸暂停，患儿可能出现

- A. 高渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 低血钙
- D. 低血钾
- E. 低血糖

22. 患儿，男，日龄 2d。上腭中线和齿龈部有黄白色斑点，称为“马牙”，该患儿的护理方法是

- A. 挑破
- B. 用软布擦净
- C. 抗炎治疗
- D. 不需处理，可自行消失
- E. 用制霉菌素甘油

23. 患儿，5 岁。重症室间隔缺损，并发肺炎 3 天，咳嗽、呼吸急促，其处理重点是

- A. 建立合理的生活制度
- B. 控制感染
- C. 对症治疗
- D. 手术治疗
- E. 加强锻炼

### 三、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1. 某男性病人，71 岁。既往患有慢性支气管炎 20 余年，近 5 年来活动后气急，1 周前感冒后痰多，气急加剧。实验室检查：白细胞  $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞  $0.9 \times 10^9/L$ ，动脉血 pH7.30， $PaCO_2$  80mmHg， $PaO_2$  50mmHg， $SaO_2$  60%。

(1) 该病人最可能的诊断是

- A. 右心衰竭
- B. 支气管哮喘
- C. II 型呼吸衰竭
- D. I 型呼吸衰竭
- E. 急性呼吸窘迫综合征

(2) 1 天后，该病人出现头痛、嗜睡、神志淡漠、谵妄、扑翼样震颤。应考虑出现了何种情况

- A. 脑炎
- B. 肺炎
- C. 脑疝
- D. 肺性脑病
- E. 窒息先兆

(3) 以下关于该病人的治疗措施，错误的是

- A. 抗生素抗感染治疗
- B. 鼻导管吸氧
- C. 机械通气
- D. 纠正酸中毒
- E. 面罩高流量吸氧

(4) 对该病人吸氧的护理措施，正确的是

- A. 低浓度、低流量
- B. 低浓度、高流量
- C. 高浓度、低流量
- D. 高浓度、高流量
- E. 正常浓度正常流量

2. 某女性病人，35 岁。春季出外踏青时突感胸闷、咳嗽，呼吸困难，大汗淋漓、烦躁不安。查体：口唇发绀，呼吸急促、双肺布满广泛哮鸣音，呼吸 40 次/分，心率 120 次/分。过去曾有类似发作史，休息后可自行缓解。

(1) 应首先考虑该病人是

- A. 支气管哮喘
- B. 左心衰竭
- C. 肺炎
- D. 心源性哮喘
- E. 急性支气管炎

(2) 根据以上的表现，应判断该病人的病情严重程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 危重
- E. 极危重

(3) 对该病人的用药护理，不妥的是

- A. 禁用阿司匹林
- B. 茶碱类药物应快速静脉注射
- C. 白三烯调节剂主要不良反应是胃肠道症状
- D. 酮替芬有头晕、口干、嗜睡不良反应
- E. 糖皮质激素口服宜在饭后服用

3. 某男性病人，59 岁。既往有高血压病史 15 年，糖尿病病史 5 年。因与同事交谈工作时情绪激动，突然出现剧烈头痛、头晕、呕吐、意识模糊，随即出现偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍、昏迷。急诊入院治疗。体检：颜面潮红、意识障碍、体温  $38.5^\circ C$ ，

血压 200/145mmHg，呼吸 45 次/分。脑脊液检查呈均匀血性；CT 呈高密度影。

(1) 首先应判断患者是

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑栓塞

(2) 此时降低患者的颅内压的首选药是

- A. 呋塞米
- B. 20%甘露醇
- C. 25%山梨醇
- D. 氢氯噻嗪
- E. 25%山梨醇

(3) 对该患者的护理措施，不妥的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 头部稍低，保证脑部供血
- C. 保持环境安静
- D. 不能进食者应给予鼻饲流质饮食
- E. 保持关节功能位

4. 患者，男，39 岁。因阵发性腹痛、呕吐 6 小时，以“肠梗阻”收入院。患者烦躁，面色紫绀、皮肤湿冷、脉搏细弱，血压 90/70mmHg。

(1) 患者可能发生的酸碱失衡为

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒

(2) 针对该患者的护理措施不正确的是

- A. 吸氧、输液
- B. 仰卧中凹卧位
- C. 放置热水袋热敷
- D. 监测中心静脉压

E. 监测尿量

5. 患者，男，44 岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院。CT 检查示颅骨线性骨折。患者 3 天后头痛加重，喷射性呕吐 2 次，昏迷，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增加。

(1) 此时患者的颅内压至少高于

- A. 50mmH<sub>2</sub>O
- B. 70mmH<sub>2</sub>O
- C. 100mmH<sub>2</sub>O
- D. 150mmH<sub>2</sub>O
- E. 200mmH<sub>2</sub>O

(2) 此时患者最可能发生了

- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 脑内血肿
- D. 枕骨大孔疝
- E. 小脑幕切迹疝

(3) 对该患者的护理措施错误的是

- A. 吸氧
- B. 静脉快速补液
- C. 应用利尿剂和激素
- D. 静脉快速输入脱水剂
- E. 做好急症手术准备

6. 患者，男，25 岁。反复发作性上腹痛 5 年。午饭后突然剧烈腹痛，迅速遍及全腹。查体：腹肌紧张，压痛，反跳痛，肝浊音界缩小。

(1) 最可能的诊断是

- A. 慢性阑尾炎急性发作
- B. 胆道结石
- C. 急性胰腺炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 慢性胆囊炎急性发作

(2) 护理措施错误的是

- A. 禁食
- B. 禁止使用麻醉止痛剂
- C. 禁止灌肠
- D. 禁止导尿
- E. 禁止口服导泻药物

7. 患儿，6 岁。左臂肱骨髁上骨折后行石膏管型固定，3 小时后出现手部苍白、发凉，桡动脉搏动减弱，不让人碰右手手指，一碰即大哭不止。

(1) 此时应警惕该患儿是否出现了

- A. 压疮
- B. 石膏综合征
- C. 化脓性皮炎
- D. 骨折断端移位
- E. 骨筋膜室综合征

(2) 在确诊后，对此并发症最有效的处理措施是

- A. 给予止痛剂
- B. 应用脱水剂
- C. 患肢功能锻炼
- D. 松解石膏或切开减压
- E. 伤口换药和皮肤护理

(3) 若该并发症不能及时有效处理，最可能导致患者出现

- A. 关节僵硬
- B. 骨化性肌炎
- C. 缺血性肌挛缩
- D. 缺血性骨坏死
- E. 创伤性关节炎

8. 患者男，75 岁。主诉因间歇、全程肉眼血尿 1 周，发作性腰腹部绞痛入院治疗。排泄性尿路造影示右肾部分充盈缺损。

(1) 首先考虑的诊断是

- A. 阴性结石
- B. 肾盂癌
- C. 肾结核
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 肾癌

(2) 下列哪项是最能确诊的辅助检查

- A. 血尿酸
- B. 尿液找癌细胞
- C. 输尿管肾镜+活检
- D. 膀胱镜检查
- E. CT 检查

(3) 应首先采取最佳的治疗方法是

- A. 肾切开取石
- B. 止血、观察
- C. 肾切除
- D. 局部切除
- E. 根治性肾切除

9. 初产妇因第二产程延长，胎儿体重 4000g，行胎头吸引分娩后数分钟出现持续阴道出血，有凝血块。

(1) 最恰当的处理是

- A. 输血
- B. 注射催产素
- C. 注射麦角新碱
- D. 开放静脉通道，手取胎盘
- E. 仔细检查软产道

(2) 经过以上处理，阴道出血停止 1 小时后再次出血，血压 70/30mmHg，脉细出冷汗，此时出血的原因可能是

- A. 胎盘残留
- B. 子宫收缩乏力
- C. 软产道裂伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎盘剥离不全

10. 某孕妇，35 岁，孕 2 产 1，现妊娠 35<sup>+</sup>5 周，既往健康，一年前因妊娠 7 个月胎死而行引产术。本次妊娠早期产前各项化验指标均正常。入院检查：血压 17.96/10.64kPa(135/80mmHg)，体温 36.8℃，宫底高度 36cm，胎心率正常，空腹血糖 7mmol/L，尿糖(++)，尿白细胞 2~4 个/HP。

(1) 本病例最可能的诊断为

- A. 妊娠合并糖尿病
- B. 妊娠期高血压疾病
- C. 妊娠期糖尿病
- D. 妊娠合并尿路感染
- E. 妊娠合并急性肾炎

(2) 入院后经控制饮食治疗 1 周，空腹血糖为 6.2mmol/L，NST 发现为无反应型，胎心率每分钟 114~123 次。应首先考虑的处置为

- A. 间断吸氧
- B. B 超检查
- C. 立即终止妊娠
- D. 胎动计数
- E. 左侧卧位

(3) 对该新生儿，哪项处理不必要

- A. 观察新生儿有无低钙血症
- B. 按早产儿进行监护、治疗
- C. 注意新生儿有无反应性低血糖
- D. 早期进行母乳喂养
- E. 气管插管加压给氧

11. 某孕妇，25 岁，结婚 3 年，夫妇同居，未避孕，从未怀孕过，平素月经周期规律，现停经 44 天，在抬重物劳动时突感右下腹剧烈疼痛伴阴道点滴出血半天。体检：BP100/50mmHg，白细胞总数  $9.0 \times 10^9/L$ 。妇科检查见阴道内有少许暗红色

血，宫颈举痛明显，后穹窿饱满。

(1) 该孕妇最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 稽留流产
- C. 异位妊娠破裂
- D. 习惯性流产
- E. 急性阑尾炎

(2) 下列检查方法，对该患者可以确诊的是

- A. 尿 hCG 检查
- B. 腹部检查
- C. 宫颈黏液检查
- D. 宫颈活体组织检查
- E. 后穹窿穿刺

(3) 对该病人提供的护理措施中，错误的是

- A. 严密观察生命体征变化
- B. 病人立即取半卧位
- C. 以手术治疗为主
- D. 立即开通静脉做好输血准备
- E. 立即行灌肠术前准备

12. 患儿男，5 岁。因急性肺炎入院 2 天，查体：T39℃，P130 次/min，R25 次/min，意识清楚，其余结果正常，在查体过程中突然发生意识丧失，眼球上翻，四肢出现强直性或阵挛性抽动。

(1) 该患儿最可能的诊断是

- A. 脑膜炎
- B. 急性呼吸衰竭
- C. 高热惊厥
- D. 癫痫
- E. 感染性休克

(2) 针对该患儿的护理措施不正确的是

- A. 松开衣领
- B. 摇晃患儿使其清醒
- C. 在上下牙间垫牙垫
- D. 保持环境安静

E. 降低体温

13. 某患儿，10 个月，近 2 个月低热、咳嗽，消瘦，夜间多汗，胸部 X 线显示肺部可见“哑铃状”双极影，患儿未接种过卡介苗，结核菌素试验为(++)。

(1) 该患儿的诊断可能是

- A. 肺炎
- B. 支气管淋巴结结核
- C. 原发综合征
- D. 干酪性肺炎
- E. 粟粒型肺结核

(2) 该患儿治疗应首选

- A. 青霉素
- B. 先锋霉素
- C. 异烟肼
- D. 链霉素
- E. 利福平

14. 患儿男，3 岁。有饮食不洁史，高热

2 小时，体温 40℃，呕吐一次，面色苍白，四肢冰冷，神志不清。

(1) 最有可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 中毒性细菌性痢疾
- C. 病毒性脑炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 败血症

(2) 为进一步确诊，应立即进行的检查时

- A. 胸片
- B. 血常规
- C. 脑脊液检查
- D. 粪便检查
- E. 血培养

(3) 防止出现循环衰竭治疗中错误的是

- A. 低分子右旋糖酐扩容
- B. 碳酸氢钠纠正酸中毒
- C. 根据心功能使用毛花苷 C
- D. 多巴胺解除微循环痉挛
- E. 1:4 液扩容

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《基础知识》仿真密卷答案与解析

### 一、A1 型题

#### 1. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性上呼吸道感染约 70% ~ 80% 是由病毒引起，细菌性感染仅占小部分。

#### 2. 【正确答案】 C

【答案解析】 洋地黄制剂治疗心衰时，可使心肌收缩力增强，抑制心脏传导系统，对迷走神经系统有直接兴奋作用，从而改善心力衰竭患者的血流动力学变化。故选 C。

#### 3. 【正确答案】 C

【答案解析】 食管胃底静脉曲张多由肝硬化门脉高压引起，血管粗、压力大，加之肝硬化病人本身存在凝血功能障碍，一旦出血不易控制。

#### 4. 【正确答案】 E

【答案解析】 急性炎性脱髓鞘性多发性神经根病又称格林-巴利综合征，是一种周围神经炎症改变并伴有脱髓鞘的多发性神经根神经病。血、尿常规检查无异常。腰穿脑脊液的压力一般正常，无色透明，典型表现为蛋白-细胞分离现象，即蛋白增高而细胞数正常。

#### 5. 【正确答案】 E

【答案解析】 免疫学检测：目前，临床常用抗原检测方法检测脑脊液中的抗原，其敏

感性高，特异性强，是近年来开展的流脑快速诊断方法。

#### 6. 【正确答案】 B

【答案解析】 目前已有充分证据表明特发性血小板减少性紫癜 (ITP) 患者血浆中有抗血小板抗体存在。急性 ITP 大多发生在病毒感染恢复期，认为是病毒抗原吸附于血小板表面，改变血小板抗原性，导致自身抗体形成，从而破坏血小板；慢性 ITP 是血小板抗体作用于血小板相关抗原，造成血小板破坏，从而导致血小板减少。

#### 7. 【正确答案】 C

【答案解析】 引起急性胰腺炎的病因很多，常见的病因胆道疾病、大量饮酒、暴饮暴食。我国急性胰腺炎的最主要的病因是胆道疾病，考试作为最佳选项应该选 C，胆道疾病。

#### 8. 【正确答案】 D

【答案解析】 严重组织损伤，输入大量库存血或溶血等，大量组织破坏时，钾自细胞内排出，释放于细胞外液，引起血钾增高。

#### 9. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺源性心脏病是指由支气管肺组织，胸廓或肺动脉系统病变所致肺血管阻力增加，产生肺动脉高压等多种因素的心脏病。

10.【正确答案】 E

【答案解析】 慢性肾衰竭常见病因：

(1)原发性肾脏疾病，如肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、肾小管间质性肾病、遗传性肾炎、多囊肾等，慢性肾小球肾炎为最常见病因。

(2)继发性肾脏病变，如系统性红斑狼疮性肾病、糖尿病性肾病、高血压肾小动脉硬化症、各种药物和重金属所致的肾病。

(3)尿路梗阻性肾病，如尿路结石、神经性膀胱、前列腺肥大等。近年国外不少学者认为最常见的病因依次为：糖尿病肾病、高血压肾病、肾小球肾炎、多囊肾等；在我国则为原发性慢性肾炎、梗阻性肾病、狼疮肾炎、高血压肾病、多囊肾等。

11.【正确答案】 A

【答案解析】 药物的作用机制：抑制甲状腺内过氧化酶系，抑制碘离子转化为新生态碘或活性碘，从而抑制 TH 的合成。

12.【正确答案】 A

【答案解析】 病毒性肝炎是肝硬化最常见的病因，但只有乙型、丙型和丁型病毒性肝炎可发展为肝硬化，甲型和戊型不发展为肝硬化。而选项 B、C、D、E 均是肝硬化的病因。

13.【正确答案】 B

【答案解析】 心源性水肿是右心功能不全的主要表现。右心衰竭时体循环淤血，有效血容量减少，继发醛固酮增多引起水钠潴留、静脉压增高，使毛细血管渗出相对增多，最终导致水肿。而左心衰竭可致肺淤血、肺组织弹性下降，影响气体交换而主

要表现为程度不同的呼吸困难。原发性高血压和心肌炎主要使左心功能受累，也以呼吸困难为主要表现。

14.【正确答案】 D

【答案解析】 在肺癌中，腺癌女性多见，占肺癌的 1/4。

15.【正确答案】 C

【答案解析】 心脏骤停心电图表现包括心脏停搏、心室颤动及电机械分离。本题正确答案是 C。

16.【正确答案】 A

【答案解析】 心脏传导系统的细胞均能发出冲动，但以窦房结的自律性最高，成为正常人心脏的起搏点。

17.【正确答案】 A

【答案解析】 肾盂肾炎主要致病菌为革兰氏阴性杆菌，其中以大肠杆菌最为常见，占 60%~80%以上。

18.【正确答案】 A

【答案解析】 机械性肠梗阻是由于肠腔堵塞、肠管受压或肠壁病变导致的肠内容物正常运行或通过发生障碍。

19.【正确答案】 D

【答案解析】 纤维胃镜检查可在直视下观察病变部位、性质，并取黏膜做活组织检查，是目前最可靠的诊断手段。

20.【正确答案】 C

【答案解析】 前列腺穿刺活检：前列腺穿刺活检主要用于诊断前列腺癌。

21.【正确答案】 C

【答案解析】 MRI 可显示椎管形态、椎间盘突出程度和突出的部位，还能显示脊髓、髓核、脊神经根和马尾神经情况。相比其他选项诊断价值高。

22.【正确答案】 C

【答案解析】 腹膜严重充血水肿并渗出大量液体，引起脱水和电解质紊乱、血浆蛋白降低、贫血，加之发热、呕吐；腹内脏器浸泡在脓性液体中，肠管麻痹，形成麻痹性肠梗阻，肠腔内大量积液，使血容量明显减少；细菌入血、毒性介质不被清除；肠管扩张、胀气，使膈肌抬高而影响心肺功能，加重休克，甚至导致死亡。

23.【正确答案】 B

【答案解析】 急性腹膜炎、急性肠梗阻和大量呕吐及大面积烧伤等外科疾病最为常见。等渗性脱水时，水和钠成比例丧失，细胞外液渗透压无明显变化。

24.【正确答案】 E

【答案解析】 大便潜血检查为大肠癌的初筛手段，阳性者再做进一步检查。

25.【正确答案】 C

【答案解析】 股疝为疝囊通过股环、经股管向股部卵圆窝突出形成的疝。多见于 40 岁以上妇女。妊娠是腹内压增高引起股疝的主要原因。故股疝最易嵌顿，在腹外疝中，股疝嵌顿者最多。

26.【正确答案】 C

【答案解析】 低渗性脱水时，细胞外液渗透

压降低，水分向细胞内转移，故细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少。

27.【正确答案】 B

【答案解析】 阑尾的神经由肠系膜上动脉周围的交感神经纤维经腹腔丛和内脏小神经传入，因其传入的脊髓节段在第 10、11 胸节，所以急性阑尾炎发病开始时，常表现为该脊神经所分布的脐周牵涉痛。

28.【正确答案】 E

【答案解析】 口服亚甲蓝之后，如果腹壁瘻口有亚甲蓝溶液渗出，说明肠道和腹壁之间有瘻道，可以确诊肠瘻。

29.【正确答案】 A

【答案解析】 肛裂常发生在肛管后正中部位，当病人处于膝胸位，肛裂部位在正上方。

30.【正确答案】 C

【答案解析】 3P 试验为凝血功能检查，不属于组织配型检查。

31.【正确答案】 E

【答案解析】 龛影见于胃溃疡、结肠溃疡等病变。

32.【正确答案】 B

【答案解析】 婴幼儿颅骨未闭可使代偿能力增强，延缓病情进展，其属于与颅内压增高相关因素，而不属于病因。

33.【正确答案】 D

【答案解析】 确诊肿瘤最佳的诊断方法是病理检查，以上检查方法中肝穿刺细胞学检

查属于病理检查的一种方法。

34.【正确答案】 C

【答案解析】 食管镜可以直接观察病变组织，还可以取活检，进行病理检查。

35.【正确答案】 A

【答案解析】 肠套叠病人 X 线空气或钡剂灌肠检查，可见到空气或钡剂在套叠远端受阻呈“杯口状”阴影。

36.【正确答案】 B

【答案解析】 下 1/3 段骨折：远折端受腓肠肌牵拉和肢体重量作用向后移位，腓动脉、腓静脉和腓总神经。

37.【正确答案】 C

【答案解析】 脊髓断裂：损伤重，脊髓的连续性中断，可为不完全断裂和完全断裂，前者常伴有挫伤，称为脊髓挫裂伤。脊髓断裂恢复无望。

38.【正确答案】 A

【答案解析】 《医疗机构从业人员行为规范》适用于各级各类医疗机构内所有从业人员，包括：管理人员、医师、护士、医技人员、药学技术人员和其他人员（指除以上五类人员外，在医疗机构从业的其他人员，主要包括物资、总务、设备、信息、统计、财务、基本建设、后勤等部门工作人员）。

39.【正确答案】 A

【答案解析】 自体移植：以自身的细胞、组织或器官进行移植，可永久存活。器官如原位植回称为再植，如断肢再植。

40.【正确答案】 C

【答案解析】 深Ⅱ度烧伤：伤及真皮层，可有水疱，疱壁较厚、基底苍白与潮红相间、稍湿，痛觉迟钝，有拔毛痛。3~4 周愈合，留有瘢痕。

41.【正确答案】 B

【答案解析】 颅底骨折时易撕裂硬脑膜形成脑脊液漏，所以最可靠的依据是脑脊液耳鼻漏。

42.【正确答案】 C

【答案解析】 主要是子宫内膜长期受到节育环异物刺激引起无菌性炎症反应，白细胞和巨噬细胞增多，使子宫液组成改变从而起破坏胚激肽的作用，阻止受精卵着床。

43.【正确答案】 B

【答案解析】 产后出血的病因包括子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤、凝血功能障碍，其中最常见的原因因为子宫收缩乏力。

44.【正确答案】 B

【答案解析】 绒毛膜促性腺激素(hCG)：胚泡一经着床，合体滋养细胞即开始分泌 hCG，在受精后 10 天左右即可用放射免疫法自母体血清中测出，成为诊断早孕的敏感方法之一。至妊娠 8~10 周时分泌达高峰，持续 1~2 周后逐渐下降。

45.【正确答案】 B

【答案解析】 骨盆狭窄可导致难产，不是早产发生的原因。

46.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠 13 周前体重无明显变化。

以后平均每周增加 350g，直至妊娠足月时体重平均增加 12.5kg，包括胎儿、胎盘、羊水、子宫、乳房、血液、组织间液及脂肪沉积等。

47.【正确答案】 B

【答案解析】 输卵管妊娠破裂多见于峡部妊娠，发病多在孕 6 周左右。

48.【正确答案】 A

【答案解析】 雌激素可以促进卵泡及子宫发育，使子宫内膜增生，增强子宫对缩宫素的敏感性；增加输卵管上皮细胞的活动，使阴道细胞内糖原增加；促进体内水钠潴留及骨中钙质沉着等。

49.【正确答案】 C

【答案解析】 糖尿病患者并发严重心血管疾病，肾衰竭或增生性视网膜炎者，宜及早终止妊娠，最好是妊娠 37 周。

50.【正确答案】 C

【答案解析】 化脓性脑膜炎病原菌：新生儿及出生 2 个月内的婴儿则以革兰氏阴性细菌为主，如大肠埃希菌、副大肠埃希菌等，阳性球菌可见金黄色葡萄球菌感染。出生 2 个月至儿童期时，以流感嗜血杆菌、脑膜炎双球菌和肺炎链球菌为主。

51.【正确答案】 C

【答案解析】 急性肾小球肾炎最常见的病因是 A 组  $\beta$  溶血性链球菌引起的急性上呼吸道感染或皮肤感染后的一种免疫复合物性肾小球肾炎。

52.【正确答案】 A

【答案解析】 新生儿颅内出血是新生儿期常见的一种严重的脑损伤性疾病。主要是因缺氧或产伤引起，早产儿发病率较高，预后较差。

53.【正确答案】 D

【答案解析】 肠套叠的临床表现为：黏液果酱样血便，多数病例上腹部或右上腹部触及腊肠样肿块，表面光滑，中度硬，略有弹性，稍可移动。所以该患儿可能为肠套叠。首选检查腹部 B 超可以确诊病情。并且查出肠套叠位置。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 新生儿肺透明膜病又称新生儿呼吸窘迫综合征，主要见于早产儿，因肺表面活性物质不足导致进行性肺不张。

55.【正确答案】 A

【答案解析】 特发性血小板减少性紫癜是小儿最常见的出血性疾病，可分为急性型（继发性）和慢性型（原发性），小儿以急性型（继发性）多见，学龄期儿童以慢性型（原发性）多见。

56.【正确答案】 E

【答案解析】 惊厥发作持续超过 30 分钟或 2 次发作间歇期意识不能恢复者称惊厥持续状态。此时因抽搐时间长，机体氧消耗过多，脑组织缺氧可导致脑水肿及脑损伤，出现颅内压增高及脑损伤的表现。

57.【正确答案】 D

【答案解析】 主动脉瓣关闭不全、主动脉反流，会使收缩压升高，舒张压降低，脉压增大，出现周围血管征。

58.【正确答案】 C

【答案解析】 胎儿缺氧，最早期的表现就是会出现胎动变得频繁。

二、A2 型题

1.【正确答案】 C

【答案解析】 纤维胃镜适用于不明原因的消化道出血。

2.【正确答案】 E

【答案解析】 缺铁性贫血是体内用来制造血红蛋白的储存铁缺乏，血红蛋白合成减少、红细胞生成障碍引起的小细胞、低色素性贫血，是临床上最常见的一种贫血，典型血象为小细胞低色素性贫血。

3.【正确答案】 D

【答案解析】 患者急性起病，有明显的腹膜刺激征伴胃肠道症状，可初步认为是急腹症。常见的急腹症有急性阑尾炎、急性肠梗阻、急性胰腺炎、急性胆囊炎和急性胃、十二指肠穿孔。急性阑尾炎以转移性右下腹痛为特征，急性肠梗阻以腹痛、腹胀、呕吐和停止排便排气为特征，急性胃、十二指肠穿孔一般有溃疡病史，以持续性上腹刀割样痛并很快扩散至全腹，急性胆囊炎 Murphy 征(+)，通过患者的症状和体征可判断急性胰腺炎可能性大，而饮酒又是急性胰腺炎的常见诱因，确诊急性胰腺炎最有价值的指标为血淀粉酶含量。

4.【正确答案】 D

【答案解析】 哮喘发作时血液检查可有嗜酸性粒细胞增高。

5.【正确答案】 C

【答案解析】 急性胰腺炎的病因在国内以胆道疾病多见，饮食因素次之；在国外除胆石症外，酗酒则为重要原因。

6.【正确答案】 B

【答案解析】 纤维胃镜检查：在急性大出血 24~48 小时内进行，可确定出血部位和病变程度并可采取镜下直视止血。

7.【正确答案】 C

【答案解析】 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)：适用于有糖尿病可疑而空腹或餐后血糖未达到糖尿病诊断标准者。试验于清晨进行，禁食至少 10 小时。试验日晨空腹取血后成人口服葡萄糖水(75g 葡萄糖粉溶于 250ml 水中)，在 5 分钟内服下。服后 30、60、120 和 180 分钟时取静脉血测血糖。

8.【正确答案】 B

【答案解析】 题干已提示：发作性胸痛，伴反酸、烧心、呃逆，此时需要做心电图，排除心源性胸痛。

慢性胃炎 30 年，是干扰信息，在遇到病例分析时，尤其带有压榨性胸骨后疼痛等字样，一定要想到心绞痛等心脏病变。

9.【正确答案】 C

【答案解析】 寒战时细菌量大，毒素强，血培养阴性率高。

10.【正确答案】 B

【答案解析】 首先患者目前出现了肠梗阻，主要依据：①典型的临床表现：肛门停止排便排气，②有肠梗阻的 X 线表现：结肠胀气；其次分析造成肠梗阻的可能原因，

选项 A、D、E 可排除，而右半结肠肠腔较大，粪便稀薄，肿瘤以肿块型多见，临床以全身症状、贫血和腹部肿块等为主要表现，而左半结肠肠腔较小，肿瘤多为浸润型，引起环状狭窄，临床上以肠梗阻、便秘、腹泻、便血等为主，因此根据病史特点患者最有可能是左半结肠癌并发肠梗阻。故选 B。

11.【正确答案】 B

12.【正确答案】 D

【答案解析】 患试验前 3 天禁食肉类、动物血、肝脏、含铁剂药物及绿色蔬菜，以免产生假阳性反应。可食用牛奶、豆制品、冬瓜、白菜、土豆、粉丝、马铃薯等。

13.【正确答案】 C

【答案解析】 阑尾切除术后并发盆腔脓肿时，直肠指诊在直肠前壁可触及向直肠腔内膨起、有触痛、有时有波动感的肿块，故首选的检查方法是直肠指诊。

14.【正确答案】 E

【答案解析】 患者尿频，排尿困难及尿潴留，可以判断是前列腺增生，针对前列腺增生，直肠指诊应在膀胱排空后进行，可保证检查的准确性。

15.【正确答案】 B

【答案解析】 黄体酮试验利用孕激素在体内突然撤退能引起子宫出血的原理，对月经过期可疑早孕妇女，每日肌注黄体酮 20mg，连用 3~5d，若停药后超过 7d 仍未出现阴道出血，则早期妊娠的可能性很大。

16.【正确答案】 E

【答案解析】 末次月经为 3 月 27 日，5~7 天/33 天，4 月 30 日为下次来月经的时间，下次月经的前 14 天为排卵日，所以 E 正确。

17.【正确答案】 D

【答案解析】 糖尿病对新生儿的影响：新生儿呼吸窘迫综合征发生率增加，而且容易出现新生儿低血糖。

18.【正确答案】 E

【答案解析】 该孕妇在妊娠前有服避孕药史，有可能会造成胎儿畸形，现出现先兆流产的症状，应尊重患者的意愿是否要继续妊娠。

19.【正确答案】 A

【答案解析】 结婚 4 年未孕，下腹隐痛，经期加重，阴道后穹窿触痛明显，首选考虑子宫内膜异位症和子宫腺肌病，腹腔镜检查可以确诊。

20.【正确答案】 E

【答案解析】 经产妇宫口开大 4cm，且宫缩规律有力时，应送入产房，准备接生。

21.【正确答案】 C

【答案解析】 维生素 C 可以促进四氢叶酸形成。维生素 C 能促进叶酸还原为四氢叶酸后发挥作用，故对巨幼红细胞性贫血也有定疗效。

22.【正确答案】 A

【答案解析】 川崎病患儿除典型的临床表现外，还可有急性期易激惹、烦躁不安、少

数有无菌性脑膜炎的表现。其他表现有腹痛、呕吐、腹泻、麻痹性肠梗阻、肝大、黄疸、血清转氨酶升高、咳嗽、关节痛或关节炎、心包炎、心肌炎、心内膜炎、心律失常，甚至心肌梗死等。

23.【正确答案】 B

【答案解析】 目前认为原发性血小板减少性紫癜是一种自身免疫性疾病。患儿因自身免疫过程缺陷或外来抗原的作用，机体产生血小板抗体，抗原抗体结合导致单核-巨噬细胞系统对血小板的吞噬、破坏，血小板寿命缩短，引起血小板减少。

24.【正确答案】 C

【答案解析】 患儿多有缺氧发作，严重者可出现突然昏厥、抽搐或脑血管意外，这是由于在肺动脉漏斗部狭窄的基础上，突然发生该处肌肉痉挛，引起一时性肺动脉梗阻，使脑缺氧加重所致。所以仅仅缺氧是不能发生抽搐的，只有发生肺动脉漏斗部肌肉痉挛才会使脑缺氧加重，才会发生抽搐。此题选择答案 C。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 原发性甲减的典型表现

- (1) 生长缓慢甚至停滞，身材比例不匀称。
- (2) 运动和智力发育落后。
- (3) 特殊面容：表情淡漠、面部苍黄、臃肿、鼻梁宽低平、眼距宽、唇厚、舌体宽厚、伸出口外。皮肤粗糙、头发稀疏干燥、腹大、脐疝。脊柱畸形、手足心发黄。
- (4) 代谢低下：体温低、四肢凉、怕冷、心脏增大、心率缓慢、心音低钝。喂养困难、腹胀、便秘。

三、B 型题

1. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 再生障碍性贫血的发病机制主要是由于各种因素导致骨髓造血功能衰竭。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 白血病的发病机制主要是由于各种因素致机体免疫功能缺陷，对恶性细胞不能识别与消灭，使之得以繁殖，最终导致白血病。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】 ITP 的发病与免疫因素密切相关，目前多认为血小板相关抗体或抗血小板抗体等自身抗体的形成在 ITP 的发病机制中非常重要。

(4)【正确答案】 D

【答案解析】 缺铁性贫血是体内用来制造血红蛋白的贮存铁缺乏，血红蛋白合成减少、红细胞生成障碍引起的小细胞、低色素性贫血，是临床上最常见的一种贫血。

2. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 上消化道出血，每 100ml 血液中约含 20g 蛋白质，上消化道出血后蛋白质分解，肠内产氨增多。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 腹水中含有白蛋白和电解质，大量放腹水后常导致有效循环血量减少及大量蛋白质和水电解质丢失，导致代谢性碱中毒，促使氨通过血-脑屏障，诱发肝性脑病。

3. (1)【正确答案】 E

(2)【正确答案】 A

(3)【正确答案】 C

【答案解析】 再障由于造血功能障碍，而导致各种血细胞分化成熟障碍，血象显示为

全血细胞减少；特发性血小板减少性紫癜是由于血小板数量或功能的异常引起，血象主要表现为血小板数量减少；急性白血病是一类造血干细胞的恶性克隆性疾病，因白血病细胞即异常白细胞自我更新增强、增殖失控、分化障碍、凋亡受阻，骨髓检查多显示为幼稚白细胞增多，且功能异常。三种疾病的病因不同，因此血象和骨髓象也会有不同表现。

4. (1)【正确答案】 D

【答案解析】 脓气胸：脓胸的脓腔内有气体，出现液平面。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】 全脓胸：大量渗出液体布满整个胸膜腔。

包裹性脓胸：机化纤维组织引起粘连，使脓液局限在胸膜腔内的一定范围内。

多房性脓胸：胸膜腔内脓肿被分隔为多个脓腔。

外穿性脓胸：脓胸穿破胸壁。

5. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 宫颈和宫颈管活组织检查是确

定宫颈癌前病变和宫颈癌的最可靠方法。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】 悬滴检查：玻片滴 10% 氢氧化钾或生理盐水与少许阴道分泌物混合，在光镜下检查见到白色假丝酵母菌芽孢和菌丝可确诊。

(3)【正确答案】 D

(4)【正确答案】 E

【答案解析】 宫颈刮片细胞学检查：此方法常用于宫颈癌普查。

6. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 当阴道内糖原增多、酸度增加、局部免疫力下降时，最适合假丝酵母菌繁殖造成此症。孕妇、糖尿病、大量雌激素治疗、长期应用抗生素者、服用皮质类固醇激素或免疫缺陷综合征者易发此症。故选 B。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 萎缩性阴道炎常见于妇女绝经后，因卵巢功能减退，雌激素水平降低，阴道壁萎缩，黏膜变薄，致局部抵抗力下降，病菌易入侵并繁殖引起炎症。故选 E。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《相关专业知识》仿真密卷答案与解析

### 一、A1 型题

#### 1. 【正确答案】 A

【答案解析】受传者一般选择接受与自己观念一致、自己需要、关心的信息。

#### 2. 【正确答案】 C

【答案解析】区别高可变性行为与低可变性行为，属于行为诊断。所谓高可变性行为与低可变性行为是指通过健康教育干预，某行为发生定向改变的难易程度。

#### 3. 【正确答案】 B

【答案解析】体语即通过无言的动作传情达意。如以注视对方的眼神表示专心倾听；以点头的表情表示对对方的理解和同情；以手势强调某事的重要性等。健康教育中最常用的体语是体育运动。

#### 4. 【正确答案】 C

【答案解析】医院健康教育是社会发展和医学进步的产物，是健康教育工作多项功能的重要体现，对疾病的预防、治疗、护理、康复、管理等许多具体环节具有特殊的意义和作用，是医院工作的重要组成部分。

1. 提高患者依从性：通过对患者进行健康教育，可以使患者掌握必要的卫生知识，正确认识疾病，更好地配合治疗，从而提高其医疗依从性。

2. 心理治疗：通过对患者进行健康教育，

可以消除或缓解患者或家属因对疾病一无所知而产生的恐惧、精神紧张、焦虑、悲观失望等情绪反应，增强他们与疾病作斗争的信心。

3. 消除致病因素：通过对患者进行健康教育，使其改变与疾病有关的不良行为和生活方式，从而真正消除致病的根本因素。

4. 密切医患关系：通过对患者进行健康教育，不仅使其自愿接受治疗，还可以使其了解治疗的过程及危险性，从而增强患者的理解，减少医疗纠纷。

5. 降低医疗成本：通过对患者进行健康教育，使其掌握疾病防治的基本知识，从而减少住院日数，降低医疗成本，提高医疗设施的利用率。

#### 5. 【正确答案】 D

【答案解析】自我效能指对自身采取或放弃某种行为能力的自信。对糖尿病患者而言则指患者对自觉进行相关治疗措施能力的自信。

#### 6. 【正确答案】 A

【答案解析】常用座位排列为圆形或马蹄铁形，人数多控制在 6~10 人，时间控制在 1 小时左右，讨论提纲应在讨论前确定。

#### 7. 【正确答案】 D

【答案解析】健康教育与健康促进的核心是

促使人们建立健康的行为和生活方式，制定一系列使行为和生活方式向有益于健康方向发展的策略，从而降低危险因素，预防各种因不良行为或生活方式所导致的健康问题或疾病。

8.【正确答案】D

【答案解析】行为诊断的主要目的是确定导致目标人群疾病或健康问题发生的行为危险因素，其主要任务包括三个方面：①区别引起疾病或健康问题的行为与非行为因素；②区别重要行为与相对不重要行为；③区别高可变性行为与低可变性行为。

9.【正确答案】A

【答案解析】人际传播，又称亲身传播，是指人与人之间面对面直接的信息交流，是个体之间相互沟通。人际传播是建立人际关系的基础，是共享信息的最基本传播形式。

10.【正确答案】C

【答案解析】大众传播是指职业性传播机构通过广播、电视、电影、报刊、书籍等大众传播媒介向范围广泛、为数众多的社会人群传递信息的过程。

11.【正确答案】E

【答案解析】偏向式提问包含提问者的观点，可暗示对方做出提问者想要的正确答案。

12.【正确答案】D

【答案解析】评估教育需求主要从以下四个方面考虑。①患者对疾病或健康问题的知

识水平。②患者对健康教育的态度。③患者的学习能力。④患者的环境因素。

13.【正确答案】C

【答案解析】人类的本能行为由人的生物性所决定，是人类的最基本行为，如摄食行为、性行为、躲避行为、睡眠等。

14.【正确答案】A

【答案解析】社会诊断是生物-心理-社会医学模式的具体体现。社会诊断的主要目的是从分析广泛的社会问题入手，了解社会问题与健康问题的相关性，其重点内容包括社会环境和生活质量。

15.【正确答案】B

【答案解析】健康信念模式(HIBM)是运用社会心理方法解释健康相关行为的理论模式。

16.【正确答案】A

【答案解析】效应评价正是对目标人群因健康教育项目所导致的相关行为及其影响因素的变化进行评价。效应评价的内容包括：倾向因素，是指目标人群的卫生保健知识、健康价值观、对某一健康相关行为或疾病的态度、对自身易感性、疾病潜在威胁的认识等。艾滋病防治相关知识知晓率属于效应评价中的倾向因素。

17.【正确答案】B

【答案解析】在评价过程中，要特别注意防止偏倚因素的影响，人们得知自己正在被测试或观察而表现出的异乎寻常的现象称为霍桑效应。在健康教育项目评价中，霍

桑效应也可能影响对项目效果的客观反映。

18.【正确答案】D

【答案解析】人类行为的发展过程中的巩固发展阶段是在成年后并持续终身，此阶段的行为已基本定型，但由于环境、社会及个人状况均在不断变化，人们必须对自己的行为加以不断地调整、完善、充实和提高。

19.【正确答案】C

【答案解析】过程评价起始于健康教育计划实施开始之时，贯穿于计划执行的全过程。

20.【正确答案】B

【答案解析】二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的。

21.【正确答案】C

【答案解析】控制是指为监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程。管理层不可能控制所有的活动，因此，控制手段应顾及到例外情况的发生。这就是有效控制特征之一，即“强调例外”。

22.【正确答案】B

【答案解析】组织图也称组织树，指用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能。组织图一般描述下列几种组织结构及管理关系方面的信息：权力结构、沟通关系、管理范围及分工情况、角色结构和组织资源流向等。

23.【正确答案】E

【答案解析】计划工作的原则是系统性原

则，重点原则，创新原则、弹性原则，可考核性原则。

24.【正确答案】C

【答案解析】非正式沟通的优点是沟通方便、内容广泛、方式灵活、速度快，故选C。

25.【正确答案】D

【答案解析】PDCA 循环管理就是按照计划(plan)、执行(do)、检查(check)、处理(action)四个阶段来进行质量管理，并循环不止进行下去的一种管理工作程序。

26.【正确答案】C

【答案解析】人际关系学说的主要内容：①人是“社会人”，不仅仅是“经济人”，其工作态度受多种因素的影响；②劳动效率主要取决于职工的积极性，取决于人际关系；③职工中的非正式小群体更能影响职工的情绪，甚至左右职工的行为；④科学的领导者应善于和职工沟通与倾听。

27.【正确答案】D

【答案解析】韦伯着重于组织理论的研究，提出了“理想的行政组织体系”理论。

28.【正确答案】C

【答案解析】护士长根据病人数量及病情配备数量适当、优势互补的护理人员，体现了护理排班的人员结构合理原则。排班时应根据病人情况、护理人员的数量、水平等进行有效组合，做到新老搭配、优势互补，保证病人安全、防范护理纠纷。

29.【正确答案】 B

【答案解析】按决策的重复性划分，决策可分为常规决策和非常规决策。

30.【正确答案】 A

【答案解析】协调，从词面上看就是协商、调和之意。协调的本质，在于解决各方面的矛盾，使整个组织和谐一致，使每一个部门、单位和组织成员的工作同既定的组织目标一致。所以协调的实质是处理人际关系。

31.【正确答案】 E

【答案解析】指挥权：领导者在日常工作和突发事件中，有权调度人、财、物、时间和信息，以达到最有效地利用。

32.【正确答案】 C

【答案解析】20 世纪 30 年代梅奥等进行了“霍桑实验”。他发现决定工作效率最重要的是人际关系和安全感，于是在 1933 年出版了《工业文明中的人的问题》，提出了人际关系学说。

人际关系学说的主要内容：①人是“社会人”，不仅仅是“经济人”，其工作态度受多种因素的影响；②劳动效率主要取决于职工的积极性，取决于人际关系；③职工中的非正式小群体更能影响职工的情绪，甚至左右职工的行为；④科学的领导者应善于和职工沟通与倾听。

33.【正确答案】 C

【答案解析】目标管理的执行阶段包括咨询指导，调节平衡，反馈控制三个方面。

34.【正确答案】 E

【答案解析】卫生部 1985 年试行的专业技术职务聘任中规定，一般病区护师的设置为每 15~20 张床设 1 名。

35.【正确答案】 C

【答案解析】直线型组织结构又称单线型组织结构，是最古老、最简单的一种组织结构类型。其特点是组织系统职权从组织上层“流向”组织基层。上下级关系是直接关系，即命令与服从的关系。组织内部不设参谋部门。

36.【正确答案】 D

【答案解析】人员管理的基本原则中用人之长原则，是指知人善任、用人所长、扬长避短，才能充分发挥人员的才能，取得最佳效果，获得最大效益。

37.【正确答案】 D

【答案解析】ICU 的护理质量管理应遵循的原则是：(1)制度化：明确基础护理质量标准；(2)针对性：评估临床体征，采取个体化的基础护理措施；(3)延续性：落实护嘱制度，保持高质量护理效果；(4)持续质量改进：不断评估基础护理效果，纠正错误，制定预防措施等。

38.【正确答案】 D

【答案解析】人际关系观点：20 世纪 40 年代末至 70 年代中叶，人际关系观点在冲突观点中占统治地位。人际关系观点认为：对于所有组织来说，冲突都是与生俱来的。由于冲突不可能彻底消除，有时它还会对组织的工作绩效有益，组织应当接纳冲突，

使之合理化。

39.【正确答案】D

【答案解析】计划职能是管理的首要职能，是指为了实现组织目标而对未来的行动进行计划和安排。其中心任务是确定组织的目标和实现目标的具体方案。

40.【正确答案】E

【答案解析】我国护理组织的最高行政职能机构是国家卫生计生委。

41.【正确答案】B

【答案解析】编码：发送者将信息译成接收者能够理解的一系列符号，如语言、文字、图表、照片、手势等。

42.【正确答案】B

【答案解析】PDCA 管理循环就是按照计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理（action）四个阶段来进行质量管理，并循环不止进行下去的一种管理工作程序，由美国质量管理专家戴明提出，又称戴明循环。

43.【正确答案】D

【答案解析】个案护理的缺点：所需费用高、人力消耗多。

44.【正确答案】E

【答案解析】弹性原则是指制订计划时必须要有弹性。留有一定调节余地，以预防及减少不确定因素对计划实施可能产生的冲击及影响，以确保计划目标的实现。

45.【正确答案】E

【答案解析】时间管理的方法有 ABC 时间管理法、四象限时间管理法、记录统计法、拟定时间进度表、区域管理法。

46.【正确答案】E

【答案解析】C 级为不太重要可以暂时搁置的目标。

47.【正确答案】C

【答案解析】建设性冲突指冲突双方目标一致，由于手段或认识不同而产生的冲突。

48.【正确答案】D

【答案解析】预算又称“数字化的计划”，是用具体数字表示预期结果的报表。

49.【正确答案】B

【答案解析】团体决策的方法：①头脑风暴法。又称思维共振法，是为了克服障碍，产生创造性方案的一种简单方法。原则是鼓励一切有创见的思想，禁止任何批评。

50.【正确答案】A

【答案解析】医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测。灭菌合格率必须达到 100%，不合格物品不得进入临床使用部门。

51.【正确答案】D

【答案解析】无明确潜伏期的感染，规定入院 48h 后发生的感染为医院感染。

52.【正确答案】B

【答案解析】根据消毒物品的性质选择消毒方法时需考虑以下内容：一是要保护消毒物品不受损坏，二是使消毒方法易于发挥

作用。不耐热、不耐湿以及贵重物品，可选择环氧乙烷或低温蒸汽甲醛气体消毒、灭菌。

53.【正确答案】 C

【答案解析】 以下消毒灭菌方法中，应用最广泛、效果最好的是高压蒸汽法。

54.【正确答案】 A

【答案解析】 医院感染监测可分为综合性监测和目标监测两大类。

55.【正确答案】 A

【答案解析】 术前预防性应用抗生素的指征：①污染手术，如复杂外伤、战伤、开放性骨关节伤、严重烧伤、伴溃疡坏疽的截肢术、感染性病灶(如脑脓肿)等手术和各种咬伤等；连通口咽部的颈部手术；回肠远端及结肠手术；腹部空腔脏器破裂或穿通伤；高危胆道手术；经阴道子宫切除术。②发生感染将引起严重后果者，如心脏瓣膜病或已植入人造心脏瓣膜者因病需行其他手术者、脑脊液鼻漏者以及器官移植术等。③各种人造物修补、置换或留置手术，如人工心脏瓣膜置换手术、人造关节置换术、人造血管移植术、脑室心房分流管放置术等。④手术范围大、时间长的清洁手术。

56.【正确答案】 D

【答案解析】 应根据物品污染后的危害程度选择消毒、灭菌的方法，凡医用器材中属于高度危险性物品的，必须选用灭菌法。

57.【正确答案】 A

【答案解析】 原位菌群失调是正常菌群发生数量或种类结构上的变化，即出现了偏离正常生理组合的生态学现象。移位菌群失调也称为定位转移或易位，即正常菌群由原籍生境转移到外籍生境或本来无菌的部位定植或定居，如大肠中的铜绿假单胞菌、大肠埃希菌转移到泌尿道或呼吸道定居，多为抗生素使用不当所致。

58.【正确答案】 C

【答案解析】 入院 48 小时后发生的感染为医院感染；有明确潜伏期的感染，自入院时起超过平均潜伏期后发生的感染为医院感染。新生儿在分娩过程中或产后获得的感染为医院感染。

59.【正确答案】 C

【答案解析】 紫外线消毒：适用于室内空气和物体表面的消毒。紫外线消毒灯在电压为 220V、相对湿度为 60%、温度为 20℃ 时，辐射的 253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)应不低于  $70\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。在室内无人状态下，采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面 1.8 ~ 2.2m。安装紫外线灯的数量为平均  $\geq 1.5\text{W}/\text{m}^3$ ，照射时间  $\geq 30$  分钟。

60.【正确答案】 A

【答案解析】 离体后的 HIV 抵抗力很弱，几乎所有的消毒剂在短时间内均可将其灭活。HBV：对感染者和病人流出的血液与分泌物应就地使用含氯消毒剂等中水平以上的消毒剂进行消毒。可见 HIV 对外界的抵抗力小于 HBV。

61.【正确答案】 C

【答案解析】 医院感染发生率的监测包括：  
①全院医院感染发生率的监测；②医院感染各科室发病率监测；③医院感染部位发病率的监测；④医院感染高危科室、高危人群的监测；⑤医院感染危险因素的监测；⑥漏报率的监测；⑦医院感染暴发流行的监测；⑧其他监测等。

62.【正确答案】 E

【答案解析】 移位菌群失调也称为定位转移或易位，即正常菌群由原籍生境转移到外籍生境或本来无菌的部位定植或定居，如大肠中的铜绿假单胞菌、大肠埃希菌转移到泌尿道或呼吸道定居，多为抗生素使用不当所致。

63.【正确答案】 D

【答案解析】 避污纸是备用的清洁纸片，做简单隔离操作时，使用避污纸可保持双手或物品不被污染，以省略消毒不适合于护士接连进行的治疗和操作。

64.【正确答案】 A

【答案解析】 戊型肝炎通过粪-口途径传播，水源或食物被污染可引起暴发流行；也可经日常生活接触传播。

65.【正确答案】 B

【答案解析】 隔离目的：防止病原体扩散，控制传染源，切断传播途径，保护易感人群。

66.【正确答案】 A

【答案解析】 手卫生包括洗手、卫生手消毒

和外科手消毒。

67.【正确答案】 B

【答案解析】 表浅手术切口感染是指发生在手术后 30 天内。

68.【正确答案】 E

【答案解析】 大肠埃希菌常引起泌尿道、腹腔、胆道、血液等的感染。

69.【正确答案】 A

【答案解析】 预真空(包括脉动真空)压力蒸汽灭菌器每口开始灭菌前进行 B-D 测试，B-D 测试合格后，灭菌器方可使用。

70.【正确答案】 B

【答案解析】 人体内的正常菌群大部分是厌氧菌。

71.【正确答案】 E

【答案解析】 医院感染监测中，查阅病例的重点应放在细菌及真菌培养阳性的病人，长期使用免疫抑制剂或抗菌药物的病人，以及发烧和接受过手术或侵入性操作、器官移植、恶性肿瘤、免疫功能低下、长期卧床、昏迷和老人、幼儿、早产儿等易感病人。

72.【正确答案】 A

【答案解析】 一级预防：就是病因预防，比如环境改善，增强体质，免疫接种等。二级预防：就是临床前预防，在疾病的前期早发现、早诊断、早治疗，这样可以避免疾病加重，早治愈。三级预防就是临床预防，对疾病及时治疗，缓解症状，提高生

命质量。

## 二、A2 型题

### 1.【正确答案】 A

【答案解析】受者对信息的选择性主要包括选择性接受，选择性理解和选择性记忆。选择性接受指受者对与自己观念一致，自己需要和关心的信息更容易接受。

### 2.【正确答案】 B

【答案解析】在人的整个生命周期中，行为的形成和发展可分为被动发展、主动发展、自主发展、巩固发展四个阶段，其中主动发展阶段在 3~12 岁，此阶段的行为有明显的主动性，主要表现为爱探究、喜欢表现自我等。

### 3.【正确答案】 B

【答案解析】致病性行为模式是指可导致特异性疾病发生的行为模式，国内外研究较多的是 A 型行为模式和 C 型行为模式。A 型行为又叫冠心病易发性行为，其行为表现为做事动作快，大声和爆发性的讲话，喜欢竞争，对人怀有潜在的敌意和戒心，其核心行为表现为不耐烦和敌意。

### 4.【正确答案】 A

【答案解析】目的不明，导致信息内容的不确定性：发送者在信息交流之前必须有一个明确的目的，即“我要通过什么通道，向谁传递什么信息，并达到什么目的。”

### 5.【正确答案】 B

【答案解析】原正常菌群大部分被抑制，只有少数菌种占决定性优势。发生三度失调

的原因常为广谱抗菌药物的大量应用使大部分正常菌群消失，而代之以过路菌或外袭菌，并大量繁殖而成为该部位的优势菌。正常菌群的三度失调亦称菌群交替症或二重感染。

### 6.【正确答案】 C

【答案解析】发生了三度失调，其原因为广谱抗菌药物的大量应用使大部分正常菌群消失，代之以过路菌或外袭菌，并大量繁殖而成为该部位的优势菌。三度失调表现为急性重病症状，如难辨梭菌引起的假膜性肠炎。白色念珠菌、铜绿假单胞菌和葡萄球菌等都可能成为三度失调的优势菌。正常菌群的三度失调亦称菌群交替症或二重感染。

### 7.【正确答案】 D

【答案解析】医院感染罹患率 = 同期新发生医院感染例数 / 观察期间具有感染危险的住院患者数 × 100%。

### 8.【正确答案】 C

【答案解析】强化酸性戊二醛使用前应先加入 pH 调节剂(碳酸氢钠)，再加防锈剂(亚硝酸盐)充分混匀。戊二醛对碳钢类制品如手术刀片等有腐蚀性，使用前应加入 0.5% 亚硝酸钠防锈。

### 9.【正确答案】 B

【答案解析】体温恢复正常，症状消失后续用 2~3 天，体质好的、病程不易迁延者，病情基本控制 1~3 天即可停药。

### 10.【正确答案】 B

【答案解析】炭疽病人的废弃物和垃圾应焚烧处理。

11.【正确答案】E

【答案解析】深部切口感染指无植入物的手术于手术后 30 天内，有植入物（如人工心脏瓣膜、人造血管、机械心脏、人工关节等）的手术于手术后 90 天内，患者发生的与手术有关并涉及切口深部软组织（深筋膜和肌肉）的感染。

12.【正确答案】A

【答案解析】紫外线消毒的适宜温度为 20℃~40℃，适宜湿度为 40%~60%，紫外线消毒时间须从灯亮 5~7 分钟后开始计时，消毒时间为 30~60 分钟。

### 三、B 型题

1. (1)【正确答案】C

【答案解析】回归因素是指由于偶然因素，个别测试对象的某种特征水平过高或过低，但在以后的测试中可能又恢复到原有实际水平的现象。

(2)【正确答案】A

【答案解析】在影响健康教育评价因素中，时间因素是指在健康教育计划执行和评价过程中发生重大的、可能对目标人群产生影响的事件，例如由于突发地震、重大生活事件等，从而影响评价效果。

2. (1)【正确答案】A

【答案解析】人际传播形式有咨询、交谈或个别访谈、劝服及指导 4 种。针对前来咨询者的健康问题，答疑解惑，帮助服务对象澄清观念、做出决策的人际传播形式称

为咨询。通过与教育对象面对面的直接交流，传递健康信息和知识以帮助其改变相关态度的人际传播形式是交谈；针对教育对象存在的健康问题，说服其改变不正确的健康态度、信念及行为习惯的人际传播形式是劝服；通过向健康教育对象传授相关的知识和技术，使其学习、掌握自我保健的技能的人际传播形式是指导。

(2)【正确答案】B

【答案解析】通过与教育对象面对面的直接交流，传递健康信息和知识以帮助其改变相关态度的人际传播形式是交谈。

(3)【正确答案】C

【答案解析】针对教育对象存在的健康问题，说服其改变不正确的健康态度、信念及行为习惯的人际传播形式是劝服。

(4)【正确答案】D

【答案解析】通过向健康教育对象传授相关的知识和技术，使其学习、掌握自我保健的技能的人际传播形式是指导。

3. (1)【正确答案】B

【答案解析】过程评价的方法：主要方法有查阅档案资料、目标人群调查和现场观察三种。

(2)【正确答案】C

【答案解析】效应评价正是对目标人群因健康教育项目所导致的相关行为及其影响因素的变化进行评价。

4. (1)【正确答案】D

【答案解析】自主发展阶段一般自 12~13 岁起延续至成年。此阶段人们开始通过对自己、他人、环境、社会的综合认识，调整自己的行为。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 主动发展阶段一般在 3~12 岁内。此阶段的行为有明显的主动性，其主要表现为爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现等。

(3)【正确答案】 B

【答案解析】 巩固发展阶段一般在成年后，持续终生。此阶段的行为已基本定型，但由于环境、社会及个人状况均在不断变化，人们必须对自己的行为加以不断的调整、完善和充实。

5. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 环节质量评价常用的评价指标：①护理技术操作合格率；②基础护理合格率；③特护、一级护理合格率；④各种护理表格书写合格率；⑤一人一针一管执行率；⑥常规器械消毒灭菌合格率。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】 临床护理活动的质量评价包括：①基础质量评价；②环节质量评价；③终末质量评价(护理结果评价)。对组织机构、设施、仪器设备的评价属于基础质量评价。

6. (1)【正确答案】 E

【答案解析】 梅奥发现决定工作效率最重要的是人际关系和安全感。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】 提出群体力学理论的心理学家是卢因。

(3)【正确答案】 C

【答案解析】 法国人法约尔对组织管理进行了系统的、独创的研究，1925 年出版了《工业管理与一般管理》一书，后人把他称为“管理过程之父”。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《专业知识》仿真密卷答案与解析

### 一、A1 型题

#### 1. 【正确答案】 D

【答案解析】慢性早期主动脉瓣关闭不全可无症状，或仅有心悸、心前区不适、头部动脉强烈搏动感等。病变严重时可出现左心衰竭的表现。

#### 2. 【正确答案】 B

【答案解析】伤寒的主要并发症易发生在缓解期，有肠出血、肠穿孔，其中以肠穿孔最为严重。

#### 3. 【正确答案】 C

【答案解析】呼吸衰竭为乙脑最严重的表现，也是本病主要死亡原因。

#### 4. 【正确答案】 D

【答案解析】扑翼样震颤是肝性脑病特征性的临床表现。

#### 5. 【正确答案】 A

【答案解析】胸痛是急性心肌梗死最早、最突出的症状，其性质和部位与心绞痛相似。但多无明显诱因，且常发生在安静时，程度更剧烈，呈难以忍受的压榨、窒息或烧灼样，伴有大汗、烦躁不安、恐惧及濒死感。持续时间可长达数小时或数天，休息和服硝酸甘油多不能缓解。

#### 6. 【正确答案】 E

【答案解析】长期高血压可促使深穿支动脉血管壁结构变化，发生微小动脉瘤。高血压脑出血好发部位为大脑中动脉深穿支的豆纹动脉，此动脉破裂造成基底节区出血并常侵犯内囊和破入脑室。

#### 7. 【正确答案】 B

【答案解析】急性肾盂肾炎不影响肾分泌红细胞生成素，因此不会导致贫血。

#### 8. 【正确答案】 B

【答案解析】依病变部位不同而采取不同的体位。原则上抬高患肺位置，引流支气管开口向下，有利于分泌物随重力作用流入大支气管和气管排出。

#### 9. 【正确答案】 A

【答案解析】肺心病可分为代偿期与失代偿期。其中，代偿期体征为：肺动脉瓣区第二心音亢进、三尖瓣区收缩期杂音或剑突下心脏搏动，部分病人有颈静脉怒张，肝界下移。

#### 10. 【正确答案】 E

【答案解析】意识丧失及大动脉搏动消失是心脏骤停最可靠、最迅速的判断依据。

#### 11. 【正确答案】 B

**【答案解析】** SLE 中，80%在病程中出现皮疹、关节痛是常见症状。有临床表现的肾炎占 60%。半数以上急性发作期出现浆膜炎。

12. **【正确答案】** C

**【答案解析】** 持续大量的蛋白尿可导致肾小球高滤过，加重损伤，应用 ACEI 类药物，可通过有效控制高血压达到不同程度减少尿蛋白的作用。

13. **【正确答案】** C

**【答案解析】** 腹痛为本病的主要表现和首发症状，多在暴饮暴食、进高脂餐及饮酒后突然发生。疼痛程度轻重不一，表现为胀痛、钻痛、绞痛或刀割样痛，呈持续性，有时阵发性加剧。

14. **【正确答案】** B

**【答案解析】** 一期(前驱期)的表现为轻度的性格改变和行为失常。

15. **【正确答案】** A

**【答案解析】** 高位肠梗阻时呕吐出现早且频繁，呕吐物主要为胃及十二指肠内容物；低位肠梗阻时呕吐物少，呕吐物为粪样。

16. **【正确答案】** E

**【答案解析】** 血栓闭塞性脉管炎按病变发展程度，临床上可分为三期：局部缺血期、营养障碍期、组织坏死期。局部缺血期以血管痉挛为主，表现为患肢苍白、肢端发凉、怕冷、小腿酸胀乏力，足趾有麻木感。尤其在行走一定距离后出现小腿肌肉抽痛，被迫停下，休息后疼痛可缓解，但再行走

后又可发作，这种现象称为间歇性跛行。

17. **【正确答案】** B

**【答案解析】** 神经根型颈椎病主要体征为头偏向患侧，上肢相应神经根感觉减退、过敏或感觉异常，肌力下降，腱反射减弱。臂丛牵拉试验阳性。

18. **【正确答案】** B

**【答案解析】** 颅前窝骨折表现为眼睑青紫，眼结膜下出血，俗称“熊猫眼征”，鼻和口腔流出血性脑脊液，可合并嗅神经和视神经损伤。

19. **【正确答案】** A

**【答案解析】** 肝区疼痛是原发性肝癌最常见和最主要的症状，约半数以上病人以此为首发症状，多呈间歇性或持续性钝痛或刺痛。

20. **【正确答案】** C

**【答案解析】** 颅内动静脉畸形最常见的首发症状是意识障碍、头痛、呕吐，由于畸形血管破裂致脑内、脑室内和蛛网膜下腔出血所致。

21. **【正确答案】** A

**【答案解析】** 腰痛：最多见，一般早期仅有腰痛，可为急性剧烈疼痛或慢性隐痛，当病人腹压增加如咳嗽、喷嚏、排便或弯腰时可引起疼痛或使疼痛加重。

22. **【正确答案】** D

**【答案解析】** 肛裂最主要的症状是排便时及排便后肛门部疼痛，疼痛的特点是有两次

高峰。

23.【正确答案】 C

【答案解析】 颅内肿瘤因病理类型和所在部位不同，有不同的临床表现，但颅内压增高和局灶症状是其共同的表现。其中约 90% 以上的病人出现颅内压增高症状和体征。

24.【正确答案】 D

【答案解析】 Reynolds 五联征是指腹痛腹胀、寒战高热、黄疸、休克、精神症状。

25.【正确答案】 B

【答案解析】 小脑幕切迹疝表现为患侧瞳孔最初由短暂的缩小，以后逐渐散大，直接或间接对光反应消失，并伴有患侧上睑下垂及眼球外斜。

26.【正确答案】 D

【答案解析】 骨折和关节脱位患者的特殊体征是畸形：脱位后关节处明显畸形，在异常位置摸到移位的骨端短缩或延长。

27.【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜癌最典型的临床表现为绝经后出现不规则阴道流血，其他症状还有阴道排液，晚期出现恶病质表现。

28.【正确答案】 C

【答案解析】 孕妇合并心脏病，在妊娠 32~34 周，分娩期（尤其是第二产程）及产褥期最初 3 天之内，因心脏负荷较重，易发生心力衰竭。

29.【正确答案】 D

【答案解析】 侵蚀性葡萄胎单纯通过化疗就能达到治愈的目的，故疗和放射性核素治疗均效果不佳。子宫或子宫及附件切除只是切除部分病灶，若已发生转移，对转移部位的治疗效果不佳。

30.【正确答案】 B

【答案解析】 解痉药物，以硫酸镁为首选。硫酸镁有预防和控制子痫发作的作用，适用于先兆子痫和子痫病人。

31.【正确答案】 D

【答案解析】 产程进展的标志是宫口的扩张和胎头的下降。只有掌握此规律，才能正确处理产程及避免在产程中不适当的干预。

32.【正确答案】 E

【答案解析】 为防止产后出血过多，可遵医嘱输血、输液。

33.【正确答案】 B

【答案解析】 Apgar 评分包括心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。

34.【正确答案】 D

【答案解析】 临产诊断是有规律且逐渐增强的子宫收缩，同时伴有进行性子宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

35.【正确答案】 D

【答案解析】 子痫前期妊娠 20 周后出现血压  $\geq 140/90\text{mmHg}$ ；尿蛋白  $\geq 0.3\text{g}/24\text{h}$  或随机尿蛋白(+)。或虽无蛋白尿，但合并下列任何一项者：血小板减少，肝功能损害、

肾功能损害、肺水肿、新发生的中枢神经系统异常或视觉障碍。

36.【正确答案】 A

【答案解析】 佝偻病患儿早期主要表现为神经、精神症状，如易激惹、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭、出汗、枕秃。

37.【正确答案】 D

【答案解析】 犬吠样咳嗽是急性感染性喉炎的临床特点之一

38.【正确答案】 C

【答案解析】 咽鼓管：较宽、短、直、呈水平位，故鼻咽炎易侵及中耳而致中耳炎。

39.【正确答案】 D

【答案解析】 新生儿窒息应及时按国际公认的 ABCDE 方案进行复苏，A 指首先要保持呼吸道畅通，患儿仰卧，垫高肩部使颈部伸展，迅速清除口、鼻、咽及呼吸道分泌物。

40.【正确答案】 C

【答案解析】 根据修订后的《传染病防治法》规定，乙类传染病应在 24 小时内报告当地的卫生防疫机构。

41.【正确答案】 A

【答案解析】 急性坏死性小肠结肠炎起病急，常以急性腹痛起病。

42.【正确答案】 B

【答案解析】 颅内出血的治疗原则包括：保持安静，尽可能减少搬动、刺激性操作；

止血及对症处理；控制惊厥；降低颅内压；必要时腰椎穿刺放脑脊液或侧脑室引流治疗脑积水。

43.【正确答案】 E

【答案解析】 风湿热主要表现：(1)心脏炎(2)关节炎(3)舞蹈病(4)皮下结节(5)环形红斑、结节性或多形性红斑。

一般表现：发热，热型不规则，有面色苍白、食欲差、多汗、疲倦、腹痛等症状。

## 二、A2 型题

1.【正确答案】 C

【答案解析】 浅昏迷是指对语言已完全无反应、对痛觉尚敏感的意识障碍阶段，痛刺激(如压迫眶上神经)时，能用手做简单的防御动作，或有回避动作，或仅能表现皱眉；嗜睡是指病人处于持续睡眠状态，可被唤醒，醒后可正确回答问题和做出各种反应；意识模糊能保持简单的精神活动；昏睡压迫眶上神经、摇动身体等强烈刺激可被唤醒，醒时答话模糊或答非所问；深昏迷对各种刺激均无反应。

2.【正确答案】 B

【答案解析】 病人独居，生有煤炉，神志不清，面色潮红，口唇呈樱桃色，大汗，符合一氧化碳中毒发生条件和临床表现，应考虑病人出现一氧化碳中毒。

3.【正确答案】 B

【答案解析】 甲状腺功能减退患者神经系统的表现：记忆力减退、智力低下、反应迟钝；消化系统表现：畏食、腹胀、便秘、严重者出现粘液水肿；甲状腺功能检

查：血清 TSH 升高，血 FT<sub>4</sub> 降低。  
发生了黏液性水肿昏迷，需要立即进行抢救治疗。

4.【正确答案】D

【答案解析】慢性纤维空洞型肺结核：此型病程最长，由于肺结核未及时发现或治疗不当，空洞壁增厚，空洞长期不愈，病灶出现广泛纤维化。X 线显示一侧或两侧有单个或多个厚壁空洞，伴有支气管播散的病灶及明显的胸膜增厚。

5.【正确答案】D

【答案解析】乳腺囊性增生病为内分泌障碍性增生病，常见于中年女性，机体女性激素代谢障碍，特别是雌、孕激素比例可影响到乳腺实质增生的程度，因月经周期中雌、孕激素比例改变，病人可出现与月经周期有关的周期性乳房胀痛和肿块，多数表现为经前疼痛加重，月经来潮后减轻或消失，分析题干信息与之相符，而其他选项均不符合，故选 D。

6.【正确答案】B

【答案解析】菌血症一般起病急骤，体温 40~41℃，每日波动在 0.5~1.0℃，血细菌培养阳性。

7.【正确答案】B

【答案解析】肛瘘主要表现为肛门周围的外口经常流脓、肛周潮湿、瘙痒。有时外口暂时闭合，瘘管内脓液积聚，出现直肠肛管周围脓肿症状。检查肛周皮肤有乳头状突起或稍凹陷的外口，直肠指检在内口处有轻度压痛，可触及索条状瘘管，挤压时

外口可有脓液流出。

8.【正确答案】C

【答案解析】术后并发症：吻合口瘘的临床表现为：呼吸困难、胸腔积液、全身中毒症状，包括高热、血白细胞计数升高，休克甚至脓毒血症。吻合口瘘多发生在术后 5~10 天，在此期间应密切观察有无上述症状，一旦出现，立即通知医师，并配合处理。

9.【正确答案】C

【答案解析】由于皮质醇使脂肪的动员和合成都得到促进，致使脂肪分布不正常，出现满月脸、水牛背、腹部凸出下坠，躯干明显肥胖。

10.【正确答案】B

【答案解析】预产期的推算方法是：末次月经第 1 日起，月份减 3 或加 9，日期加 7。

11.【正确答案】E

【答案解析】此时因出现胎儿窘迫，宫口已开全，胎先露部已达坐骨棘平面以下 3cm 者，应尽快经阴道娩出胎儿为宜。

12.【正确答案】D

【答案解析】宫缩节律不协调，宫缩时腹痛剧烈，宫底部收缩不强而中段或下段强，宫缩间歇期不能完全松弛，均是子宫收缩不协调的表现。这种宫缩属无效宫缩，不能使宫口扩张和先露下降，故诊断为不协调性子宫收缩乏力。

13.【正确答案】D

**【答案解析】**已经临产 12 小时，S<sup>+</sup>胎膜尚未破，胎心率稍快，可见羊水混浊，胎儿有轻度窘迫的征象，此时应进行人工破膜，加速产程。

14. **【正确答案】** B

**【答案解析】**呼出气体烂苹果味是糖尿病酮症酸中毒的特征性临床症状。

15. **【正确答案】** E

**【答案解析】**急性肾小球肾炎严重表现为急性肾衰竭。急性肾衰竭常表现为少尿或无尿，引起暂时性氮质血症、电解质紊乱和代谢性酸中毒，一般持续 3~5 日，在尿量逐渐增多后，病情好转。

16. **【正确答案】** D

**【答案解析】**肾炎性肾病：发病年龄多在学龄期。水肿一般不严重。

原发性肾病综合征辅助检查：

1. 尿液检查：尿蛋白定性多为(+++)~(++++)，24 小时尿蛋白定量 > 0.05 ~ 0.1g/kg，或随意尿蛋白 (mg/dl)/肌酐 (mg/dl) > 3.5，可有透明管型和颗粒管型，肾炎性肾病者可有红细胞。

2. 血液检查：血浆总蛋白及白蛋白降低，血清白蛋白浓度 < 30g/L，白、球比例 (A/G) 倒置；血胆固醇 > 5.7mmol/L；血沉明显增快；肾炎性肾病者可有血清补体降低，有不同程度的氮质血症。

根据患儿临床表现应为：肾炎性肾病综合征。

17. **【正确答案】** A

**【答案解析】**流感嗜血杆菌：氨苄西林、头

孢呋辛钠、头孢曲松钠等。

肺炎链球菌：青霉素-G、头孢噻肟钠等。

脑膜炎双球菌：青霉素-G。

革兰氏阴性菌：头孢噻肟钠、阿米卡星等。

金黄色葡萄球菌：萘夫西林、氨基糖苷类、头孢噻肟钠、头孢呋辛钠、万古霉素。

新生儿脑膜炎：氨苄西林、头孢呋辛钠、头孢曲松钠。

18. **【正确答案】** B

**【答案解析】**佝偻病激期辅助检查：血生化检测患儿血钙稍降低，血磷明显降低，碱性磷酸酶增高。X 线检查骨骺端临时钙化带消失，呈毛刷样、杯口状改变，骨骺软骨带明显增宽，骨密度减低，可有骨干弯曲或青枝骨折。

佝偻病激期表现有 1. 骨骼改变 2. 运动功能发育迟缓 3. 神经、精神发育迟缓。

三、A3/A4 型题

1. (1) **【正确答案】** E

**【答案解析】**腹胀、食欲减退、恶心、呕吐是右心衰竭最常见的表现，系因胃肠道及肝脏淤血所致；水肿首先出现于身体的低垂部位；颈静脉搏动增强、充盈、怒张是右心衰竭的最主要体征，肝颈静脉反流征则更具特征性。

(2) **【正确答案】** E

**【答案解析】**吗啡可使病人镇静，减少躁动，同时舒张小血管，减轻心脏负荷，常用于急性左心衰竭的治疗；但病人是出现了慢性右心衰竭，故不使用吗啡。

2. (1) **【正确答案】** E

**【答案解析】**病人诉头晕、乏力、心慌、躁

动，应是出现了低血糖，应立即检查的项目是血糖。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 鉴别 1 型和 2 型糖尿病最有意义的指标是胰岛细胞抗体。

3. (1)【正确答案】 E

【答案解析】 呼吸衰竭是各种原因导致的肺通气 and (或) 换气功能严重障碍，以致不能进行有效的气体交换，导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留，而导致一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。在海平面大气压下，于静息条件下呼吸室内空气，并排除心内解剖分流和原发于心排量降低等因素后，动脉血氧分压( $\text{PaO}_2$ ) 低于 60mmHg，或伴有二氧化碳分压( $\text{PaCO}_2$ ) 高于 50mmHg。本例符合呼吸衰竭。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 为明确诊断还需做动脉血气分析。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】 此时最主要的治疗在于纠正缺氧和二氧化碳潴留。

4. (1)【正确答案】 D

【答案解析】 卧床休息时发病提示脑栓塞。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 该病人本次发病最密切相关的病因是房颤。

(3)【正确答案】 E

【答案解析】 缺血性脑血管病要早期溶栓治疗。

(4)【正确答案】 B

【答案解析】 为了防止加重病情，不能用热水袋给病人取暖。

5. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 闭合性气胸多为肋骨骨折断端刺破肺表面，空气进入胸膜腔所致。肺裂口可封闭，空气不再进入。开放性气胸多为锐器或弹片火器伤及胸壁，使胸膜腔与外界相通，空气可随呼吸自由进出胸膜腔。进入气体较多时可出现纵隔扑动，导致循环功能障碍。张力性气胸多为肺泡破裂或较大较深的肺裂伤或支气管破裂，裂口与胸膜腔相通，且形成活瓣状。多根多处肋骨骨折可引起胸壁局部软化。根据其受伤机制判断，故本题选 C。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 胸部 X 线检查方便、简单、经济、显示清楚，还可见观察有无骨折情况。胸部 X 线检查可见伤侧胸膜腔大量积气，肺可完全压缩，气管、纵膈向健侧移位，此题选 D。

(3)【正确答案】 D

【答案解析】 张力性气胸在危急状况下可用一粗针头在伤侧第 2 肋间锁骨中点连线处刺入胸膜腔排气，以降低胸膜腔内压力。

6. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 病人有胆囊结石，结合其临床症状，血清淀粉酶升高，最可能是出现了急性胰腺炎。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 血清钙正常值不低于 2.12mmol/L (8.5mg/dl)；在急性胰腺炎发病后 2 天血钙开始下降，以第 4~5 天后为显著，重型者可降至 2.0mmol/L 以下，提示病情严重，预后不良。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】不宜单独使用吗啡止痛，因其导致 Oddi 括约肌痉挛。

7. (1)【正确答案】 C

【答案解析】内痔主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】Ⅱ期内痔：便血加重，严重时呈喷射状，排便时痔块脱出，但便后能向行回纳。

8. (1)【正确答案】 C

【答案解析】高渗性脱水的病人，血清钠一般高于 150mmol/L。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】重度高渗性脱水的病人有高热，出现神经精神症状，如烦躁不安、躁动、幻觉、昏迷、惊厥等。

(3)【正确答案】 A

【答案解析】高渗性脱水病人不能饮水时，可静脉滴注 5% 葡萄糖液，脱水症状基本纠正，血清钠降低后补充适量的等渗盐水。

9. (1)【正确答案】 C

【答案解析】根据患者烧伤情况，面积分别是头面颈部 9% (3%+3%+3%)，躯干 26% (腹侧 13%+背侧 13%)，双上肢 18% (双手 5%+双前臂 6%+双上臂 7%)，共计 53%。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】患者双上肢呈焦黄色，无水疱，烧伤深度为Ⅲ度，双上肢面积为 18% (双手 5%+双前臂 6%+双上臂 7%)。

10. (1)【正确答案】 B

(2)【正确答案】 D

(3)【正确答案】 C

11. (1)【正确答案】 B

【答案解析】“糖尿病”病史、白色稠厚豆腐渣样白带，诊断为外阴阴道假丝酵母菌病（霉菌性阴道炎）。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】阴道分泌物悬滴检查是在玻片滴 10% 氢氧化钾与少许阴道分泌物混合，在光镜下检查，见到白色假丝酵母菌芽孢和菌丝即可确诊霉菌性阴道炎。

(3)【正确答案】 B

【答案解析】制霉菌素是治疗霉菌性阴道炎的首选药物。

(4)【正确答案】 B

【答案解析】由于霉菌性阴道炎病人阴道内 pH 偏酸，因此用 2%~4% 碳酸氢钠阴道灌洗或坐浴可提高疗效。

12. (1)【正确答案】 D

【答案解析】胎盘早剥以突然发生的腹部持续性疼痛为特点，伴或不伴有阴道出血。重度胎盘早剥贫血程度与外出血量不相符，子宫硬如板状，有压痛。

(2)【正确答案】 A

【答案解析】胎盘早剥一旦确诊，应及时终止妊娠。

13. (1)【正确答案】 E

【答案解析】皮肤黏膜淋巴结综合征又称川崎病，是一种以变态反应性全身血管炎为主要病理改变的急性发热出疹性小儿疾病。临床特点为急性发热、皮肤黏膜病损和淋巴结肿大。

(2)【正确答案】 B

**【答案解析】** 心血管症状是川崎病最严重的表现，心肌梗死和巨大冠状动脉瘤可导致心源性休克甚至猝死，心肌梗死是主要死因。

14. (1) **【正确答案】** C

**【答案解析】** 皮肤紫癜，常为过敏性紫癜的首发症状，几乎所有患儿均见典型皮肤紫癜，常见于下肢和臀部，以下肢伸面为多，对称分布，严重者累及上肢、躯干，面部少见；有半数患儿可出现消化道症状，多出现在皮疹发生一周内，亦可发生于紫癜出现之前。患儿突发腹痛，腹痛位于脐周或下腹部，伴恶心、呕吐或便血。

(2) **【正确答案】** D

**【答案解析】** 皮质激素能缓解腹痛和关节痛，能有效缓解免疫损伤，解除肠道痉挛，减轻肠壁水肿，因此，对腹型紫癜最有效。

15. (1) **【正确答案】** E

**【答案解析】** 肺炎并发心力衰竭时主要表现为呼吸困难加重，呼吸加快( $>60$ 次/min)，烦躁不安，面色苍白或发绀，心率增快(婴儿 $>180$ 次/min，幼儿 $>160$ 次/min)，心音低钝或出现奔马律，肝脏迅速增大等。

(2) **【正确答案】** B

**【答案解析】** 若患儿突然口吐粉红色泡沫痰，应考虑肺水肿，可给患儿吸入经20%~30%酒精湿化的氧气，间歇吸入，每次吸入不宜超过20分。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



## 《专业实践能力》仿真密卷答案与解析

### 一、A1 型题

#### 1. 【正确答案】 C

【答案解析】 非甾体抗炎药是本病不可缺少的非特异性的对症治疗药物。能控制关节肿胀、晨僵和发热等症状，常用的药物有阿司匹林、布洛芬等。

#### 2. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性肾小球肾炎水肿期，应限制水和钠盐的摄入，限制蛋白质的入量，供给高糖饮食以满足热量的需求。

#### 3. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性期患者应绝对卧床休息，以增加肾血流量和尿量，改善肾功能，减少血尿、蛋白尿。症状明显者，嘱其卧床 4~6 周。

#### 4. 【正确答案】 C

【答案解析】 肌力的分级是对瘫痪患者进行评估的重要内容。其中，0 级：完全不能动，无肌肉收缩；1 级：可见或仅在触摸中感到肌肉轻微收缩，但不能牵动关节肢体运动；2 级：肢体能够在床上移动，但不能抬起肢体；3 级：肢体能克服地心引力，可以抬高，离开床面，但不能抗阻力；4 级：肢体稍能抗阻力运动；5 级：正常肌力。

#### 5. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性胰腺炎的病因在国内以胆道疾病多见，故预防急性胰腺炎有重要意义的措施是防治胆道疾病。

#### 6. 【正确答案】 C

【答案解析】 长期家庭氧疗的指征中不包括  $\text{SaO}_2 90\%$ ， $\text{PaCO}_2 40\text{mmHg}$ 。

#### 7. 【正确答案】 A

【答案解析】 心率低于 60 次/分应暂停给药。

#### 8. 【正确答案】 C

【答案解析】 白血病化疗期间大量白血病细胞被破坏，血液及尿液中尿酸浓度可明显增高，可产生尿酸性肾结石，严重者致肾衰竭，故给予别嘌醇以抑制尿酸合成。

#### 9. 【正确答案】 A

【答案解析】 一氧化碳中毒患者需使颈部伸展，保持呼吸道通畅。应迅速用鼻导管给高浓度氧（60%），流量 8~10L/min，有条件可用高压氧舱治疗。呼吸停止者应做人工呼吸，必要时做气管切开。

#### 10. 【正确答案】 B

【答案解析】 肝性脑病目前尚无特效疗法，因此在护理过程中应重点去除和避免诱发因素，减少氨对中枢神经系统的毒性作用。

肝性脑病的诱发因素很多，包括上消化道出血、应用催眠镇静药、感染、快速利尿和大量放腹水、便秘等。

11.【正确答案】D

【答案解析】此病人心肌炎合并三度房室传导阻滞，出现阿-斯综合征，安置临时起搏器是最恰当的治疗，可保证心排血量，保证重要器官的灌注。

12.【正确答案】C

【答案解析】氯丙嗪可以抑制体温调节中枢，扩张血管加速散热，降低器官代谢及耗氧。但是氯丙嗪可导致血压下降。因此在监测体温的同时，要注意血压的变化。

13.【正确答案】D

【答案解析】肝昏迷病人出现便秘时应用肥皂水灌肠或导泻时，可使大量血氨通过肠黏膜入血，导致血气增高，透过血脑脊液屏障，从而加重肝性脑病。

14.【正确答案】A

【答案解析】晨僵是类风湿关节炎突出的临床表现，是反映滑膜炎的一个指标。持续时间往往超过 1 小时，活动后可减轻。晚上睡眠时要保暖，起床后可用热水浸泡僵硬的关节，应活动关节，避免长时间不动。

15.【正确答案】D

【答案解析】急性胰腺炎病人应卧床休息，并协助病人选择舒适卧位，如弯腰、屈膝侧卧，以减轻疼痛。

16.【正确答案】E

【答案解析】肾功能不全患者在使用 ACEI 时会导致高血钾，如血钾过高会导致心脏停搏，因此要特别注意监测。

17.【正确答案】E

【答案解析】腰椎间盘突出症病人手术后常见并发症为神经根粘连和肌肉萎缩。手术后尽早开始指导病人做直腿抬高练习，以防止神经根粘连。

18.【正确答案】D

【答案解析】血栓闭塞性脉管炎病人应严禁吸烟，以消除烟碱对血管的刺激。避免患肢受寒，不要让肢体末端暴露在寒冷环境中。同时注意保持患肢清洁，防止外伤。适当保暖可使血管扩张，促进血液循环。但因末梢神经对热敏感性降低，不可直接使用热水袋，以免引起烫伤。若要使四肢保暖，应穿棉脚套，将热水袋放于腹部，使血流增加，反射性扩张四肢血管。

19.【正确答案】E

【答案解析】维生素 K 可预防出血。

20.【正确答案】E

【答案解析】心跳停止时，患者脉搏扪不清、血压测不到、大动脉波动消失，但作为急救时的诊断主要依据大动脉搏动消失。

21.【正确答案】C

【答案解析】病人出现典型的脑疝症状，应立即静脉快速输入高渗脱水药，争取时间尽快手术，去除病因。

22.【正确答案】C

【答案解析】成年病人人工循环与人工呼吸同时进行，不论单人抢救还是双人抢救，人工循环与人工呼吸的比例为 30：2，即心脏按压 30 次，吹气 2 次。

23.【正确答案】D

【答案解析】肌肉注射吗啡属于止痛的措施，并不能改善血栓闭塞性脉管炎病人肢体的血液循环。

24.【正确答案】C

【答案解析】多数乳房疾病是由病人自己发现的，定期的乳房自查有助于及早发现乳房的病变。检查最好在月经结束后的 2~3 日或选在月经周期的第 7~10 日。

25.【正确答案】D

【答案解析】预防逆行性颅内感染，具体措施有：①每天 2 次清洁、消毒鼻前庭或外耳道，避免棉球过湿导致液体逆流颅内；②在外耳道口或鼻前庭疏松放置干棉球，棉球渗湿及时更换，并记录 24 小时浸湿的棉球数，以此估计漏出液量；③禁忌鼻腔、耳道的堵塞、冲洗和滴药，脑脊液鼻漏者，严禁经鼻腔置胃管、吸痰及鼻导管给氧；④避免用力咳嗽、打喷嚏、擤鼻涕及用力排便，以免颅内压骤然升降导致气颅；⑤禁忌做腰椎穿刺；⑥按医嘱应用抗生素和破伤风抗毒素，预防颅内感染。

26.【正确答案】E

【答案解析】脊柱骨折患者的急救搬运应注意保持患者身体轴线平直，所以应选择三人平托放于硬板搬运。

27.【正确答案】B

【答案解析】侵蚀性葡萄胎以化疗为主，手术为辅。

28.【正确答案】E

【答案解析】胎膜早破，胎先露尚未衔接者应采用头低足高位。

29.【正确答案】E

【答案解析】预防急性乳腺炎，首先要避免积乳；保持正确的哺乳方法，清洗乳头；防止乳头外伤；纠正乳头凹陷。另外注意小儿的口腔卫生，不要让小儿含着乳头睡觉；断乳时要逐渐减少哺乳次数，再行断乳。

30.【正确答案】A

【答案解析】外阴炎患者局部坐浴时注意溶液浓度、温度及坐浴时间，避免烧伤、烫伤，月经期免做。

31.【正确答案】B

【答案解析】胎膜早破，胎先露部未衔接者绝对卧床休息，侧卧位，抬高臀部，以防脐带脱垂。

32.【正确答案】C

【答案解析】羊水栓塞的产科处理原则上应在患者呼吸循环功能得到明显改善，并已纠正凝血功能障碍后再处理分娩。第一产程发病者应立即考虑行剖宫产结束分娩；第二产程发病者可根据情况经阴道助产结束分娩；对一些无法控制的子宫出血可考虑同时行子宫切除术；中期妊娠钳刮术中

或于羊膜腔穿刺时发生者应立即终止手术，进行抢救；发生羊水栓塞时如正在滴注缩宫素应立即停止。

33.【正确答案】 B

【答案解析】 急性期病人绝对卧床休息 2~3 周以减少并发症。高热时给予适当物理降温，但忌用冷水或酒精擦浴。

34.【正确答案】 D

【答案解析】 新生儿窒息药物治疗：建立有效的静脉通路，首选脐静脉，保证药物及时进入体内。

35.【正确答案】 E

【答案解析】 光疗箱：一般采用波长 450nm 的蓝色荧光灯最为有效。

36.【正确答案】 B

【答案解析】 知觉为人对事物各种属性的综合反映。知觉的发育与听、视、触等感觉的发育密切相关。

37.【正确答案】 C

【答案解析】 需做腰穿的患儿，在穿刺前先向家长说明检查脑脊液的目的，强调检查的安全性，消除恐惧心理；穿刺后嘱家长让患儿去枕平卧 6 小时，以防发生头痛。

38.【正确答案】 D

【答案解析】 腋-肛温差为负值的为重度患儿，先将患儿置于比肛温高 1~2℃ 的暖箱中，并逐步提高暖箱的温度，每小时升高 1℃，每小时监测肛温、腋温 1 次，于 12~24 小时恢复正常体温。

39.【正确答案】 B

## 二、A2 型题

1.【正确答案】 D

【答案解析】 患者自述注射胰岛素后 4~5 小时，有头晕、心悸、软多汗、软弱无力感，此时，该患者最可能出现了低血糖反应。

2.【正确答案】 E

【答案解析】 过敏性紫癜：急性期应卧床休息。不要食用易引起过敏的鱼、虾、牛奶等，多吃蔬菜、水果。

3.【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查慢性肾小球肾炎的治疗。慢性肾小球肾炎的主要目的是防止或延缓肾功能的恶化，高血压是慢性肾炎进展、肾功能恶化的重要诱因。本病例中高血压是病情恶化的诱因，因此控制高血压是最佳措施。

4.【正确答案】 E

【答案解析】 患者出现一氧化碳中毒，抢救时最主要的措施是立即脱离中毒环境，将患者搬到室外空气新鲜处。

5.【正确答案】 B

【答案解析】 若强行还纳从腹腔脱出的肠管可加重腹腔污染。因此应用消毒碗覆盖脱出物，初步包扎伤口后迅速转送手术室，在麻醉下进行还纳。

6.【正确答案】 C

【答案解析】 该病人受伤的原因为骑跨伤，

骑跨伤最容易造成男性前尿道损伤，该病人表现有阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血提示出现了前尿道损伤。

7.【正确答案】A

【答案解析】病人肠修补术后肠蠕动未恢复，腹胀明显，最重要的护理措施应能减轻腹胀，改善肠壁血液循环，故最重要的措施应是胃肠减压。

8.【正确答案】B

【答案解析】脑震荡病人在伤后立即出现短暂的意识丧失，一般持续时间不超过 30 分钟，同时伴有面色苍白、出冷汗、血压下降、脉缓、呼吸浅慢，各生理反射迟钝或消失。意识恢复后，对受伤时甚至受伤前一段时间内的情况不能回忆，而对往事记忆清楚，此被称为逆行性健忘。

9.【正确答案】D

【答案解析】绝对卧床休息 2~4 周，即使血尿消失，仍需继续卧床休息至预定时间。

10.【正确答案】D

【答案解析】甲状腺危象：是甲亢的严重并发症，多发生于术后 12~36 小时，主要表现为高热(>39℃)、脉快(>120 次/分)、大汗、烦躁不安、谵妄，甚至昏迷，常伴有呕吐、腹泻。

11.【正确答案】B

【答案解析】胸腔手术后，胸腔内每小时血性引流液持续超过 100ml 才提示有活动性出血，根据该患者引流出液体颜色及患者

生命体征无明显改变，可知出血为陈旧性。

12.【正确答案】A

【答案解析】会阴护理：做好外阴的清洁卫生，预防感染，促进伤口愈合，增加产妇舒适感。每日用 0.02% 碘伏液冲洗外阴两次，垫消毒会阴垫。冲洗外阴时，观察伤口情况，水肿严重者局部可用 50% 硫酸镁湿热敷，每日 2~3 次，每次 20 分钟。如有侧切伤口，采取健侧卧位，勤换会阴垫。女患者在月经期、妊娠末期、产后两周、阴道出血、盆腔器官有急性炎症时，不宜坐浴。

13.【正确答案】C

【答案解析】妊娠 36 周孕妇，出现腹痛、阴道流血来诊，诊断为胎盘早剥。为了防止休克及进一步治疗，应立即建立静脉通道。

14.【正确答案】D

【答案解析】患者为轻度子痫前期，食盐不必限制，长期低盐饮食易发生产后血循环衰竭，若全身水肿应限制食盐，左侧卧位可减轻子宫对腹主动脉、下腔静脉的压迫，使回心血量增加，改善血液循环，改善子宫胎盘的供血，增加对胎儿的供血量，有利于胎儿的生长发育。

15.【正确答案】D

【答案解析】雌激素替代治疗的副作用除服用性激素引起的乳房胀痛、水肿、色素沉着以外，还可有增加子宫内膜癌的危险性。选择 D 错误。

16.【正确答案】 B

【答案解析】 题干信息提示胎背位于母体腹部右前方，且四步触诊结果示子宫底部为圆而硬的胎头，耻骨联合上方触到宽而软的不规则的胎臀，即胎先露为臀先露。臀先露时胎心音在脐上方右侧或左侧，还应清楚胎心音在靠近胎背侧上方的孕妇腹壁上听得最清楚，故正确答案是选项 B。

17.【正确答案】 B

【答案解析】 此病例考虑为血栓性静脉炎，应嘱患者卧床休息，抬高患肢。

18.【正确答案】 E

【答案解析】 肺炎并发中毒性脑病至今尚无可靠的诊断方法，在确认肺炎后出现下列症状与体征者，可考虑为中毒性脑病：①烦躁、嗜睡、眼球上窜、凝视；②球结膜水肿，前凶隆起；③昏睡、昏迷、惊厥；④瞳孔改变：对光反应迟钝或消失；⑤呼吸节律不整，呼吸心跳解离（有心跳，无呼吸）；⑥有脑膜刺激征，脑脊液检查除压力增高外，其他均正常。在肺炎的基础上，除外高热惊厥、低血糖、低血钙及中枢神经系统感染（脑炎、脑膜炎），如有①~②项则提示脑水肿，伴其他一项以上者可确诊。

19.【正确答案】 A

【答案解析】 原发性血小板减少性紫癜健康指导：①指导预防损伤，如不做剧烈的、有对抗性的游戏，不玩尖锐的玩具，常剪指甲，用软毛牙刷等；②指导进行自我保护，如忌服阿司匹林类药物，服药期间不与感染病人接触，去公共场所时戴口罩，

衣着厚薄适度，尽量避免感冒等；③教会家长识别出血征象和学会压迫止血方法。

20.【正确答案】 D

【答案解析】 新生儿破伤风起病初期，患儿烦躁不安，咀嚼肌先受累，张口及吸吮困难，随后牙关紧闭，面肌痉挛，口唇皱缩、口角上牵，出现苦笑面容，此表现为本病主要特征。

21.【正确答案】 E

【答案解析】 重度营养不良患儿清晨容易出现低血糖，表现出汗、肢冷、脉弱、血压下降等休克表现及呼吸暂停，需立即静脉注射 25% 的葡萄糖溶液进行抢救。

22.【正确答案】 D

【答案解析】 口腔黏膜上腭中线两侧有黄白色隆起，称“上皮珠”，在牙龈上者俗称“马牙”，是上皮细胞堆积或黏液腺分泌物潴留所致。切勿挑破以免感染。

23.【正确答案】 B

【答案解析】 室间隔缺损治疗：内科治疗强心、利尿、抗感染、扩张血管及对症治疗。现患儿最主要的临床症状是肺炎，所以应重点控制感染。

三、A3/A4 型题

1. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 根据患者的既往病史和血气分析结果显示均判断是 II 型呼吸衰竭。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 呼吸衰竭病人随着 CO<sub>2</sub> 潴留的加重导致 CO<sub>2</sub> 麻醉发生肺性脑病，则表现神

志淡漠，甚至谵妄、间歇抽搐、扑翼样震颤、视乳头水肿、昏睡、昏迷等，重者可能因肺水肿、脑疝、累及脑干时抑制呼吸而死亡。

(3)【正确答案】 E

【答案解析】 呼吸衰竭治疗原则应是低流量、低浓度吸氧。

(4)【正确答案】 A

【答案解析】 对Ⅱ型呼吸衰竭病人应给予低浓度、低流量鼻导管持续吸氧，以免缺氧纠正过快引起呼吸中枢抑制。

2. (1)【正确答案】 A

【答案解析】 根据患者的表现和发作病史，且双肺布满广泛哮鸣音，应判断是支气管哮喘。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 支气管哮喘重度：呈端坐呼吸；单字讲话；常有焦虑、烦躁；大汗淋漓；呼吸频率 $>30$ 次/分；脉率 $>120$ 次/分。故判断该病人是重度哮喘。

(3)【正确答案】 B

【答案解析】 茶碱类静脉注射浓度不宜过高，速度不宜过快，注射时间应在10分钟以上，以防中毒症状发生，与西咪替丁、大环内酯类、喹诺酮类药物等合用时可影响茶碱代谢而排泄减慢，应减少用量。

3. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 根据患者的高血压、糖尿病病史，在情绪激动时发病，且出现了典型的“三偏征”，脑脊液检查呈均匀血性，应首先判断是脑出血。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 目前降颅压的首选药为20%甘

露醇。

(3)【正确答案】 B

【答案解析】 脑出血患者应绝对卧床休息，病人侧卧位，头部稍抬高，以免颅内静脉回流，从而减轻脑水肿。

4. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 代谢性碱中毒的主要病因之一是胃液丧失过多。酸性胃液大量丢失，例如严重呕吐、长期胃肠减压等。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 热水袋热敷会加快组织氧耗，使组织缺氧症状加重，病情恶化。

5. (1)【正确答案】 E

【答案解析】 患者头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT检查示颅骨线性骨折，由此可推断出患者颅内压增高；成人正常颅内压为 $70\sim 200\text{mmHg}$ ，所以颅内压至少高于 $200\text{mmHg}$ 。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 小脑幕切迹疝临床表现：颅内压增高；左右瞳孔不等大、患侧对光反射消失；运动障碍；意识改变，出现嗜睡、浅昏迷甚至深昏迷；生命体征紊乱。

(3)【正确答案】 B

【答案解析】 一旦确诊为小脑幕切迹疝，应立即紧急降低颅内压。立即静脉快速输入甘露醇、地塞米松、呋塞米等，以暂时降低颅内压；同时紧急做好术前检查和手术前准备，密切观察生命体征、瞳孔的变化。对呼吸功能障碍者，立即气管插管进行辅助呼吸。

6. (1)【正确答案】 D

【答案解析】根据题干信息应考虑患者发生了胃肠道穿孔性疾病。

(2)【正确答案】D

【答案解析】对于腹部急腹症，应四禁：禁进食，禁灌肠，禁用腹泻药，禁用解痉止痛药。

7. (1)【正确答案】E

【答案解析】患儿石膏固定仅3小时，一般不会出现压疮和化脓性皮炎，通过时间可将A、C排除，石膏综合征多发生于胸部石膏固定，B选项暂排除。患儿出现手部苍白、发凉，桡动脉搏动减弱、疼痛等典型的血供障碍的症状，为骨筋膜室综合征的主要表现，则高度怀疑患儿出现了骨筋膜室综合征。此征多因骨折早期在肢体明显肿胀的情况下包上管型石膏，使伤肢在硬壳石膏内受到挤压，加重血供障碍所致。

(2)【正确答案】D

【答案解析】由上题可知，骨筋膜室综合征多因骨折早期在肢体明显肿胀的情况下包上管型石膏，使伤肢在硬壳石膏内受到挤压，加重血供障碍所致，因此此时应立即松解外固定，严重者应切开减压。

(3)【正确答案】C

【答案解析】骨筋膜室综合征发生后，骨筋膜内压力增高，血流中断，肢体缺血、坏死，若不能及时有效处理，最可能导致患者出现缺血性肌挛缩。

8. (1)【正确答案】E

【答案解析】全程肉眼血尿+肾部分充盈缺损首先考虑的诊断是肾癌。

(2)【正确答案】C

【答案解析】肾癌的确诊检查是肾组织

活检。

(3)【正确答案】E

【答案解析】肾癌治疗原则：以手术为主，手术方法包括：部分肾切除术，根治性肾切除术。

9. (1)【正确答案】D

【答案解析】胎盘因素导致的出血，多在胎儿娩出数分钟后出现大量阴道流血，胎盘因素导致的大出血要及时将胎盘取出。

(2)【正确答案】B

【答案解析】子宫收缩乏力导致的出血常表现为胎盘娩出后阴道大量出血，血压低，脉细速。

10. (1)【正确答案】C

【答案解析】两次或两次以上空腹血糖 $\geq 7\text{mmol/L}$ 者，可诊断GDM，该孕妇空腹血糖 $7\text{mmol/L}$ ，尿糖(++)，最可能的诊断为妊娠期糖尿病。

(2)【正确答案】C

【答案解析】若血糖控制不良，伴有严重的合并症或并发症，如重度子痫前期、心血管病变、酮症酸中毒、胎儿宫内生长受限、胎儿窘迫等情况下，则在促进胎儿肺成熟后立即终止妊娠。该孕妇NST发现为无反应型，胎心率每分钟 $114\sim 123$ 次，考虑出现胎儿宫内窘迫，空腹血糖为 $6.2\text{mmol/L}$ ，控制不良，应立即终止妊娠。

(3)【正确答案】E

【答案解析】此新生儿没有插管指征，选项E不作为必要处理措施。

11. (1)【正确答案】C

【答案解析】患者有44天停经史，结合妇

科检查见阴道内有少许暗红色血液，宫颈举痛明显，后穹窿饱满，可以诊断其为异位妊娠破裂。

(2)【正确答案】 E

【答案解析】 后穹窿穿刺抽出不凝血是诊断异位妊娠破裂的方法。

(3)【正确答案】 E

【答案解析】 对该患者提供的护理措施应是严密观察生命体征和神志变化，患者立即取平卧位，开放静脉通道，在抗休克的同时进行术前准备。急诊手术，无须术前常规灌肠。

12. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 患儿因急性肺炎入院即存在颅外感染，体温 39℃，提示出现高热，突然发生意识丧失，眼球上翻，四肢出现强直性或阵挛性抽动为惊厥的典型表现，故该患儿最可能的诊断是高热惊厥。

(2)【正确答案】 B

【答案解析】 惊厥的患儿应尽量减少一切刺激，如声、光、触动等。

13. (1)【正确答案】 C

【答案解析】 原发综合征由肺部原发病灶、

肿大的淋巴结和两者相连的发炎淋巴管组成，X 线胸片呈典型哑铃“双极影”。

(2)【正确答案】 C

【答案解析】 无明显自觉症状的原发型肺结核以 INH 为主，配合 RFP+EMB，疗程 9~12 个月。活动性原发型肺结核宜采用直接督导下短程化疗。

14. (1)【正确答案】 B

【答案解析】 重点信息，患儿有饮食不洁史，继而出现高热、呕吐、面色苍白，四肢冰冷，神志不清，可以诊断中毒性细菌性痢疾。

(2)【正确答案】 D

【答案解析】 从粪便标本中培养出痢疾杆菌是确诊中毒性细菌性痢疾最直接的证据。送检标本应注意做到尽早、新鲜、选取黏液脓血部分多次送检，以提高检出率。

(3)【正确答案】 E

【答案解析】 中毒性细菌性痢疾防治循环衰竭应扩充血容量，维持水电解质平衡，可用等张含钠液或 5% 右旋糖酐-40 溶液扩容和疏通微循环，用 5% 碳酸氢钠溶液纠正酸中毒，用莨菪碱类药物或多巴胺解除微循环痉挛，根据心功能情况使用毛花苷 C。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网  
www.med66.com

医学教育网（[www.med66.com](http://www.med66.com)）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App