



中医助理医师第一单元

一、A1

1、“寒从中生”中“寒”的特点是

- A、多为实寒
- B、以寒为主
- C、恶寒憎热
- D、虚而有寒
- E、面色青紫

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 阳虚阴盛之寒从中生，与外感寒邪之外寒的区别是：“内寒”的临床特点主要是虚而有寒，以虚为主；“外寒”的临床特点是以寒邪为主，多为实寒。

【您的答案】 B

【答案错误，得分：0】

2、痰饮流注于经络，则可见

- A、肢体麻木
- B、恶心呕吐
- C、胸闷心痛
- D、胸闷气喘
- E、胸胁胀满

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痰饮通常称为有形实邪，其随气流行，或停滞于经脉，或留滞于脏腑。若流注经络，可致经络阻滞，气血运行不畅，出现肢体麻木、屈伸不利，甚则半身不遂等。若结于局部，可形成瘰疬痰核、阴疽流注等。

3、五脏六腑的病理特点及治疗原则是

- A、脏病多虚，五脏宜补
- B、脏病多实，五脏宜泻
- C、腑病多虚，六腑宜泻
- D、腑病多实，六腑宜补
- E、脏病多实，五脏宜补

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 一般说来，病理上“脏病多虚”，“腑病多实”；治疗上“五脏宜补”，“六腑宜泻”。



4、五行关系中“见肝之病，知肝传脾”是指

- A、木侮土
- B、木生土
- C、木克土
- D、木疏土
- E、木乘土

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 《难经》说的“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气”和《金匮要略》说的“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，是指根据五行学说指导控制疾病的传变。肝的病变传及于脾，属于木乘土。

5、足手阴经的交接部位是

- A、肩胛部
- B、头面部
- C、胸部
- D、背部
- E、四肢部

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 足手阴经在胸部交接，如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中；足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中；足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

6、下列哪项是小肠的主要生理功能

- A、主液
- B、主津
- C、主腐熟水谷
- D、主统血
- E、主运化

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 大肠主津；小肠主液；脾主运化，主统血；胃主受纳腐熟水谷。

7、脾的阴阳属性是

- A、阳中之阳
- B、阳中之阴

- C、阴中之阴
- D、阴中之阳
- E、阴中之至阴

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 《素问·金匱真言论》说：“背为阳，阳中之阳，心也；背为阳，阳中之阴，肺也。腹为阴，阴中之阴，肾也；腹为阴，阴中之阳，肝也；腹为阴，阴中之至阴，脾也。”

8、风邪的致病特点是

- A、易伤气血
- B、易伤津液
- C、易伤阳气
- D、易袭阳位
- E、易致肿疡

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 风性轻扬开泄，易袭阳位：风邪具轻扬、向上、向外特性。开泄，指风邪伤人易使腠理不固而汗出。故风邪侵袭，常伤及人体的上部（头、面）和肌表，易出现头痛、汗出、恶风、咽痒咳嗽等症。

9、元气运行的道路是

- A、脉外
- B、三焦
- C、心脉
- D、胸腔
- E、全身

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 部位三焦的总体生理功能有二：一是通行诸气，即部位三焦是一身之气上下运行的通道。肾精化生的元气，自下而上运行至胸中，布散于全身；胸中气海的宗气，自上而下达于脐下，以资先天元气。二是运行津液，即部位三焦是全身津液上下输布运行的通道。

10、用补益药物治疗具有闭塞不通症状的虚证，其治则是

- A、塞因塞用
- B、攻补兼施
- C、实者泻之

- D、虚者补之
- E、通因通用

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 塞因塞用，即以补开塞，是指用补益药物来治疗具有闭塞不通症状的虚证。适用于“至虚有盛候”的真虚假实证。

11、“阴阳离决，精气乃绝”阐述的阴阳关系是

- A、阴阳消长
- B、阴阳交感
- C、阴阳转化
- D、阴阳对立
- E、阴阳互根

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。如果由于某些原因，阴和阳之间的互根关系遭到破坏，就会导致“独阴不生，独阳不生”，甚则“阴阳离决，精气乃绝”而死亡。

12、木火刑金属于

- A、母病及子
- B、相乘传变
- C、相侮传变
- D、子病犯母
- E、制化传变

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 五行相侮，是指五行中一行对其所不胜的反向制约与克制。正常为金克木，由于金不足或木太过，使金受到木的反向制约或克制，则出现木侮金的相侮传变。

13、下列与脑、髓、肾关系密切的是

- A、督脉
- B、带脉
- C、任脉
- D、冲脉



E、维脉

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 督脉循行于脊柱后面，入颅络脑，分支属肾，肾能藏精生髓，脑为髓海，故督脉与脑、髓和肾的功能活动有着密切的联系。

14、下列各项，不属肝主疏泄功能的是

- A、促进脾胃的运化
- B、促进血液运行
- C、调畅气机
- D、调畅情志
- E、促进骨骼发育

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肝主疏泄，是指肝气具有疏通、畅达全身气机，进而促进精血津液的运行输布、脾胃之气的升降、胆汁的分泌排泄以及情志的舒畅等作用。E 是肾的生理功能。

15、目的视觉功能主要取决于

- A、肾阳的蒸化
- B、肾阴的滋养
- C、肾中精气的充盈
- D、肝血的充足
- E、脾气的健运

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 目之所以具有视物功能，依赖肝血之濡养和肝气之疏泄。肝的经脉上连目系，肝之血气循此经脉上注于目，使其发挥视觉作用。肝血充足，肝气调和，目才能正常发挥其视物辨色的功能。

16、肝藏血与脾统血共同发挥的生理功能是

- A、统摄血液
- B、防止出血
- C、贮藏血液
- D、化生血液
- E、调节血量

【隐藏答案】



【正确答案】 B

【答案解析】 肝藏血，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。脾主统血，是指脾气有统摄、控制血液在脉中正常运行而不溢出脉外（即防止出血）的功能。肝、脾两脏中其共同的生理功能是防止出血。

17、能清泻三焦火邪的药物是

- A、栀子
- B、知母
- C、石膏
- D、天花粉
- E、夏枯草

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 栀子性能：苦，寒。归心，肺，三焦经。本品苦寒清降，能清泻三焦火邪、泻心火而除烦，为治热病心烦、躁扰不宁之要药。

18、功效为补益肝肾、收敛固涩的药物是

- A、芡实
- B、莲子
- C、山茱萸
- D、海螵蛸
- E、桑螵蛸

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 山茱萸功效：补益肝肾，收敛固涩。

芡实功效：益肾固精，健脾止泻，除湿止带。

莲子功效：益肾固精，补脾止泻，止带，养心安神。

海螵蛸功效：固精止带，收敛止血，制酸止痛，收湿敛疮。

桑螵蛸功效：固精缩尿，补肾助阳。

19、浮小麦的功效是

- A、益气除热
- B、收敛固涩
- C、益气生津
- D、补肾宁心
- E、敛肺止咳

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 浮小麦功效: 固表止汗, 益气, 除热。

20、防己的主治病证不包括哪项

- A、水肿
- B、脚气
- C、高血压
- D、湿疹疮毒
- E、湿热黄疸

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 防己主治病证: 风湿痹证; 水肿, 小便不利, 脚气; 湿疹疮毒; 高血压。选项 E 中内容为秦艽的主治病证。故根据题干要求, 最佳的选项是 E。

21、下列哪项不属于大黄的功效

- A、泻下攻积
- B、清热泻火
- C、凉血解毒
- D、逐瘀通经
- E、润燥软坚

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 大黄功效: 泻下攻积, 清热泻火, 凉血解毒, 逐瘀通经。选项 E 中润燥软坚属于芒硝的功效。故根据题干要求, 此题的最佳选项是 E。

22、艾叶除了具有温经止血、散寒调经之功效外, 还兼有

- A、止痢
- B、截疟
- C、安胎
- D、补虚
- E、利尿

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 艾叶功效: 温经止血, 散寒调经, 安胎。

23、功效具有凉血止血、清肝泻火的药物是

- A、小蓟
- B、大蓟

- C、地榆
- D、槐花
- E、侧柏叶

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 槐花功效：凉血止血，清肝泻火。

侧柏叶功效：凉血止血，化痰止咳，生发乌发。

地榆功效：凉血止血，解毒敛疮。

大蓟功效：凉血止血，散瘀解毒消痈。

小蓟功效：凉血止血，散瘀解毒消痈。

24、治疗外感风热，发热，微恶寒，头痛，咽喉肿痛，兼胸闷肋肋胀痛，应首选

- A、薄荷
- B、葛根
- C、蝉蜕
- D、牛蒡子
- E、升麻

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 薄荷功效：疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气。

25、下列药物中，不具有行气，止痛功效的药物是

- A、郁金
- B、白前
- C、三棱
- D、姜黄
- E、川芎

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 白前功效：降气化痰。

26、金钱草具有的功效是

- A、清肺化痰
- B、泄热通便
- C、解毒消肿
- D、清热解暑
- E、清肺润燥

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 金钱草功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

27、除哪项外均有下乳作用

- A、山楂
- B、穿山甲
- C、王不留行
- D、通草
- E、漏芦

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 山楂功效：消食化积，行气散瘀。

28、下列具有平肝疏肝功效的是

- A、薄荷
- B、柴胡
- C、刺蒺藜
- D、菟丝子
- E、钩藤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 刺蒺藜功效：平肝疏肝，祛风明目。

柴胡功效：解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

薄荷功效：疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气。

菟丝子功效：补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。

钩藤功效：清热平肝，息风定惊。

29、咽喉红肿疼痛，兼有肺热咳嗽、痰多者，治疗应首选

- A、贯众
- B、大血藤
- C、玄参
- D、白头翁
- E、射干

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 射干功效: 清热解毒, 消痰, 利咽。主治病证: 咽喉肿痛; 痰盛咳喘。

30、山药具有的功效为

- A、托毒生肌
- B、生津养血
- C、祛痰止咳
- D、补气燥湿
- E、益气养阴

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 山药功效: 益气养阴, 补脾肺肾, 固精止带。

31、下列属于白豆蔻、肉豆蔻的共同功效是

- A、温中止呕
- B、温肾助阳
- C、涩肠止泻
- D、化湿行气
- E、温中行气

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肉豆蔻与白豆蔻: 两药均能温中行气, 可用治虚寒气滞, 脘腹胀痛、食少呕吐。但肉豆蔻长于涩肠止泻, 又能温中暖脾, 适用于脾肾虚寒或脾胃虚寒久泻不止之证。白豆蔻主治湿滞中焦, 胃寒气滞之呕吐, 长于芳香化湿。

肉豆蔻功效: 涩肠止泻, 温中行气。

白豆蔻功效: 化湿行气, 温中止呕。

32、具有化湿和胃, 开窍宁神功效的药物是

- A、苏合香
- B、石菖蒲
- C、牛黄
- D、冰片
- E、麝香

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 苏合香功效: 开窍醒神, 辟秽止痛。

石菖蒲功效: 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智

牛黄功效: 化痰开窍, 凉肝息风, 清热解毒。

冰片功效: 开窍醒神, 清热止痛。

麝香功效: 开窍醒神, 活血通经, 消肿止痛, 催生下胎。

33、干咳无痰, 气逆而喘, 头痛身热, 咽喉干燥, 鼻燥, 胸满胁痛, 舌干少苔, 脉虚大或数。首选方为

- A、麦门冬汤
- B、清燥救肺汤
- C、桑杏汤
- D、定喘汤
- E、杏苏散

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 清燥救肺汤主治: 温燥伤肺, 气阴两伤证。干咳无痰, 气逆而喘, 头痛身热, 咽喉干燥, 鼻燥, 胸满胁痛, 心烦口渴, 舌干少苔, 脉虚大或数。

34、炙甘草汤的组成药物中含有

- A、麦冬、麻仁、桃仁
- B、生姜、大枣、黄芪
- C、生地、元参、麦冬
- D、阿胶、当归、芍药
- E、生地、阿胶、麦冬

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 炙甘草汤组成: 炙甘草、生姜、桂枝、人参、生地黄、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣、清酒。

方歌: 炙甘草汤参桂姜, 麦冬生地麻仁襄; 大枣阿胶加酒服, 通阳复脉第一方。

35、保和丸的药物组成中含有

- A、半夏、生姜
- B、神曲、金银花
- C、陈皮、甘草
- D、山楂、神曲
- E、茯苓、白术

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 保和丸组成: 山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。
方歌: 保和山楂莱菔曲, 夏陈茯苓连翘取, 炊饼为丸白汤下, 消食和胃食积去。



36、麦门冬汤中配伍粳米、大枣的意义是

- A、佐金平木
- B、培土生金
- C、滋水涵木
- D、益火补土
- E、扶土抑木

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 麦门冬汤配伍意义：方中重用麦门冬，滋养肺胃阴津，清肺胃虚热，是为君药。肺胃气虚，以人参益气生津，是为臣药。粳米、大枣益脾胃，化生阴津，助人参益气生津，寓培土生金；以半夏辛开苦降，开胃行津，降气下逆，并制约滋补药壅滞，共为佐药。甘草益气和中，润肺利咽，为佐使药。诸药配伍，以奏滋养肺胃，降逆下气之效。

37、理中丸的组成药物中不含有

- A、干姜
- B、人参
- C、白术
- D、附子
- E、炙甘草

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 理中丸组成：人参、干姜、炙甘草、白术。

38、下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

- A、消风散
- B、川芎茶调散
- C、地黄饮子
- D、羚角钩藤汤
- E、清营汤

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 消风散：当归、生地黄、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草、木通。

方歌：消风散内有荆防，蝉蜕胡麻苦参苍，知膏蒡通归地草，风疹湿疹服之康。

39、健脾丸中含有的药物是



- A、黄柏、木香、连翘
- B、黄连、茯苓、连翘
- C、白术、木香、茯苓
- D、黄连、茯苓、半夏
- E、黄芩、木香、半夏

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 健脾丸药物组成有：白术、木香、黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。

方歌：健脾参苓草陈，肉蔻香连合砂仁，楂肉山药曲麦炒，消补兼施不伤正。

40、定喘汤组成中含有的药物是

- A、苏叶、半夏、杏仁
- B、苏子、半夏、甘草
- C、苏叶、半夏、生姜
- D、苏子、厚朴、杏仁
- E、苏子、前胡、半夏

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 定喘汤组成：麻黄、杏仁、桑白皮、黄芩、半夏、紫苏子、款冬花、白果、甘草。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏子黄芩甘草杏，宣肺平喘效力彰。

41、白术与苍术共用的方剂是

- A、完带汤
- B、参苓白术散
- C、藿香正气散
- D、九味羌活汤
- E、健脾丸

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 完带汤组成是：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑芥穗、柴胡。

42、生化汤的功用是

- A、养血祛瘀，温经止痛
- B、化瘀生新，行气止痛
- C、活血化瘀，疏肝通络

- D、活血化瘀，缓消癥块
- E、温经散寒，祛瘀养血

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 生化汤功用：养血祛瘀，温经止痛。

43、半夏厚朴汤的主治病证是

- A、暗瘕
- B、脏毒
- C、脏躁
- D、梅核气
- E、肠风

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 半夏厚朴汤主治：梅核气。

44、大柴胡汤与当归四逆汤组成中均含有的药物是

- A、大枣、桂枝
- B、生姜、芍药
- C、芍药、大枣
- D、生姜、大枣
- E、黄芪、桂枝

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 大柴胡汤组成：柴胡、黄芩、芍药、半夏、生姜、枳实、大枣、大黄。

当归四逆汤：当归、桂枝、芍药、细辛、通草、大枣、炙甘草。

45、下列哪项是湿邪致病的常见脉象

- A、濡脉、弱脉
- B、缓脉、虚脉
- C、缓脉、细脉
- D、细脉、弱脉
- E、虚脉、细脉

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 细脉多见于气血两虚、湿邪为病。缓脉多见于湿病、脾胃虚弱，亦可见于正常人。
故最佳的选项是 C。

46、症见心悸怔忡，头晕健忘，皮下出血，舌淡脉弱，此属于

- A、心血虚证
- B、心气虚证
- C、脾不统血证
- D、气不摄血证
- E、心脾气血虚证

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 心脾气血虚证临床表现：心悸怔忡，头晕，多梦，健忘，食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。故最佳的选项是 E。

47、后头部连项痛属于

- A、阳明经头痛
- B、太阳经头痛
- C、少阳经头痛
- D、厥阴经头痛
- E、少阴经头痛

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
(2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
(3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
(4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
(5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。

48、下列属于风寒表证特征的是

- A、恶寒重发热轻
- B、恶寒轻发热重
- C、发热重而恶风自汗
- D、恶寒重而发热自汗
- E、发热轻而恶风自汗

【隐藏答案】

【正确答案】 A



【答案解析】 根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症, 可分为以下三种类型:

- (1) 恶寒重发热轻是风寒表证的特征。
- (2) 发热重恶寒轻是风热表证的特征。
- (3) 发热轻而恶风自汗是伤风表证的特征。

49、瘀血内阻, 血行不畅, 以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现的证候为

- A、血虚证
- B、血脱证
- C、血瘀证
- D、血热证
- E、血寒证

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 血瘀证指瘀血内阻, 血行不畅, 以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现的证候。

50、人中满唇反见于

- A、脾胃积热
- B、虚火上炎
- C、心脾积热
- D、燥热伤津
- E、脾阳已绝

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 人中满唇反为脾阳已绝。

51、病机属假神的是

- A、机体阴阳严重失调
- B、气血不足, 精神亏损
- C、阴盛于内, 格阳于外
- D、精气衰竭, 虚阳外越
- E、脏腑虚衰, 功能低下

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 假神是重危病人出现的精神暂时好转的虚假表现, 临终前的预兆, 古人比作回光返照或残灯复明。其病机是脏腑精气极度衰竭, 正气将脱, 阴不敛阳, 虚阳外越, 阴阳即将离绝。

52、不属于黑色主病的是

- A、肾虚
- B、瘀血
- C、剧痛
- D、水饮
- E、惊风

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛。

53、舌面的脏腑分部中属上脘的是

- A、舌根
- B、舌苔
- C、舌尖
- D、舌中
- E、舌两侧

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。

54、下列各项，属内源性中毒引起抽搐的是

- A、尿毒症
- B、乙醇
- C、一氧化碳
- D、有机磷农药
- E、阿托品

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 非感染性疾病引起的抽搐有：①缺氧：如窒息、溺水等。②中毒：外源性中毒，如药物、化学物；内源性中毒，如尿毒症、肝性脑病等。

55、下列哪项不属于脑脊液检查的适应证

- A、有脑膜刺激症状需明确诊断者
- B、疑有颅内出血
- C、疑有中枢神经系统恶性肿瘤
- D、有脑疝先兆者



E、中枢神经系统手术前的常规检查

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 脑脊液检查的适应证为:

- (1) 有脑膜刺激症状需明确诊断者。
- (2) 疑有颅内出血。
- (3) 疑有中枢神经系统恶性肿瘤。
- (4) 有剧烈头痛、昏迷、抽搐及瘫痪等表现而原因未明者。
- (5) 中枢神经系统手术前的常规检查。

56、根据甲状腺肿大的临床分度，超过胸锁乳突肌者为

- A、I 度
- B、II 度
- C、III 度
- D、IV 度
- E、V 度

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 甲状腺肿大分为三度：不能看出肿大但能触及者为 I 度；能看见肿大又能触及，但在胸锁乳突肌以内者为 II 度；超过胸锁乳突肌者为 III 度。生理性甲状腺肿大见于女性青春期、妊娠或哺乳期；病理学甲状腺轻度肿大见于单纯性甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺炎及甲状腺肿瘤。

57、下列哪项疾病可将气管推向健侧

- A、胸膜粘连
- B、胸腔积液
- C、右心衰竭
- D、荨麻疹
- E、高血压

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连等，可将气管拉向患侧。

58、胸痛伴呼吸困难见于

- A、急慢性支气管炎
- B、带状疱疹

- C、主动脉夹层
- D、肋软骨炎
- E、食管癌

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 胸痛伴呼吸困难见于主动脉夹层等。

59、肾源性水肿的主要特点是

- A、呈下垂性水肿
- B、晨起眼睑或颜面水肿
- C、向心性水肿
- D、非凹陷性水肿
- E、黏液性水肿

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 心源性水肿的特点是下垂性水肿。肾源性水肿的特点是早晨起床后眼睑或颜面水肿。向心性水肿多是心衰引起的；非凹陷性水肿并不常见，仅见于甲状腺功能低下所致的黏液性水肿及淋巴管阻塞所致的水肿。

60、胸痛伴咯血见于

- A、肺炎
- B、肺脓肿
- C、肺梗死
- D、支气管肺癌
- E、以上都是

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 胸痛伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。

61、下列哪项疾病可见湿性咳嗽

- A、急性咽喉炎
- B、急性支气管炎初期
- C、慢性咽喉炎
- D、轻症肺结核
- E、胸膜炎

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 干性咳嗽可见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺结核、肺癌等。湿性咳嗽见于慢性咽喉炎、慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等。

62、发热伴随结膜充血见于

- A、细菌性疾病
- B、急性胃肠炎
- C、胸膜炎
- D、流行性出血热
- E、高血压

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 发热伴随结膜充血见于流行性出血热、斑疹伤寒、恙虫病、钩端螺旋体病等。

63、重症肺结核所见的热型为

- A、间歇热
- B、稽留热
- C、波状热
- D、弛张热
- E、回归热

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 弛张热：体温在 39℃ 以上，但波动幅度大，24 小时内体温差达 2℃ 以上，最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

64、下列各项，不引起淋巴细胞增多的疾病是

- A、免疫缺陷性疾病
- B、结核病
- C、百日咳
- D、流行性腮腺炎
- E、肾综合征出血热

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 淋巴细胞增多：①感染性疾病：主要为病毒感染，如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、肾综合征出血热等；某些杆菌感染，如结核病、百日咳、布氏杆菌病等。②某些血液病：急性和慢性

淋巴细胞白血病、淋巴瘤等。③急性传染病的恢复期。再生障碍性贫血和粒细胞缺乏症时, 由于中性粒细胞减少, 淋巴细胞比例相对增高, 但绝对值并不增高。

65、使肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣关闭不全的杂音更明显的体位是

- A、坐位
- B、仰卧位
- C、平卧位
- D、左侧卧位
- E、右侧卧位

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 仰卧位可使肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣关闭不全的杂音更明显。

66、引起白细胞总数及中性粒细胞增多的疾病是

- A、脾功能亢进
- B、系统性红斑狼疮
- C、伤寒
- D、肺炎链球菌肺炎
- E、流行性感冒

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 中性粒细胞反应性增多见于: 急性感染: 化脓性感染最常见, 如流行性脑脊髓膜炎、肺炎链球菌肺炎、阑尾炎等; 也可见于某些病毒感染, 如肾综合征出血热、流行性乙型脑炎、狂犬病等; 某些寄生虫感染, 如并殖吸虫病等。

67、大咯血的日咯血量应是

- A、400~500ml
- B、>500ml
- C、100~200ml
- D、200~300ml
- E、300~400ml

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 咯血的量及其性状: 大量咯血(每日超过 500ml) 常见于空洞型肺结核、支气管扩张症和肺脓肿; 中等咯血(每日 100~500ml) 可见于二尖瓣狭窄; 其他原因所致的咯血多为小量咯血(每日在 100ml 内), 或仅为痰中带血。咯粉红色泡沫痰为急性左心衰竭的表现。

68、可出现下壁心肌梗死特征性心电图改变的导联是

- A、V₁、V₂、V₃
- B、I、aVL、V₅、V₆
- C、V₃、V₄、V₅
- D、II、III、aVF
- E、V₁~V₅

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 下壁心梗在 II、III、aVF 导联上出现特征性心电图改变。

69、局限性非小细胞性肺癌首选的治疗方法是

- A、免疫治疗
- B、中医中药治疗
- C、化学药物治疗
- D、放射治疗
- E、手术治疗

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 手术治疗为非小细胞肺癌的主要治疗方法。

70、药物及化学物质是继发性再障的首位病因，最常见的药物是

- A、西咪替丁
- B、抗癫痫药
- C、有机砷
- D、磺胺
- E、氯霉素

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 药物及化学物质是继发性再障的首位病因。最常见的药物是氯霉素、抗肿瘤药和保泰松等解热镇痛药，其次是磺胺、有机砷及抗癫痫药，偶有西咪替丁、胍屈嗪、氯丙嗪及抗甲状腺药甲巯咪唑等。

71、我国高血压病患者最主要并发症是

- A、肾脏损害
- B、高血压性心脏病
- C、脑出血与脑梗死
- D、冠心病



E、主动脉夹层

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 脑出血和脑梗死是高血压最主要的并发症。前者多在情绪激动、用力情况下出现, 表现为剧烈头痛、恶心呕吐、偏瘫、意识障碍等; 后者多在安静状态或睡眠中出现, 多表现为三偏综合征或伴运动性失语, 轻者仅表现为短暂脑缺血发作;

72、急性心肌梗死最多见的心律失常是

- A、束支传导阻滞
- B、心房颤动
- C、房性早搏
- D、室性心律失常
- E、房室传导阻滞

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 心肌梗死心律失常以室性心律失常最多。

73、发作时心电图 ST 段抬高的心绞痛是

- A、变异型心绞痛
- B、卧位型心绞痛
- C、劳累性心绞痛
- D、稳定型心绞痛
- E、恶化型心绞痛

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 变异型心绞痛发作时则相关导联 ST 段呈弓背向上抬高。

74、胃溃疡节律性疼痛的特点是

- A、餐后 3~4 小时痛
- B、进餐前 1 小时出现疼痛
- C、餐后 1 小时内出现疼痛
- D、饥饿时疼痛
- E、夜间痛

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 GU 疼痛不甚规则, 常在餐后 1 小时内发生, 至下次餐前自行消失。



75、作为胃癌普查时首选的筛选试验是

- A、钡餐透视
- B、胃液分析
- C、胃镜及活检
- D、粪便隐血实验
- E、Hp 检测

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 粪便隐血试验常持续阳性，可作为胃癌筛选的首选方法。

76、脑梗死的治疗中，目前尚不作为常规治疗的是

- A、应用尿激酶溶栓治疗
- B、抗血小板治疗
- C、应用低分子量肝素抗凝
- D、控制血压、血糖
- E、应用巴曲酶等降纤治疗

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 溶栓治疗：目前尚不作为常规治疗方法。常用的溶栓药物有重组组织型纤溶酶原激活剂和尿激酶。

77、患者患十二指肠溃疡病史 5 年，近 1 周来持续有黑便，估计每天的出血量至少是

- A、>5ml
- B、>40ml
- C、5~10ml
- D、>50ml
- E、>100ml

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 每天出血量>50ml，出现黑便。

78、下列哪项为成年人中最多见的急性白血病

- A、急粒白血病
- B、急淋白血病
- C、急红白血病

- D、急单核白血病
- E、急巨细胞白血病

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 成人患者中急粒白血病最多见。

79、X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A、充盈缺损
- B、胃壁蠕动减少呈皮革状
- C、黏膜呈锯齿状增粗
- D、有激惹及变形
- E、龛影

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 X 线钡餐检查有直接和间接两种征象。直接征象为龛影，对溃疡的诊断有确诊意义。

80、对放射治疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A、小细胞肺癌
- B、大细胞肺癌
- C、鳞状上皮癌
- D、类癌
- E、腺癌

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 放射治疗（简称放疗）分为根治性和姑息性两种。根治性放疗用于病灶局限、因解剖原因不便手术或患者不愿意手术者，结合化疗可提高疗效。姑息性放疗目的在于抑制肿瘤的发展，延迟肿瘤扩散和缓解症状，常用于控制骨转移性疼痛、上腔静脉压迫综合征、支气管阻塞及脑转移引起的症状。放疗对小细胞肺癌效果较好，其次为鳞癌和腺癌，其放射剂量以腺癌最大，小细胞肺癌最小。

81、不属肺癌局部扩展所引起的表现是

- A、声音嘶哑
- B、上腔静脉压迫综合征
- C、局限性喘鸣
- D、胸痛
- E、吞咽困难

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肿瘤局部扩展引起的表现:

- ①肿瘤侵犯胸膜或纵隔, 可产生不规则钝痛; 侵入胸壁、肋骨或压迫肋间神经时可致剧烈胸痛, 呼吸、咳嗽时加重;
- ②肿瘤压迫大气道, 出现吸气性呼吸困难;
- ③肿瘤侵及食管可表现咽下困难, 也可引起支气管-食管瘘;
- ④癌肿压迫或转移性淋巴结压迫喉返神经(左侧多见), 则出现声音嘶哑;
- ⑤肿瘤侵犯纵隔, 压迫阻滞上腔静脉回流, 导致上腔静脉压迫综合征, 出现头、颈、前胸部及上肢水肿淤血等;
- ⑥肺上沟瘤(Pancoast 瘤)易压迫颈部交感神经引起 Homer 综合征, 出现同侧眼睑下垂、眼球内陷、瞳孔缩小、额部少汗等。

82、肺炎链球菌肺炎患者痰量明显增多的病理学时期是

- A、消散期
- B、恢复期
- C、潜伏期
- D、渗出期
- E、实变期

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎咳嗽、咳痰: 初期为刺激性干咳, 继而咳白色黏液痰或带血丝痰, 经 1~2 天后, 可咳出黏液血性或铁锈色痰, 也可呈脓性痰, 进入消散期痰量增多, 痰黄而稀薄。

83、肺炎链球菌肺炎患者出现胸痛的特点, 错误的是

- A、可伴腹部疼痛
- B、咳嗽时疼痛减轻
- C、多在患侧
- D、呈针刺样
- E、可放射至肩部

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎患者出现胸痛的特点为: 多有病侧胸痛, 常呈针刺样, 随咳嗽或深呼吸而加剧, 可放射至肩或腹部。

84、急性白血病最主要的死亡原因是

- A、肝功能衰竭



- B、中枢神经系统浸润
- C、严重感染
- D、严重贫血
- E、大出血

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 严重感染可致菌血症或败血症，是急性白血病最常见的死亡原因之一。

85、典型伤寒出现玫瑰疹的时间是

- A、第 3~5 日
- B、第 6~12 日
- C、第 14~21 日
- D、第 22~28 日
- E、第 28 日以后

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 玫瑰疹多出现在病程第 6~12 日皮肤出现暗红色小斑丘疹，称为玫瑰疹，散在分布于前胸和上腹部，2~4mm 大小，压之褪色，数目不多，6~10 个，分批出现，多在 2~4 日内消失。

86、怀疑流行性脑脊髓膜炎时首先应做

- A、脑脊液检查
- B、使用抗菌药物
- C、血常规检查
- D、头颅 X 线片
- E、头颅 CT

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脑脊液检查为明确诊断流行性脑脊髓膜炎的重要方法，脑脊液压力升高，外观混浊，白细胞明显增高，蛋白质增高，而糖及氯化物明显降低。发病初期或经抗菌药物治疗后，脑脊液改变可以不典型。

87、流行性出血热常见的休克属

- A、感染性休克
- B、低血容量性休克
- C、心源性休克
- D、继发性休克

E、过敏性休克

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 流行性出血热低血压休克期主要为低血容量休克的表现。

88、疟疾通过

- A、土壤传播
- B、血液和体液传播
- C、消化道传播
- D、呼吸道传播
- E、接触传播

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 血液和体液传播：存在于血液或体液中的病原体通过输血、使用血制品、分娩、性交而传播，如疟疾、乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、艾滋病、梅毒等。

89、可提高人群的主动性特异性免疫的是

- A、康复治疗
- B、接种疫苗
- C、切断传播途径
- D、早隔离
- E、早治疗

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 提高特异性免疫力：接种疫苗、菌苗、类毒素等可提高人群的主动性特异性免疫，接种抗毒素、丙种球蛋白或高效价免疫球蛋白可使机体获得被动特异性免疫。儿童计划免疫对传染病预防起关键性的作用。

90、母婴传播属于

- A、血液传播
- B、直接接触传播
- C、间接接触传播
- D、垂直传播
- E、体液传播

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 由母亲传给胎儿或婴儿称母婴传播，母婴传播属于垂直传播，其他途径称为水平传播。

91、流脑的主要传播途径是

- A、粪-口
- B、蚊虫叮咬
- C、呼吸道
- D、性传播
- E、体液

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 流脑的传播途径：主要通过咳嗽、喷嚏、说话等由飞沫借空气经呼吸道传播。

92、下述各项，属灭菌剂的是

- A、过氧乙酸
- B、臭氧
- C、乙醇
- D、过氧化氢
- E、含氯消毒剂

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物。该类消毒方法有热力、电离辐射、微波等物理方法和甲醛、戊二醛、过氧乙酸、环氧乙烷等化学灭菌剂。

93、AIDS 急性感染期最为常见的临床表现是

- A、皮疹
- B、淋巴结肿大
- C、头痛
- D、发热
- E、腹泻

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 AIDS 急性感染期以发热最为常见。

94、下列关于人禽流感病毒发病季节的叙述，不正确的是

- A、一年四季均可发生
- B、冬、春季节多暴发
- C、夏季发病症状较重
- D、夏季发病多呈散发
- E、夏季发病较少

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 人禽流感病毒发病季节：禽流感一年四季均可发生，但冬、春季节多暴发流行。夏季发病较少，多呈散发，症状也较轻

95、戊型肝炎病毒为

- A、蛋白质病毒
- B、嗜肝 DNA 病毒
- C、黄病毒
- D、单股正链 RNA
- E、缺陷的负链 RNA 病毒

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 戊型肝炎病毒（HEV）简称戊肝病毒，为单股正链 RNA。

96、可逃避免疫系统的攻击，致机体对病原体的清除作用减低或消失的是

- A、抗生素的应用
- B、病原体的变异
- C、传染病流行后期
- D、机体抵抗力的提高
- E、自动免疫的推广

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 变异性：病原体通过抗原基因的变异、遗传信息的交换、耐药性的形成，逃避免疫系统的攻击，使机体对病原体的清除作用减低或消失，从而使疾病继续或慢性化。

97、自然疫源性传染病的传染源是

- A、患者
- B、病原携带者
- C、隐性感染者
- D、家禽
- E、野生动物

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 野生动物为传染源的传染病，称为自然疫源性传染病，如鼠疫、钩端螺旋体病、流行性出血热等。

98、《中华人民共和国传染病防治法》把传染病分为甲类、乙类和丙类，实行分类管理。甲类为

- A、痢疾、伤寒
- B、SARS、流感
- C、肺炭疽、艾滋病
- D、鼠疫、霍乱
- E、乙肝、甲肝

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 《中华人民共和国传染病防治法》把传染病分为甲类、乙类和丙类，实行分类管理。甲类为强制管理传染病，包括鼠疫和霍乱两种；乙类为严格管理传染病，丙类属监测管理传染病。

99、下列关于流感病毒病原学的叙述，错误的是

- A、100℃ 1分钟
- B、56℃ 30分钟灭活
- C、不耐干燥
- D、耐低温
- E、对紫外线敏感

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 流感病毒不耐热，100℃ 1分钟或56℃ 30分钟灭活，对常用消毒剂及紫外线敏感，耐低温和干燥，真空干燥或-20℃以下仍可存活。

100、治疗霍乱首选抗菌药物为

- A、青霉素
- B、黄连素
- C、环丙沙星
- D、复方磺胺甲唑
- E、庆大霉素

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 霍乱抗菌治疗: 早期应用抗菌药物有助于缩短腹泻和排菌时间, 减少腹泻次数及排泄量, 降低病后带菌率等, 但不能代替补液。目前常用药物为氟喹诺酮类, 如环丙沙星、多西环素等, 疗程均为 3 日。也可采用四环素、氨苄西林、红霉素或阿奇霉素、复方磺胺甲噁唑等。

101、判断生命价值的依据是

- A、健康程度
- B、内在价值与外在价值的统一
- C、内在价值
- D、外在价值
- E、生命质量

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 生命价值论, 是以人具有的内在价值与外在价值的统一来衡量生命意义的一种理论。

102、医学道德的作用不包括的是

- A、对医学科学的促进作用
- B、对社会文明的推动作用
- C、对医院人际关系的调节作用
- D、对经济效益的保障作用
- E、对医疗质量的保证作用

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 医学道德对医务人员、病人和社会都具有重要意义, 特别在保障人类健康和发展医学科学以及卫生事业等方面, 具有不可忽视的特殊价值。具体来说, 医学道德对医院人际关系具有调节作用; 对医疗质量具有保证作用; 对医学科学具有促进作用; 对社会文明具有推动作用。

103、符合药物治疗的道德要求是

- A、合理配伍, 细致观察
- B、尽量周全, 知情同意
- C、灵活用药, 免担风险
- D、少用药物, 节约费用
- E、联合用药, 观察疗效

【隐藏答案】

【正确答案】 A



【答案解析】 药物治疗中的道德要求:

- (1) 对症下药, 剂量安全;
- (2) 合理配伍, 细致观察;
- (3) 节约费用, 公正分配。

104、不属医患之间非技术关系的是

- A、经济关系
- B、法律关系
- C、道德关系
- D、荣誉关系
- E、价值关系

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 医患间非技术方面的关系是指医患交往过程中在社会、法律、道德、心理、经济等方面建立起来的人际关系。如医患间的道德关系、经济关系、价值关系、法律关系等。

105、对医务人员的医学道德行为起着调节作用的是

- A、医学道德保密
- B、医学道德审慎
- C、医学道德良心
- D、医学道德义务
- E、医学道德情感

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 医学道德情感对医务人员的医学道德行为起着调节作用。

106、发生传染病暴发时, 要求有关单位向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限为

- A、1 小时内
- B、2 小时内
- C、3 小时内
- D、4 小时内
- E、5 小时内

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的, 应当在 2 小时内向所在地县级人民政

府卫生行政主管部门报告; 接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告, 并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告:

- (1) 发生或者可能发生传染病暴发、流行的;
- (2) 发生或者发现不明原因的群体性疾病的;
- (3) 发生传染病菌种、毒种丢失的;
- (4) 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。

107、下列药品中属于劣药的是

- A、变质的药品
- B、被污染的药品
- C、未标明有效期或者更改有效期的药品
- D、国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- E、所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 药品成分的含量不符合国家药品标准的为劣药。有下列情形之一的药品按劣药论处:

- (1) 未标明有效期或者更改有效期的;
- (2) 不注明或者更改生产批号的;
- (3) 超过有效期的;
- (4) 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的;
- (5) 擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的;
- (6) 其他不符合药品标准规定的。

除了选项 C 以外, 其余各项均为假药的范畴, 因此结合题干所问, 正确的选项是 C。

108、属于乙类传染病, 但采取甲类传染病的预防和控制措施的是

- A、鼠疫
- B、霍乱
- C、艾滋病
- D、流行性感冒
- E、人感染高致病性禽流感

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感, 采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施。其他乙类传染病和突发原因不明的传染病需要采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施的, 由国务院卫生行政部门及时报经国务院批准后予以公布、实施。



109、COPD 的最终结局为

- A、自发性气胸
- B、慢性肺源性心脏病
- C、肺气肿
- D、肺动脉高压
- E、肺性脑病

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性肺源性心脏病是 COPD 的最终结局。

110、肌注铁剂治疗缺铁性贫血的适应证，不正确的是

- A、有严重消化道疾患者
- B、不易控制的慢性出血患者
- C、口服治疗不良反应严重者
- D、口服铁剂治疗无效者
- E、妊娠早期急需纠正贫血者

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肌注铁剂治疗缺铁性贫血的适应证：①口服铁剂后有严重消化道反应而不能耐受者；②口服铁剂不能奏效者，如脂肪泻、萎缩性胃炎等有胃肠道铁吸收障碍；③需要迅速纠正缺铁者，如妊娠后期贫血严重；④严重消化道疾患，如消化性溃疡、溃疡性结肠炎等，口服铁剂可加剧原发病者；⑤不易控制的慢性出血，失铁量超过肠道所能吸收的铁量。常用注射铁剂有右旋糖酐铁和山梨醇枸橼酸铁，各含铁 50mg / ml，给药途径是臀部深位肌注。患者所需铁的总剂量应准确计算，不应超量以免引起急性铁中毒。

二、B

- 1、A. 肺、肝
- B. 肺、肾
- C. 心、肺
- D. 心、肝
- E. 肺、脾

<111> 、与气的生成关系最密切的是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

<112> 、与呼吸运动关系最密切的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 人体之气是由水谷精微和肾中精气，并与肺吸入的自然界清气相融合而成。食物被人体吸收后化生水谷之气，经过脾的运化，布散全身后成为人体之气的主要部分。来源于自然界的清气需要依靠肺的呼吸功能和肾的纳气功能才能吸入体内，故在呼吸运动上，肺、肾两脏与之关系最密切。

2、A. 怒

B. 喜

C. 思

D. 悲

E. 恐

<113> 、心在志为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 心在志为喜，肺在志为悲。

<114> 、肺在志为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 心在志为喜，肺在志为悲。

3、A. 陈皮

B. 青皮

C. 香附

D. 沉香

E. 木香

<115> 、善于治疗肝郁气滞胁痛、腹痛，为疏肝解郁、行气止痛要药的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 香附：主治肝郁气滞胁痛、腹痛。本品为疏肝解郁、行气止痛要药。用治肝郁气滞胁痛，常与柴胡、川芎配伍，如柴胡疏肝散。寒凝气滞、肝气犯胃之胃脘痛，可配高良姜用，如良附丸。



<116> 、善于治疗脾胃气滞，又为行气止痛之要药的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 木香：主治脾胃气滞证。本品善行脾胃之滞气，既为行气止痛之要药，又为健脾消食之佳品。治脾胃气滞及脾虚气滞证，可与枳实、白术等药同用。

- 4、A. 活血行气止痛，消肿生肌
B. 活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘
C. 活血调经，利尿消肿，清热解毒
D. 活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神
E. 活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄

<117> 、丹参具有的功效是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 丹参功效：活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神。

<118> 、郁金具有的功效是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 郁金功效：活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。

- 5、A. 杏仁
B. 细辛
C. 熟地黄
D. 石膏
E. 黄连

<119> 、小青龙汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。

<120> 、九味羌活汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 九味羌活汤：羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草。

6、A. 大定风珠

B. 羚角钩藤汤

C. 镇肝息风汤

D. 川芎茶调散

E. 天麻钩藤饮

<121> 、高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，舌绛而干，发为痉厥，脉弦数者，治宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 羚角钩藤汤主治：肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥；甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数；以及肝热风阳上逆，头晕胀痛，耳鸣心悸，面红如醉，或手足躁扰，甚则瘵疔，舌红，脉弦数。

<122> 、头痛眩晕，失眠多梦，舌红苔黄，口苦面红，脉弦数者，治宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 天麻钩藤饮主治：肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。

7、A. 清热解毒，凉血散瘀

B. 凉血止血，利水通淋

C. 清肝宁肺，凉血止血

D. 清热泻火，利水通淋

E. 清热凉血，活血散瘀

<123> 、属于小蓟饮子的功用是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 小蓟饮子凉血止血，利水通淋，主治热结下焦之血淋、尿血。



<124> 、属于咳血方的功用是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 咳血方清肝宁肺，凉血止血。主治肝火犯肺之咳血。

8、A. 温阳补血，散寒通滞

B. 滋养肺肾，止咳化痰

C. 涩肠固脱，温补脾肾

D. 敛阴止汗，益气固表

E. 调补心肾，涩精止遗

<125> 、真人养脏汤的功用是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 真人养脏汤的功用：涩肠固脱，温补脾肾。

<126> 、桑螵蛸散的功用是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 桑螵蛸散的功用：调补心肾，涩精止遗。

9、A. 谵语

B. 郑声

C. 独语

D. 错语

E. 言謇

<127> 、神识不清，语无伦次，声高有力的症状可见于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 谵语是指神识不清，语无伦次，声高有力的症状。属实证，多因邪热内扰神明所致，多见于温热病邪内入心包或阳明实热证、痰热扰乱心神等。

<128> 、神志清楚、思维正常而吐字困难的表现可见于

A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 言謇是指神志清楚、思维正常而吐字困难，或吐字不清，又称语言蹇涩。病中言语蹇涩，每与舌强并见者，多因风痰阻络所致，为中风之先兆或后遗症。若因习惯而成者，不属病态。

10、A. 心火亢盛

B. 胃肠热盛

C. 肝胆火盛

D. 气分热极

E. 血热内盛

<129> 、舌中生点刺多见于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 舌中生点刺：多为胃肠热盛。故正确的选项为 B。

<130> 、舌尖生点刺多见于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 舌尖生点刺：多为心火亢盛。故正确的选项为 A。

11、A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

<131> 、目的脏腑分属中，黑珠属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 黑珠属肝，称为“风轮”。

<132> 、目的脏腑分属中，瞳仁属

A B C D E

【隐藏答案】



【正确答案】 E

【答案解析】 瞳仁属肾，称为“水轮”。

12、A. 双瞳孔缩小

B. 双瞳孔散大

C. 双瞳孔不等大

D. 瞳孔反射消失

E. 瞳孔呈乳白色

<133> 、吗啡中毒的瞳孔变化为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 病理情况下，瞳孔缩小（ $<2\text{mm}$ ）常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒，以及吗啡、氯丙嗪、毛果云香碱等药物影响。

<134> 、脑疝的瞳孔变化为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 双侧瞳孔大小不等，常见于脑外伤、脑肿瘤、脑疝及中枢神经梅毒等颅内病变。

13、A. 皮下出血直径 $<2\text{mm}$

B. 皮下出血直径 $3\sim 5\text{mm}$

C. 皮下出血直径 $>5\text{mm}$

D. 片状出血伴有皮肤显著隆起

E. 片状出血伴有皮下握雪感

<135> 、上述为皮下出血的几种体检所见，请写出紫癜相对应的体征名称

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 皮下出血直径在 $3\sim 5\text{mm}$ 者，称为紫癜；皮下出血直径 $>5\text{mm}$ 者，称为瘀斑。

<136> 、上述为皮下出血的几种体检所见，请写出瘀斑相对应的体征名称

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 皮下出血：皮肤或黏膜下出血，出血面的直径小于 2mm 者，称为瘀点；小的出血点容易和小红色皮疹或小红痣相混淆，皮疹压之退色，而出血点压之不退色，小红痣加压虽不退色，但触诊时可稍高出平面，并且表面发亮。皮下出血直径在 3~5mm 者，称为紫癜；皮下出血直径 >5mm 者，称为瘀斑；片状出血并伴有皮肤显著隆起者，称为血肿。皮肤黏膜出血常见于造血系统疾病、重症感染、某些血管损害的疾病，以及某些毒物或药物中毒等。

- 14、A. 尿毒症
B. 大量胸膜腔积液
C. 脑肿瘤
D. 败血症
E. 肺炎链球菌肺炎

<137> 、属于导致呼吸困难的中枢神经系统的疾病为

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 呼吸困难的病因：神经精神及肌肉病变

- (1) 中枢神经系统疾病 如各种脑炎、脑膜炎、脑外伤、脑出血、脑肿瘤等。
- (2) 周围神经疾病 如脊髓灰质炎累及颈部脊髓、急性感染性多发性神经炎等。
- (3) 精神疾患 如癔症。
- (4) 肌肉病变 常见的有重症肌无力、药物导致的呼吸肌麻痹等。

<138> 、能导致库斯莫尔呼吸的为

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呼吸深度：呼吸幅度加深见于严重代谢性酸中毒时，病人可以出现节律匀齐，呼吸深而大（吸气慢而深，呼气短促），不感呼吸困难的呼吸，称为库斯莫尔呼吸（酸中毒大呼吸），见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等；呼吸浅快可见于肺气肿、胸膜炎、胸腔积液、气胸、呼吸肌麻痹、大量腹水、肥胖、鼓肠等。

- 15、A. 6 个月疗程
B. 半年~1 年疗程
C. 3 天疗程
D. 7 天疗程
E. 7~14 天疗程

<139> 、治疗急性膀胱炎目前推荐的疗程是

- A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 膀胱炎：目前推荐短疗程（3 天）疗法：选用喹诺酮类、半合成青霉素、头孢类或磺胺类等抗生素中的 1 种，连用 3 天，治愈率达 90%，可显著降低复发率。对无复杂因素存在的急性膀胱炎，可单用 1 种抗生素治疗。停药 7 天后需检查尿细菌培养，仍为阳性者，应继续给予 2 周抗生素治疗。对妊娠妇女、糖尿病患者和复杂性尿路感染者，应采用较长疗程抗生素治疗。

<140> 、治疗急性肾盂肾炎的一般疗程是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 急性肾盂肾炎：尿标本采集后立即进行治疗，一般首选对革兰阴性杆菌有效的抗生素，但应兼顾革兰阳性菌感染。72 小时无效者根据药敏结果调整用药。常用抗生素有喹诺酮类、半合成青霉素类、头孢类，必要时联合用药。热退后连续用药 3 天改为口服，总疗程一般为 7~14 天。停药后第 2、6 周复查尿细菌定量培养，随后每月复查 1 次，随访中出现感染复发，应重新进行治疗。

16、A. 溶血性贫血

B. 失血性贫血

C. 巨幼细胞贫血

D. 缺铁性贫血

E. 再生障碍性贫血

<141> 、叶酸缺乏引起的贫血为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

<142> 、红细胞破坏过多引起的贫血为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 贫血的常见病因：①红细胞生成减少：如叶酸及（或）维生素 B₁₂ 缺乏所致的巨幼细胞贫血；②红细胞破坏过多：见于各种原因引起的溶血性贫血，如阵发性睡眠性血红蛋白尿、脾功能亢进等。

17、A. 垂体后叶素静注

B. 手术治疗



C. 奥美拉唑静注

D. 冰盐水洗胃

E. 气囊压迫止血

<143> 、肝硬化并发上消化道出血时, 首选的治疗方法为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 食管胃底静脉曲张破裂大出血药物止血常用垂体后叶素静脉注射。

<144> 、消化性溃疡并发上消化道出血时, 首选的治疗方法为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 非静脉曲张破裂大出血最常见于消化性溃疡。静脉使用抑制胃酸分泌的药物如西咪替丁、雷尼替丁或质子泵抑制剂奥美拉唑等, 升高胃内 pH 值, 可有效止血。

18、A. 肥达反应

B. 临床表现

C. 尿培养

D. 粪便培养

E. 血培养

<145> 、流脑确诊的依据是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 取流脑患者的血液、脑脊液、骨髓等作病原菌培养, 阳性者可确诊。

<146> 、伤寒确诊的依据是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 伤寒确诊有赖于血或骨髓培养检出伤寒杆菌。

19、A. 氯霉素

B. 复方磺氨甲基异恶唑

C. 青霉素

D. 头孢曲松

E. 环丙沙星

<147> 、伤寒病原治疗首选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

<148> 、小儿伤寒治疗首选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 伤寒病原治疗：1. 氟喹诺酮类是首选。抗菌谱广，杀菌作用强，能抑制细菌 DNA 旋转酶，阻碍 DNA 复制，口服吸收完全，体内分布广，胆囊浓度高，副作用少，不易产生耐药。目前常用的药物有氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星等。疗程 14 日。孕妇、儿童、哺乳期妇女慎用。2. 头孢菌素类 第三代头孢菌素在体外对伤寒杆菌有强大抗菌活性，体内分布广，胆汁浓度高，不良反应少，尤其适用于孕妇、儿童、哺乳期妇女等患者。常用的有头孢曲松、头孢噻肟、头孢哌酮等。

20、A. 造成患者死亡、重度残疾

B. 造成患者明显人身损害的其他后果

C. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

D. 抢救危重患者生命而采取紧急医疗措施造成不良后果

E. 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍

<149> 、根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级，一级医疗事故是指

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

<150> 、根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级，二级医疗事故是指

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

中医助理医师第二单元

一、A1

1、哮喘发作时的基本病理变化为

- A、肺气不清
- B、肺气虚寒
- C、肺失宣降
- D、痰阻气闭
- E、伏痰引触

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 哮喘发作时的基本病理变化为“伏痰”遇感引触，痰随气升，气因痰阻，相互搏结，壅塞气道，气道挛急，通畅不利，肺气宣降失常，引动停积之痰，而致痰鸣如吼，气息喘促。

【您的答案】 E

【答案正确，得分：1】

2、痫病病位在脑，涉及的脏腑为

- A、肝、脾、心、肾
- B、肝、心、脾、肺
- C、肝、脾、肺、肾
- D、肺、脾、心、肾
- E、肝、肺、心、肾

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痫病的病位在脑，涉及肝、脾、心、肾诸脏。

3、治疗泄泻肝气乘脾证，应首选的方剂是

- A、四七汤
- B、参苓白术散
- C、柴胡疏肝散
- D、痛泻要方
- E、五磨饮子



【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 泄泻之肝气乘脾证

证候主症：腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，每因抑郁恼怒，或情绪紧张之时而作，素有胸胁胀闷，暖气食少，舌淡红，脉弦。

治法：抑肝扶脾。

代表方：痛泻要方加减。

4、按痰饮停积的部位分类，饮留胃肠的是

- A、悬饮
- B、伏饮
- C、痰饮
- D、支饮
- E、溢饮

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 痰饮：心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声，形体昔肥今瘦，属饮停胃肠。

5、治疗痞满痰湿中阻证，应首选的方剂是

- A、柴平汤
- B、三仁汤
- C、二陈平胃汤
- D、保和丸
- E、枳术丸

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 痞满之痰湿中阻证

证候主症：脘腹痞塞不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚腻，脉沉滑。

治法：除湿化痰，理气和中。

代表方：二陈平胃汤加减。

6、消渴的治疗原则是

- A、清热润燥，养阴生津
- B、滋阴益气，活血化瘀
- C、健脾补肾
- D、滋阴温阳

E、滋阴清热，益气健脾

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 消渴的基本病机是阴虚为本，燥热为标，故清热润燥、养阴生津为本病的治疗大法。

7、下列关于便秘的叙述中，错误的是

- A、常伴腹胀、纳差等症状
- B、两次排便时间间隔 2 天以上
- C、排便间隔时间超过自己的习惯一天以上
- D、大便粪质干结，排出艰难
- E、欲大便而艰涩不畅

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 便秘特点：

1. 排便间隔时间超过自己的习惯 1 天以上，或两次排便时间间隔 3 天以上。
2. 大便粪质干结，排出艰难，或欲大便而艰涩不畅。
3. 常伴腹胀、腹痛、口臭、纳差及神疲乏力、头眩心悸等症。
4. 本病常有饮食不节、情志内伤、劳倦过度等病史。

8、痴呆的病位在

- A、肝
- B、脾
- C、心
- D、肾
- E、脑

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 痴呆病位在脑，与心、肾、肝、脾均有关系。

9、治疗内伤发热气虚发热证，首选的方剂是

- A、补中益气汤
- B、青蒿鳖甲汤
- C、清营汤
- D、清骨散
- E、归脾汤

【隐藏答案】



【正确答案】 A

【答案解析】 内伤发热气虚发热证

证候主症: 发热, 热势或低或高, 常在劳累后发作或加剧, 倦怠乏力, 气短懒言, 自汗, 易于感冒, 食少便溏, 舌质淡, 苔白薄, 脉细弱。

证机概要: 中气不足, 阴火内生。

治法: 益气健脾, 甘温除热。

代表方: 补中益气汤加减。

10、下列各项, 不属于便秘病因的是

- A、年老体虚
- B、感受外邪
- C、饮食不节
- D、情志失调
- E、外伤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 便秘病因: 饮食不节、情志失调、年老体虚、感受外邪。

11、肺痈的特征性临床表现中, 错误的是

- A、咳吐腥臭脓痰
- B、咯铁锈色痰
- C、咳嗽
- D、胸痛
- E、发热

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 肺痈是肺叶生疮, 形成脓疡的一种病证, 属内痈之一。临床以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰甚则脓血相兼为主要特征。

12、下列选项中, 属于痴呆病因的是

- A、七情内伤
- B、劳欲过度
- C、饮食不节
- D、跌仆损伤
- E、感受外邪

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痴呆的病因：
七情内伤、年高体虚、久病耗损。

13、痞满的病机关键是

- A、胃失和降，膈间气机不利
- B、脾胃肝肾功能失调，津枯血燥，气痰瘀互结
- C、胃气阻滞，胃失和降，不通则痛
- D、胃失和降，胃气上逆
- E、中焦气机不利，脾胃升降失职

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 中焦气机不利，脾胃升降失职为痞满发生的病机关键。

14、治疗呕吐肝气犯胃证，首选的方剂是

- A、理中汤
- B、黄芪建中汤
- C、香砂六君子汤
- D、参苓白术散
- E、四七汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 呕吐之肝气犯胃证
治法：疏肝理气，和胃降逆。
代表方：四七汤加减。

15、下列各项，不属腹痛常见病因的是

- A、素体阳虚
- B、胃气上逆
- C、外感时邪
- D、饮食不节
- E、情志失调

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 腹痛病因：
外感时邪、饮食不节、情志失调及素体阳虚等可导致本病。此外，跌仆损伤，络脉瘀阻，或腹部术后也可致腹痛。

16、泄泻与痢疾主要的鉴别点是

- A、有无腹泻
- B、有无腹痛
- C、有无发热
- D、有无大便不成形
- E、有无便下赤白脓血

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻与痢疾：两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主症，大便不带脓血，也无里急后重，或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。

17、支饮，饮邪停积的部位是

- A、胸肺
- B、腹内
- C、胃肠
- D、胁下
- E、肢体

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 支饮：咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，属饮邪支撑胸肺。

18、下列各项中，不是虚劳病因的是

- A、饮食不节
- B、大病久病
- C、禀赋薄弱
- D、情志失调
- E、烦劳过度

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 虚劳的病因：禀赋薄弱、烦劳过度、饮食不节、大病久病、误治失治。

19、下列各项，不符合痿证临床特征的是

- A、肢体关节疼痛
- B、可有肌肉萎缩
- C、肢体筋脉弛缓
- D、肢体软弱无力

E、肢体运动不利

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 “肢体关节疼痛”属于痹证的临床特征。

20、积聚中“积”的特点，说法错误的是

- A、是为脏病
- B、是为腑病
- C、结块固定
- D、痛有定处
- E、病在血分

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 积属有形，结块固定不移，痛有定处，病在血分，是为脏病。“是为腑病”属于“聚”的特点。

21、下列关于痹证的各项叙述中，错误的是

- A、发病与天气变化有关
- B、本病可发生于任何年龄
- C、主症是肢体关节、肌肉疼痛，屈伸不利
- D、痹证晚期可出现关节变形
- E、肢体筋脉弛缓，软弱无力

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 “肢体筋脉弛缓，软弱无力”属于痿证的特点。

22、下列关于颤证病机的叙述中，错误的是

- A、病理性质属本虚标实
- B、以阴津精血亏虚为主
- C、基本病机为肝风内动，筋脉失养
- D、与肝、肾、心关系密切
- E、病理因素为风、火、痰、瘀

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 颤证其病位在筋脉，与肝、肾、脾等脏关系密切。



23、泄泻之内因，关键在

- A、肝郁
- B、肾虚
- C、湿盛
- D、脾虚
- E、胃失和降

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 外邪致泻以湿邪最为重要，其他诸多邪气需与湿邪兼夹，方易成泻；内因则以脾虚最为关键。

24、不属于消渴并发症的是

- A、水肿
- B、中风
- C、雀目、夜盲
- D、疮疖痈疽
- E、肺胀

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 消渴病久，容易并发眩晕、肺癆、胸痹心痛、中风、雀目、疮痈、水肿等病证。

25、六味地黄丸可用于治疗

- A、不寐心脾两虚证
- B、不寐痰热扰心证
- C、不寐肝火扰心证
- D、不寐心肾不交证
- E、不寐心胆气虚证

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 不寐之心肾不交证
治法：滋阴降火，交通心肾。
代表方：六味地黄丸合交泰丸加减。

26、外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别，下列哪项无意义

- A、病程的长短
- B、起病的缓急
- C、咳嗽的多少



- D、疾病的新久
- E、属实属虚

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽辨外感内伤：外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

27、与尿石症病机关系最密切的是

- A、风热
- B、血瘀
- C、痰凝
- D、气滞
- E、湿热

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 尿石症多由肾虚和下焦湿热引起，病位在肾、膀胱和溺窍，肾虚为本，湿热为标。

28、肛管、直肠黏膜、直肠全层、部分乙状结肠向下移位的疾病称为

- A、肛裂
- B、肛周脓肿
- C、内痔
- D、肛瘘
- E、脱肛

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 脱肛是直肠黏膜、肛管、直肠全层和部分乙状结肠向下移位，脱出肛门外的一种疾病。

29、关于肉瘿说法错误的是

- A、柔韧而圆
- B、如肉之团
- C、发展缓慢
- D、属于恶性肿瘤
- E、好发于中年人

【隐藏答案】



【正确答案】 D

【答案解析】 肉瘿是瘿病中较常见的一种，其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿，属甲状腺的良性肿瘤。

30、治疗瘾疹血虚风燥证，应首选的方剂是

- A、麻黄桂枝各半汤
- B、消风散
- C、防风通圣散
- D、当归饮子
- E、二仙汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 瘾疹之血虚风燥证

证候：反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热；舌红少津，脉沉细。

治法：养血祛风，润燥止痒。

方药：当归饮子加减。

31、颈痈，内治法应选用的方剂是

- A、银翘散
- B、五味消毒饮
- C、黄连解毒汤
- D、普济消毒饮
- E、仙方活命饮

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 中医外科学中，颈痈内治法的代表方：牛蒡解肌汤或银翘散加减。

32、临床上最常见的乳房疾病是

- A、乳痈
- B、乳漏
- C、乳岩
- D、乳癖
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 乳癖发病率占乳房疾病的 75%，是临床上最常见的乳房疾病。



33、关于切开法说法错误的是

- A、面部疔疮，尤其是口鼻部位，应忌早期开刀
- B、进刀时，刀头要求向上挑取，不宜向下割划
- C、在关节部位，宜谨慎开刀，切口应越过关节
- D、手指脓肿，应从侧方切开
- E、病人体弱应先内服调补药，然后开刀

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 切开法的适应症：一切外疡，却已成脓者。

切口选择：选择脓肿最低点或最薄弱处进刀。一般疮疡宜循经直切；乳房部应以乳头为中心，放射状切开；面部脓肿应尽量沿皮肤自然纹理切开；手指脓肿，应从侧方切开；关节区附近的脓肿，切口尽量避免越过关节；关节区脓肿，一般实行横切口、弧形切口或“S”形切口；肛旁低位脓肿，应以肛管为中心做放射状切开。

切开时以右手握刀，刀锋向外。在关节和筋脉的部位宜谨慎开刀；如患者过于体弱，切开时应注意体位并做好充分准备，以防晕厥；凡颜面疔疮，尤其在鼻唇部位，忌早期切开。切开后，由脓自流，切忌用力挤压。

34、好发于学龄儿童的癣是

- A、花斑癣
- B、体癣
- C、手癣
- D、白癣
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 白秃疮：相当于西医的白癣。本病是头癣的一种，多见于学龄儿童，男性多于女性。

35、下列哪项不是丹毒的临床特点

- A、边界清楚
- B、不易复发
- C、病起突然，恶寒发热
- D、局部皮肤忽然变赤
- E、局部皮肤灼热肿胀，迅速扩大

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 丹毒是患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。其特点是病起突然，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，边界清楚，迅速扩大，数日内可逐渐痊愈，但容易复发。

36、股肿相当于西医的

- A、动脉硬化性闭塞症
- B、下肢深静脉血栓形成
- C、下肢静脉曲张
- D、气行坏疽
- E、以上皆非

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 股肿是相当于西医的下肢深静脉血栓形成，以往称血栓性深静脉炎。主要表现为肢体水肿、疼痛、浅静脉曲张三大主证，疾病后期还可伴有小腿色素沉着、皮炎、臃疮等。

37、疮疡三陷证中，火陷证的治法是

- A、托毒透邪，养阴清心开窍
- B、生津养胃，清心解毒
- C、凉血清热解毒，兼顾护津液
- D、补益气血，清心安神开窍
- E、温补脾肾，清心开窍

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 火陷证，当凉血清热解毒为主，并顾护津液；干陷证，当补养气血，托毒透邪；虚陷证，当温补脾肾或生津养胃。

38、以下是顾步汤适用的脱疽证候是

- A、热毒伤阴证
- B、气阴两虚证
- C、寒湿阻络证
- D、血脉瘀阻证
- E、湿热毒盛证

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脱疽之热毒伤阴证

证候：皮肤干燥，毫毛脱落，趾（指）甲增厚变形，肌肉萎缩，趾（指）呈干性坏疽；口干欲饮，便秘溲赤；舌红，苔黄，脉弦细数。

治法: 清热解毒, 养阴活血。

代表方: 顾步汤加减。

39、根据阴挺的分度, 宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$, 未达处女膜缘为

- A、I度轻型
- B、I度重型
- C、II度轻型
- D、II度重型
- E、III度

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 阴挺分度

I度轻型: 宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$, 未达处女膜缘。

I度重型: 宫颈已达处女膜缘, 阴道口可见子宫颈。

II度轻型: 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。

II度重型: 部分宫体脱出阴道口。

III度: 宫颈与宫体全部脱出阴道口外。

40、与月经产生关系最密切的是

- A、肝、脾、肾
- B、心、肝、肺
- C、心、肝、脾
- D、肾、肺、脾
- E、肾、肝、心

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 五脏之中, 肾藏精, 肝藏血, 脾生血, 心主血, 肺主气, 气帅血, 在月经产生中各司其职, 如肾气旺盛, 使天癸泌至; 肝血充足, 气机条达, 则经候如期; 脾胃健运, 则血海充盈, 血循常道。故在月经产生的机理中, 与肾、肝、脾关系尤为密切。

41、月经后期肾虚证的治法是

- A、温经散寒调经
- B、理气行滞调经
- C、补肾养血调经
- D、补血益气调经
- E、扶阳祛寒调经

【隐藏答案】



【正确答案】 C

【答案解析】 月经后期之肾虚证

主要证候: 周期延后, 量少, 色黯淡, 质清稀, 或带下清稀; 腰膝酸软。头晕耳鸣, 面色晦黯, 或面部黯斑; 舌淡, 苔薄白, 脉沉细。

治法: 补肾养血调经。

方药: 当归地黄饮。

42、治疗经间期出血之湿热证, 应首选的方剂是

- A、举元煎
- B、补中益气汤
- C、加减一阴煎
- D、清肝止淋汤
- E、逐瘀止血汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 经间期出血之湿热证

主要证候: 两次月经中间, 阴道出血量稍多, 色深红, 质黏腻, 无血块。平时带下量多色黄, 小腹时痛; 神疲乏力, 骨节酸楚, 胸闷烦躁, 口苦咽干, 纳呆腹胀, 小便短赤; 舌质红, 苔黄腻, 脉细弦或滑数。

治法: 清利湿热, 固冲止血。

方药: 清肝止淋汤加减。

43、经行浮肿脾肾阳虚证, 应首选

- A、金匱肾气丸
- B、右归丸合苓桂术甘汤
- C、参苓白术散
- D、二仙汤合苓桂术甘汤
- E、肾气丸合苓桂术甘汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 经行浮肿之脾肾阳虚证

主要证候: 经行面浮肢肿, 按之没指, 晨起头面肿甚, 月经推迟, 经行量多, 色淡, 质薄; 腹胀纳减, 腰膝酸软, 大便溏薄; 舌淡, 苔白腻, 脉沉缓, 或濡细。

治法: 温肾化气, 健脾利水。

方药: 肾气丸合苓桂术甘汤。

44、月经过少血瘀证的治法是

- A、活血化瘀调经
- B、养血活血调经

- C、扶阳益肾调经
- D、养血益气调经
- E、滋肾养肝调经

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 月经过少之血瘀证

主要证候：经行涩少，色紫黯，有血块；小腹胀痛，血块排出后胀痛减轻；舌紫黯，或有瘀斑、瘀点，脉沉弦或沉涩。

治法：活血化瘀调经。

方药：桃红四物汤或通瘀煎。

45、月经先期肝郁血热证的治法是

- A、疏肝清热，固冲调经
- B、疏肝健脾，摄血调经
- C、疏肝清热，凉血调经
- D、补肾疏肝，调经止血
- E、疏肝解郁，理气调经

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 月经先期之肝郁血热证

主要证候：月经提前，量或多或少，经色深红或紫红，质稠，经行不畅，或有块；或少腹胀痛，或胸闷胁胀，或乳房胀痛，或烦躁易怒，口苦咽干；舌红，苔薄黄，脉弦数。

治法：疏肝清热，凉血调经。

方药：丹栀逍遥散。

46、癥瘕气滞血瘀证，可选用

- A、银甲丸
- B、桂枝茯苓丸
- C、少腹逐瘀汤
- D、血府逐瘀汤
- E、香棱丸

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 癥瘕之气滞血瘀证

主要证候：下腹部结块，触之有形，按之痛或无痛，小腹胀满，月经先后不定，经血量多有块，经行难净，经色黯；精神抑郁，胸闷不舒，面色晦暗，肌肤甲错；舌质紫黯，或有瘀斑，脉沉弦涩。



治法: 行气活血, 化瘀消癥。

方药: 香棱丸或大黄(庶虫)虫丸。

47、不孕症肝气郁结证, 应首选的方剂是

- A、调肝汤
- B、柴胡疏肝散
- C、逍遥散
- D、开郁种玉汤
- E、定经汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 不孕症之肝气郁结证

主要证候: 婚久不孕, 月经或先或后, 经量多少不一, 或经来腹痛; 或经前烦躁易怒, 胸胁乳房胀痛, 精神抑郁, 善太息; 舌暗红或舌边有瘀斑, 脉弦细。

治法: 疏肝解郁, 理血调经。

方药: 开郁种玉汤或百灵调肝汤。

48、月经过多气虚证的经血特点是

- A、色鲜红, 质黏稠
- B、色深红, 有血块
- C、色淡暗, 质清稀
- D、色淡红, 质清稀
- E、色紫暗, 有血块

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 月经过多之气虚证

主要证候: 经行量多, 色淡红, 质清稀; 神疲肢倦, 气短懒言, 小腹空坠, 面色(白光)白; 舌淡, 苔薄, 脉细弱。

治法: 补气摄血固冲。

方药: 举元煎或安冲汤。

49、止带方常用于治疗带下过多的何证型

- A、脾虚证
- B、湿毒证
- C、肾阳虚证
- D、肾阴虚证
- E、湿热下注证

【隐藏答案】



【正确答案】 E

【答案解析】 带下过多之湿热下注证

主要证候: 带下量多, 色黄或呈脓性, 质黏稠, 有臭气, 或带下色白质黏, 呈豆渣样, 外阴瘙痒; 小腹作痛, 口苦口腻, 胸闷纳呆, 小便短赤; 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清利湿热, 佐以解毒杀虫。

方药: 止带方。

50、产后红恶露的持续天数是

- A、9~10 天
- B、11~12 天
- C、3~4 天
- D、5~6 天
- E、7~8 天

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 恶露是产后自子宫排出的余血浊液, 先是暗红色的血性恶露, 也称红恶露, 约持续 3~4 天干净。

51、患者产后身痛肾虚证, 应首选的方剂是

- A、养荣壮肾汤
- B、左归丸
- C、归肾丸
- D、金匱肾气丸
- E、右归丸

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 产后身痛之肾虚证

主要证候: 产后腰膝、足跟疼痛, 艰于俯仰, 头晕耳鸣, 夜尿多; 舌淡黯, 脉沉细弦。

治法: 补肾养血, 强腰壮骨。

方药: 养荣壮肾汤加秦艽、熟地黄。

52、治疗子肿脾虚证的代表方剂是

- A、鲤鱼汤
- B、天仙藤散
- C、真武汤
- D、白术散
- E、四苓散



【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 子肿之脾虚证

主要证候：妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍及全身，皮薄光亮，按之凹陷不起，面色黄白无华，神疲气短懒言，口淡而腻，脘腹胀满，食欲不振，小便短小，大便溏薄；舌淡体胖，边有齿痕，舌苔白润或腻，脉缓滑。

治法：健脾利水。

方药：白术散加砂仁或健脾利水汤。

53、小儿遗尿的病机主要是

- A、肾气不足，膀胱虚寒
- B、肺脾气虚，水道失约
- C、心肾失交，水火不济
- D、肝经郁热，疏泄失司
- E、脾肾气虚，下元不固

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关，其中尤以肾气不足、膀胱虚寒为多见。

54、下列各项，不属小儿汗证病机的是

- A、阴阳失调
- B、湿热迫蒸
- C、肺卫不固
- D、营卫失调
- E、气阴亏虚

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿汗证病机：

- (1) 肺卫不固；
- (2) 营卫失调；
- (3) 气阴亏虚；
- (4) 湿热迫蒸。

55、与哮喘发病关系最密切的脏腑是

- A、肺脾肾
- B、肺心肝
- C、肺脾心



- D、肺肝脾
- E、肝脾肾

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 哮喘的发病原因有外因和内因两个方面。内因责之于肺、脾、肾三脏功能不足，导致痰饮内伏，成为哮喘之夙根。外因责之于感受外邪，接触异物、异味以及嗜食咸酸等。

56、学龄期儿童药剂用量是成人量的

- A、2/3
- B、1/2
- C、1/6
- D、1/3
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿用药剂量常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握，中药汤剂可采用下列比例用药：新生儿用成人量的 1/6，乳婴儿用成人量的 1/3，幼儿用成人量的 1/2，学龄期儿童用成人量的 2/3 或接近成人量。

57、疳证临床尤多见于

- A、1 岁以下小儿
- B、3 岁以下小儿
- C、5 岁以下小儿
- D、7 岁以下小儿
- E、9 岁以下小儿

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 疳证临床尤多见于 5 岁以下小儿。

58、下列各项，有关水肿的预防与调护，错误的是

- A、锻炼身体，增强体质，提高抗病能力
- B、预防感冒，保持皮肤清洁，彻底治疗各种皮肤疮毒
- C、发病早期可适当活动，晚期需卧床休息
- D、水肿期及血压升高者，应限制钠盐的摄入
- E、每日准确记录尿量、入水量和体重，监测血压



【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿水肿之预防与调护

- (1) 锻炼身体, 增强体质, 提高抗病能力。
- (2) 预防感冒, 保持皮肤清洁, 彻底治疗各种皮肤疮毒。
- (3) 发病早期应卧床休息, 待病情好转后逐渐增加活动。
- (4) 水肿期及血压升高者, 应限制钠盐及水的摄入。每日准确记录尿量、入水量和体重, 监测血压。

59、病毒性心肌炎好发于

- A、出生~1 个月小儿
- B、1 个月~1 岁小儿
- C、1~3 岁小儿
- D、3~10 岁儿童
- E、10 岁以上儿童

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 病毒性心肌炎是由病毒感染引起的以局限性或弥漫性心肌炎性病变为主的疾病。以神疲乏力、面色苍白、心悸、气短、肢冷、多汗为临床特征。本病发病以 3~10 岁小儿为多。

60、猩红热的发热与出疹的关系是

- A、发热 1~2 天出疹, 疹点细小有痒感
- B、发热数小时至 1 天出疹, 出疹时热高
- C、发热 3~4 天, 热退疹出
- D、发热 3~4 天, 皮疹出现, 热度增高
- E、发热 2 天, 出现斑疹、丘疹、水疱及结痂

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 丹痧西医学称为“猩红热”。猩红热发热数小时至 1 天出疹, 出疹时热高。

61、积滞的病变脏腑主要是

- A、胃、小肠
- B、胃、大肠
- C、脾、小肠
- D、脾、大肠
- E、脾、胃

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 积滞常由喂养不当，伤及脾胃，或脾胃虚损，复伤乳食所致，其病变脏腑在脾胃。

62、厌食的基本治疗法则是

- A、消食导滞
- B、运脾开胃
- C、健脾助运
- D、理气醒脾
- E、养胃育阴

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 厌食以运脾开胃为基本原则。

63、小儿睡时露睛，属于

- A、脾胃不和
- B、肝脾不和
- C、脾虚气弱
- D、胃气不降
- E、肾不纳气

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿寐时眼睑张开而不能闭合，属于脾虚气弱。

64、水痘好发于

- A、秋冬
- B、春秋
- C、冬春
- D、春夏
- E、夏秋

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 本病一年四季均可发生，以冬春二季发病率高。

65、小儿感冒后容易出现咳嗽加剧，喉间痰鸣的症状，其原因是

- A、脾常不足



- B、肺常不足
- C、肝常有余
- D、肾常不足
- E、心常有余

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿“肺常不足”，肺气宣发肃降功能尚不完善，加之小儿冷暖不知自调，一旦护养失宜，易于感受外邪，导致肺的宣肃功能失常，在临床上出现感冒、咳嗽、肺炎喘嗽等肺系病证，使肺系疾病成为儿科发病率最高的一类疾病。

66、口疮风热乘脾证，治疗首选

- A、桑菊饮
- B、泻白散
- C、导赤散
- D、白虎汤
- E、银翘散

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 口疮之风热乘脾证

证候：以口颊、上颚、齿龈、口角溃烂为主，甚则满口糜烂，周围黏膜嫩红，疼痛拒食，烦躁不安，口臭，涎多，小便短赤，大便秘结，或伴发热，舌红，苔薄黄，脉浮数，指纹紫。

治法：疏风散火，清热解毒。

代表方剂：银翘散。

67、小儿水肿气阴两虚证的治法是

- A、滋阴补肾，平肝潜阳
- B、益气养阴，利水消肿
- C、益气健脾，利水消肿
- D、清热解毒，利水消肿
- E、活血化瘀，利水消肿

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿水肿之气阴两虚证

证候：面色无华，腰膝酸软，或有浮肿，耳鸣目眩，咽干口燥，舌稍红，苔少，脉细弱。

治法：益气养阴，利水消肿。

代表方剂：六味地黄丸加黄芪。



68、儿童注意力缺陷多动障碍的发病年龄多见于

- A、新生儿期
- B、婴儿期
- C、幼儿期
- D、学龄期
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 儿童注意力缺陷多动症男孩多于女孩，多见于学龄期儿童。

69、小儿营养不良的标准是体重低于正常均值的

- A、95%
- B、90%
- C、85%
- D、70%
- E、60%

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 体重低于正常均值的 85% 者为营养不良。

70、下列各项中属于前后配穴法的是

- A、急性胃痛取足三里、梁丘
- B、咳嗽取膻中、风门
- C、牙痛取合谷、内庭
- D、肝气郁结证取太冲、内关
- E、下肢外侧痛取环跳、阳陵泉

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 牙痛取合谷、内庭——同名经配穴法；肝气郁结证取太冲、内关——同名经配穴法；下肢外侧痛取环跳、阳陵泉——本经配穴法；急性胃痛取足三里、梁丘——本经配穴法。故本题选 B。

71、太溪穴位于

- A、内踝高点与跟腱之间凹陷处
- B、外踝高点与跟腱之间凹陷处
- C、足内侧外踝后方



- D、外踝下缘凹陷处
- E、内踝前下方凹陷中

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 太溪:

【定位】 在踝区, 内踝尖与跟腱之间的凹陷中。

72、以下各项中, 不属于拔罐治疗作用的是

- A、消肿止痛
- B、解毒杀虫
- C、通经活络
- D、祛风散寒
- E、行气活血

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 拔罐法具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用。

73、足三阴经从开始部位至内踝上 8 寸段的分布是

- A、厥阴在前, 少阴在中, 太阴在后
- B、少阴在前, 太阴在中, 厥阴在后
- C、厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后
- D、太阴在前, 少阴在中, 厥阴在后
- E、太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后, 至内踝上 8 寸以上, 太阴交出于厥阴之前。

74、足少阳胆经的络穴是

- A、丰隆
- B、飞扬
- C、光明
- D、大钟
- E、蠡沟

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】络脉由经脉分出之处各有一穴，称络穴。光明为足少阳胆经络穴；大钟为足少阴肾经络穴；蠡沟为足厥阴肝经络穴。丰隆为足阳明胃经络穴；飞扬为足太阳膀胱经络穴。

75、五输穴中，所入为

- A、经
- B、合
- C、井
- D、荣
- E、输

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 所出为井，所溜为荣，所注为输，所行为经，所入为合。

76、有关晕针处理方法的叙述，不正确的是

- A、予以饮温开水或糖水
- B、重者可刺人中、素髎、内关、足三里等穴
- C、立即停止针刺，将针全部起出
- D、使患者平卧，头部抬高
- E、宽衣解带，注意保暖

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 晕针的处理中：使患者平卧即可，不要将头部抬高，以免影响头部供血。

77、十二经脉中，阴经与阴经的交接部位在

- A、胸腹部
- B、指（趾）内侧端
- C、腹部
- D、胸部
- E、四肢内侧

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 十二经脉中，阴经与阴经的交接部位在胸部。

78、可治疗齿痛、牙关不利、颊肿、口角歪斜等病证的腧穴是

- A、颊车

- B、头维
- C、四白
- D、承泣
- E、地仓

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 颊车【主治】齿痛、牙关不利、颊肿、口角歪斜等局部病证。

79、脾经在循行中，未与以下何处发生联系

- A、肝
- B、心
- C、舌
- D、咽
- E、膈

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 足太阴脾经，起于足大趾末端，沿着大趾内侧赤白肉际，经过大趾本节后的第 1 跖趾关节后面，上行至内踝前面，再沿小腿内侧胫骨后缘上行，至内踝上 8 寸处交于足厥阴经之前，再沿膝股部内侧前缘上行，进入腹部，属脾，联络胃；再经过横膈上行，夹咽部两旁，系舌根，分散于舌下。其支脉，从胃上膈，注心中。

80、以下各项中，不属于天枢穴主治病证的是

- A、腹痛、腹胀
- B、便秘、腹泻
- C、疝气
- D、痛经
- E、月经不调

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 天枢【主治】①腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病证；②月经不调、痛经等妇科疾患。

81、位于小腿内侧，胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中的腧穴是

- A、足三里
- B、阴陵泉
- C、曲泉
- D、地机

E、阳陵泉

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 阴陵泉【定位】在小腿内侧，胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。

82、足太阴脾经的终止穴是

- A、大包
- B、章门
- C、隐白
- D、大敦
- E、厉兑

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 足太阴脾经起于隐白，止于大包。

83、主治齿痛、鼻出血、热病的是

- A、条口
- B、上巨虚
- C、内庭
- D、丰隆
- E、下巨虚

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 上巨虚为大肠经的下合穴，主治痢疾、便秘、肠痛、腹胀、腹痛等；内庭为足阳明胃经的荥穴，主治齿痛、鼻出血、热病等；丰隆为足阳明胃的络穴，主治痰多，哮喘，咳嗽，胸痛等；下巨虚为小肠之下合穴，可治疗腹泻、痢疾、小腹痛等胃肠病证以及下肢痿痹等。

84、下列不属于足太阴经主治范围的是

- A、肾病
- B、脾胃病
- C、妇科病
- D、口舌病
- E、前阴病

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 足太阴脾经主要治疗的病症有脾胃病、妇科病、前阴病以及经脉循行处病，如口舌病。肾脏病为足少阴肾经的主治病症，不归属于脾经。

二、A2

85、孙某，女性，38岁，反复发作气急痰鸣5年余。10分钟前受寒复发，喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，渴喜热饮，形寒怕冷，面色青晦，舌苔白滑，脉浮紧。此病证的治法是

- A、祛风涤痰，降气平喘
- B、补肺纳肾，降气化痰
- C、清热宣肺，化痰定喘
- D、宣肺散寒，化痰平喘
- E、解表散寒，清化痰热

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 冷哮证

证候主症：喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，口不渴或渴喜热饮，形寒怕冷，天冷或受寒易发，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

治法：宣肺散寒，化痰平喘。

86、患者，女性，40岁。自觉发热近1年，多为低热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红苔黄，脉弦数。治疗本病首选的方剂是

- A、一贯煎
- B、黄连温胆汤
- C、清肝饮
- D、龙胆泻肝汤
- E、丹栀逍遥散

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 内伤发热之气郁发热证

证候主症：发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红苔黄，脉弦数。

治法：疏肝理气，解郁泄热。

代表方：丹栀逍遥散加减。

87、患者杨某，眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉细涩。治法宜选用

- A、补益气血，调养心脾
- B、平肝潜阳，清火息风
- C、化痰祛湿，健脾和胃
- D、祛瘀生新，活血通窍
- E、滋养肝肾，益精填髓

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 眩晕之瘀血阻窍证

证候主症：眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩或细涩。

治法：祛瘀生新，活血通窍。

88、患者虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。辨证为

- A、不寐之心肾不交证
- B、不寐之心胆气虚证
- C、不寐之肝火扰心证
- D、不寐之痰热扰心证
- E、不寐之心脾两虚证

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 不寐之心胆气虚证。主症：虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。

89、患者泄泻多日，便质清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。同时伴有恶寒发热头痛，肢体酸痛的症状。治疗宜选用

- A、升麻葛根汤
- B、四神丸
- C、痛泻要方
- D、葛根芩连汤
- E、藿香正气散

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻之寒湿内盛证。主症：泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。若兼外感风寒，则恶寒发热头痛，肢体酸痛，苔薄白，脉浮。治法：散寒化湿。代表方：藿香正气散加减。



90、患者发病急骤，痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，里急后重明显，壮热口渴，舌红绛苔黄燥，脉滑数。其诊断是

- A、寒湿痢
- B、休息痢
- C、湿热痢
- D、疫毒痢
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 疫毒痢主症：起病急骤，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，大便频频，痢下鲜紫脓血。腹痛剧烈，后重感特著，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝。

91、患者呕吐多为清水痰涎，胸闷纳差，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。其证候是

- A、痰饮内阻
- B、饮食停滞
- C、胃阴不足
- D、外邪客胃
- E、脾阳不振

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脾不运化，痰饮内停，胃气上逆则呕吐清水痰涎，脘闷不食；水饮上犯，清阳之气不展则头眩；水饮凌心则心悸；苔白腻，脉滑为痰饮停留之征。故诊断为呕吐痰饮内阻证。

92、患者，男性，46岁。发现血糖升高近8年，小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，阳痿，舌淡白而干，脉沉细无力。治疗本病的首选方剂是

- A、十全大补汤
- B、七味白术散
- C、六味地黄丸
- D、金匱肾气丸
- E、右归丸

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 消渴之阴阳两虚证

证候主症：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸



软，四肢欠温，畏寒肢冷，阳痿或月经不调，舌苔淡白而干，脉沉细无力。

治法：滋阴温阳，补肾固涩。

代表方：金匮肾气丸加减。

93、孙某，男，49岁。平素身体虚弱，今日突然昏仆，不省人事，目合口张，手撒肢冷，汗多，小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A、肾气丸
- B、补阳还五汤
- C、归脾汤
- D、参附汤合生脉散
- E、六味地黄丸

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 中风之脱证

证候主症：突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱或脉微欲绝。

治法：回阳救阴，益气固脱。

代表方：参附汤合生脉散加味。亦可用参麦注射液或生脉注射液静脉滴注。

94、金某，女性，22岁。1周来双侧肩、肘、膝关节游走性疼痛，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，有皮下结节，伴有发热、恶风、汗出、口渴，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A、痹证的风湿热痹
- B、痹证痰瘀痹阻证
- C、痹证的行痹
- D、痹证的着痹
- E、痹证的痛痹

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 风湿热痹

证候主症：游走性关节疼痛，可涉及一个或多个关节，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，可有皮下结节或红斑，常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉滑数或浮数。

95、一患者，呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。中医辨证为呕吐

- A、肝气犯胃证
- B、外邪犯胃证
- C、痰饮内阻证



- D、食滞内停证
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呕吐之肝气犯胃证

证候主症：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。

96、患者，女，35岁。长期低热，头晕眼花，心悸不宁，面白少华，唇甲淡白，舌质淡，脉细。其治法是

- A、益气养血
- B、滋阴清热
- C、补肝益肾
- D、疏肝清热
- E、活血化瘀

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干所述，诊断为内伤发热之血虚发热。治疗宜选用益气养血之法。血虚发热主症：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。

97、邓某，男，30岁。半年前因工受伤后，眩晕时作，头痛如刺，精神不振，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉细涩。其治疗应首选的方剂是

- A、归脾汤
- B、天麻钩藤饮
- C、半夏白术天麻汤
- D、左归丸
- E、通窍活血汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 头痛之瘀血阻窍证

证候主症：眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩或细涩。

治法：祛瘀生新，活血通窍。

代表方：通窍活血汤加减。

98、患者，女性，55岁。颈前肿物，生长迅速，质地坚硬如石，表面凹凸不平，推之不移，声音嘶哑，并可出现吞咽时移动受限。应首选的治疗措施是

- A、中药内服、外敷



- B、内服、外敷、熏洗
- C、中药内服
- D、中药外敷
- E、手术切除

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 石瘿：多见于 40 岁以上患者，女多于男，或既往有肉瘿病史。颈前多年存在的肿块，生长迅速，质地坚硬如石，表面凹凸不平，推之不移，并可出现吞咽时移动受限。

石瘿的治疗原则：石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

99、患者，男性，25 岁。转移性右下腹痛 6 小时，临床诊为肠痈。现除轻度腹痛外，尚有轻度发热，恶心纳呆，小便微黄，舌苔白腻，脉弦滑。其治法是

- A、行气祛瘀，通腑排脓
- B、理气活血，通腑透脓
- C、理气行瘀，疏化导滞
- D、行气活血，通腑泄热
- E、理气透脓，通腑泄热

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肠痈之瘀滞证

证候：转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按，伴恶心纳差，可有轻度发热。苔白腻，脉弦滑或弦紧。

治法：行气活血，通腑泄热。

代表方：大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

100、患者，男性，42 岁。背部皮下肿块，无疼痛，生长缓慢，软似棉，肿似馒，皮色不变，不紧不宽，如肉之隆起。其诊断是

- A、气瘤
- B、血瘤
- C、脂瘤
- D、骨瘤
- E、肉瘤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肉瘤是发于皮里膜外、由脂肪组织过度增生而形成的良性肿瘤。其特点是软似棉，肿似馒，皮色不变，不紧不宽，如肉之隆起。相当于西医的脂肪瘤。西医所称的肉瘤是指发生于软组织的恶性肿瘤，如脂肪肉瘤、纤维肉瘤等，与本病有质的区别，临证中不可混淆。



101、患者，男性，27 岁。3 天来尿道口红肿，尿急、尿频、尿痛，淋漓不止，尿液浑浊如脂，尿道口溢脓，舌红苔黄腻，脉滑数。西医诊断为急性淋病。治疗应首选

- A、萆薢渗湿汤
- B、四妙勇安汤
- C、知柏地黄丸
- D、龙胆泻肝汤
- E、清营汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 淋病之湿热毒蕴证（急性淋病）

证候：尿道口红肿，尿液混浊如脂，尿道口溢脓，尿急，尿频，尿痛，尿道灼热，严重者尿道黏膜水肿，附近淋巴结红肿疼痛，女性宫颈充血、触痛，并有脓性分泌物，或有前庭大腺红肿热痛等；可伴有发热等全身症状；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，解毒化浊。

方药：龙胆泻肝汤酌加土茯苓、红藤、萆薢等。

102、患者，女，50 岁。阴部瘙痒难忍，坐卧不宁，外阴皮肤粗糙增厚，有抓痕，黏膜充血破溃，带下量多，色黄如脓，味腥臭；伴心烦易怒，胸胁满痛，口苦口腻，小便黄赤；苔黄腻，脉弦滑，其治疗方法为

- A、清热利湿，化瘀止痛
- B、疏肝解郁，理血调经
- C、清热利湿，杀虫止痒
- D、燥湿化痰，行滞调经
- E、滋阴补肾，清肝止痒

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 阴痒肝经湿热证

主要证候：阴部瘙痒难忍，坐卧不宁，外阴皮肤粗糙增厚，有抓痕，黏膜充血破溃，或带下量多，色黄如脓，或呈泡沫米泔样，或灰白如凝乳，味腥臭；伴心烦易怒，胸胁满痛，口苦口腻，食欲不振，小便黄赤；舌体胖大，色红，苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热利湿，杀虫止痒。

方药：龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤，外用蛇床子散。

103、患者经行头痛，甚或巅顶掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红；烦躁易怒，口苦咽干；舌质红，苔薄黄，脉弦细数。首选治疗方剂是



- A、柴胡疏肝散
- B、羚角钩藤汤
- C、一贯煎
- D、逍遥散
- E、丹栀逍遥散

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 经行头痛之肝火证

主要证候：经行头痛，甚或巅顶掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红；烦躁易怒，口苦咽干；舌质红，苔薄黄，脉弦细数。

治法：清热平肝息风。

方药：羚角钩藤汤。

104、患者妊娠 40 天，阴道少量出血 6 天，色淡暗，腰酸、下腹坠痛 3 天，面部暗斑，舌淡，苔白，脉沉细滑尺脉弱。其证候是

- A、脾虚证
- B、血瘀证
- C、气血虚弱证
- D、肾虚证
- E、血热证

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 胎动不安之肾虚证

主要证候：妊娠期阴道少量下血，色淡黯，腰酸、腹痛、下坠，或曾屡孕屡堕，头晕耳鸣，夜尿多，眼眶黯黑或有面部黯斑；舌淡，苔白，脉沉细滑尺脉弱。

治法：补肾健脾，益气安胎。

方药：寿胎丸加党参、白术或滋肾育胎丸。

105、患者未婚，月经 9 个月未行，心悸气短，头晕眼花，面色萎黄，神疲肢倦；舌淡，苔薄，脉沉缓。其证候是

- A、气阴两伤证
- B、脾虚证
- C、肝肾不足证
- D、肾气虚证
- E、气血虚弱证

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 闭经之气血虚弱证

主要证候：月经周期延迟、量少、色淡红、质薄，渐至经闭不行；神疲肢倦，头



晕眼花, 心悸气短, 面色萎黄; 舌淡, 苔薄, 脉沉缓或细弱。

治法: 益气养血调经。

方药: 人参养荣汤。

106、患者王某, 产后恶寒发热, 鼻流清涕, 头痛, 肢体酸痛。无汗; 舌苔薄白, 脉浮紧。治疗应首选的方剂是

- A、五味消毒饮
- B、桃红消瘀汤
- C、荆穗四物汤
- D、生化汤加味
- E、补中益气汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 产后发热之外感证

主要证候: 产后恶寒发热, 鼻流清涕, 头痛, 肢体酸痛, 无汗; 舌苔薄白, 脉浮紧。

治法: 养血祛风, 疏解表邪。

方药: 荆穗四物汤加防风、苏叶或参苏饮。

107、患者, 女性, 26 岁, 已婚。分娩时失血较多, 产后小腹隐隐作痛, 喜按, 恶露量少、色淡, 头晕眼花, 大便干燥, 舌淡苔薄, 脉细弱。应首先考虑的是

- A、产后恶露过少
- B、产后大便不通
- C、产后血晕
- D、产后腹痛
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 产后腹痛主要是气血运行不畅, 迟滞而痛, 有虚实之分。虚者以血虚多见, 由于产后失血, 冲任空虚, 胞宫失养, 气血运行无力, 而使血流运行迟缓, 滞而腹痛; 实者以血瘀为主, 可因肝郁气滞或受寒而致瘀血停滞胞宫, 不通则痛。

根据患者症状辨证为产后腹痛之气血两虚证。

主要证候: 产后小腹隐隐作痛数日不止, 喜按喜揉, 恶露量少, 色淡红, 质稀无块, 面色苍白, 头晕眼花, 心悸怔忡, 大便干结; 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

治法: 补血益气, 缓急止痛。

方药: 肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。



108、患者，女，45 岁。月经不规律 9 个月，现阴道出血 40 天，量时多时少，近 3 天量极多、色淡、质稀，伴气短神疲，面浮肢肿，舌淡苔薄白，脉沉弱。

治疗应首选

- A、清热固经汤
- B、保阴煎
- C、举元煎
- D、补中益气汤
- E、固本止崩汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 崩漏之脾虚证

主要证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不尽，血色淡，质清稀；面色（白光）白，神疲气短，或面浮肢肿，小腹空坠，四肢不温，纳呆便溏；舌质淡胖，边有齿印，苔白，脉沉弱。

治法：补气摄血，固冲止崩。

方药：固本止崩汤或固冲汤。

109、患者停经 50 天，7 天前查尿妊娠试验阳性，近 3 天恶心，呕吐酸水，恶闻油腻，口干口苦，胸满胁痛，舌淡红，苔微黄，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A、香砂六君子汤
- B、橘皮竹茹汤
- C、左金丸
- D、小半夏加茯苓汤
- E、加味温胆汤

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠恶阻肝胃不和证

主要证候：妊娠早期，恶心，呕吐酸水或苦水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。

治法：清肝和胃，降逆止呕。

方药：橘皮竹茹汤或苏叶黄连汤加减。

110、患儿，5 岁。发热 39℃，喉核赤肿，咽喉疼痛，吞咽不利，鼻塞流涕，头痛身痛，舌红，苔薄黄，脉浮数。其证候是

- A、风热搏结证
- B、热毒炽盛证
- C、肺胃阴虚证
- D、脾胃积热证
- E、肺胃蕴热证



【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 乳蛾之风热搏结证

证候：喉核赤肿，咽喉疼痛，或咽痒不适，吞咽不利，发热重，恶寒轻，鼻塞流涕，头痛身痛，舌红，苔薄白或黄，脉浮数或指纹浮紫。

治法：疏风清热，利咽消肿。

代表方剂：银翘马勃散。

111、患儿，5岁。反复外感，恶风、恶寒，面色少华，四肢不温，多汗易汗，舌淡红，苔薄白，脉无力，指纹淡红。其治疗方剂是

- A、玉屏风散
- B、黄芪桂枝五物汤
- C、四君子汤
- D、归脾汤
- E、生脉散

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 反复呼吸道感染之营卫失调证

证候：反复外感，恶风、恶寒，面色少华，四肢不温，多汗易汗，舌淡红，苔薄白，脉无力，指纹淡红。

治法：调和营卫，益气固表。

代表方剂：黄芪桂枝五物汤。

112、患儿，2岁。发热1天，症见全身见散在细小淡红色皮疹，喷嚏，流涕，偶有咳嗽，精神不振，胃纳欠佳，枕部髂核肿大，咽红，舌苔薄白。其诊断是

- A、丹痧
- B、水痘
- C、麻疹
- D、奶麻
- E、风痧

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 风痧即风疹，是感受风痧时邪，以轻度发热，咳嗽，全身皮肤出现细沙样玫瑰色斑丘疹，耳后及枕部髂核（淋巴结）肿大为特征的一种急性出疹性传染病。初期类似感冒，发热1天左右，皮肤出现淡红色斑丘疹。1~5岁多见。

113、患儿，刚刚满月。口腔满布白屑，周围焮红，发热、多啼，口干，大便干结，小便黄赤，舌红，苔薄白，脉滑，指纹发紫。治疗首选



- A、麦味地黄丸
- B、知柏地黄汤
- C、清热泻脾散
- D、凉膈散
- E、导赤散

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 鹅口疮之心脾积热证

症状：口腔满布白屑，周围焮红较甚，面赤，唇红，或伴发热、烦躁、多啼，口干或渴，大便干结，小便黄赤，舌红，苔薄白，脉滑或指纹青紫。

治法：清心泻脾。

方药：清热泻脾散加减。

114、患儿，足踝浮肿，甚或颜面及全身浮肿，面色无华，神疲乏力，四肢欠温，小便短少，舌淡嫩，苔薄白，脉沉迟无力。其治法是

- A、补益气血，佐以运脾
- B、养血柔肝，活血化瘀
- C、滋阴生津，养血安神
- D、健脾温阳，利水消肿
- E、调脾健运，开胃进食

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 疔肿胀证

证候：足踝浮肿，甚或颜面及全身浮肿，面色无华，神疲乏力，四肢欠温，小便短少，舌淡嫩，苔薄白，脉沉迟无力。

治法：健脾温阳，利水消肿。

方药：防己黄芪汤合五苓散。

115、患儿，1岁。1周前有上呼吸道感染史，1天前始出现臀部及双下肢鲜红色皮疹，呈对称分布，色泽鲜红，大小不一，伴痒感，腹痛时作，双踝肿痛，尿色鲜红，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A、黄连解毒汤
- B、犀角地黄汤
- C、麻黄连翘赤小豆汤
- D、银翘散
- E、连翘败毒散

【隐藏答案】

【正确答案】 E



【答案解析】 紫癜之风热伤络证

证候：起病较急，全身皮肤紫癜散发，尤以下肢及臀部居多，呈对称分布，色泽鲜红，大小不一，或伴痒感，可有发热、腹痛、关节肿痛、尿血等，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

治法：疏风散邪，清热凉血。

代表方剂：连翘败毒散。

116、患者，女性，43 岁。眩晕半年，加重 1 周，伴神疲乏力，面色（白光）白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应在主穴基础上，配

- A、百会、太阳、印堂
- B、气海、脾俞、胃俞
- C、风池、肝俞、肾俞
- D、中脘、内关、解溪
- E、百会、上星、风池

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 眩晕，气血两虚配气海、脾俞、胃俞。

117、患者，女性，50 岁。头痛多年，后头部疼痛固定不移，痛如锥刺，舌暗，脉细涩。针灸治疗除主穴外，宜取

- A、阿是穴、血海、膈俞
- B、三阴交、肝俞、脾俞
- C、后溪、申脉、侠溪
- D、太阳、太溪、侠溪
- E、太冲、太溪、侠溪

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 患者头痛多年，应为内伤头痛。疼痛部位固定不移，痛如锥刺，舌暗，应考虑为瘀血头痛。故除主穴外，瘀血头痛配血海、膈俞。

118、患者，女性，48 岁。失眠 1 年，多梦少寐，入睡迟，易惊醒，多疑善惊，气短头晕，舌淡，脉弦细。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A、肝俞、间使
- B、脾俞、胃俞
- C、心俞、胆俞
- D、心俞、肾俞
- E、心俞、脾俞

【隐藏答案】



【正确答案】 C

【答案解析】 不寐之心胆气虚证，配心俞、胆俞。

119、患者两眼红肿疼痛，眵多，畏光，流泪，兼见头痛，发热，脉浮数。针灸治疗宜

- A、少商、上星毫针泻法
- B、内庭、曲池毫针泻法
- C、少商、太阳点刺出血
- D、行间、侠溪点刺出血
- E、外关、中渚点刺出血

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 根据题干症状诊断为：目赤肿痛。目赤肿痛的治疗操作：毫针泻法，太阳、少商点刺出血。

120、某患者，40 岁。喉痒干咳 2 天，无痰，咽喉干痛，唇鼻干燥，伴鼻塞、头痛、微寒、身热，舌质红少津，苔薄黄，脉浮数。其治疗应首选的方剂是

- A、清金化痰汤
- B、沙参麦冬汤
- C、桑菊饮
- D、桑杏汤
- E、杏苏散

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 咳嗽之风燥伤肺证

证候主症：干咳，连声作呛，喉痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，无痰或痰少而黏，不易咯出，或痰中带有血丝，口干，初起或伴鼻塞、头痛、微寒、身热等表证，舌质红干而少津，苔薄白或薄黄，脉浮数或小数。

治法：疏风清肺，润燥止咳。

代表方：桑杏汤加减。

三、B

- 1、A. 枳实导滞丸
- B. 小柴胡汤
- C. 香苏散
- D. 葛根芩连汤
- E. 枳术丸

<121> 、胃痛寒邪客胃证，兼见恶寒、身热等风寒表证者，可加



A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 胃痛寒邪客胃证，兼见恶寒、身热等风寒表证者，可加香苏散以疏散风寒。

<122> 、胃痛饮食伤胃证，胃脘胀痛而便秘者，可用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 胃痛饮食伤胃证，若胃脘胀痛而便秘者，可合用小承气汤或改用枳实导滞丸以通腑行气。

2、A. 柴胡疏肝散

B. 龙胆泻肝汤

C. 玉女煎

D. 桑菊饮

E. 银翘散

<123> 、鼻衄热邪犯肺证的主治方剂为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 鼻衄热邪犯肺证

证候主症：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，脉数。

治法：清泄肺热，凉血止血。

代表方：桑菊饮加减。

<124> 、鼻衄肝火上炎证的主治方剂为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 鼻衄肝火上炎证

证候主症：鼻衄，头痛，目眩，耳鸣，烦躁易怒，两目红赤，口苦，舌红，脉弦数。

治法：清肝泻火，凉血止血。

代表方：龙胆泻肝汤加减。



- 3、A. 热痛重着，活动后或可减轻
B. 腰部冷痛重着，转侧不利
C. 腰部刺痛，痛处固定
D. 腰膝冷痛，喜温喜按，遇劳更甚
E. 腰部隐痛，五心烦热

<125> 、湿热腰痛的主症特点是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 湿热腰痛

证候主症：腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤，苔黄腻，脉濡数或弦数。

<126> 、肾阳虚腰痛的主症特点是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肾阳虚

证候主症：腰部冷痛，缠绵不愈，局部发凉，喜温喜按，遇劳更甚，卧则减轻，常反复发作，少腹拘急，面色（白光）白，肢冷畏寒，舌质淡，脉沉细无力。

- 4、A. 左归丸
B. 大补元煎
C. 滋水清肝饮
D. 黄连阿胶汤
E. 二阴煎

<127> 、治肾精不足之眩晕首选

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 眩晕肾精不足证

证候主症：眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精滑泄，耳鸣齿摇。或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色（白光）白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。

治法：滋养肝肾，益精填髓。

代表方：左归丸加减。

<128> 、治疗肾虚头痛首选

- A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 肾虚头痛

证候主症: 头痛且空, 眩晕耳鸣, 腰膝酸软, 神疲乏力, 滑精或带下, 舌红少苔, 脉细无力。

治法: 养阴补肾, 填精生髓。

代表药: 大补元煎加减。

5、A. 小便混浊, 白如泔浆, 尿道不痛

B. 小便混浊, 状如脂膏, 尿热涩痛

C. 发热, 小便赤热, 尿时灼痛

D. 排出砂石, 排尿中断, 腰酸绞痛

E. 小腹胀满, 尿涩疼痛, 余沥不尽

<129> 、膏淋的临床特点是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 A 是尿浊的临床特点。B 是膏淋的临床特点。C 是热淋的临床特点。

D 是石淋的临床特点。E 是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

<130> 、尿浊的临床特点是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 A 是尿浊的临床特点。B 是膏淋的临床特点。C 是热淋的临床特点。

D 是石淋的临床特点。E 是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

6、A. 脂瘤

B. 肉瘤

C. 血管瘤

D. 失荣

E. 筋瘤

<131> 、皮脂腺中皮脂潴留郁积而形成的囊肿是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脂瘤是皮脂腺中皮脂潴留郁积而形成的囊肿, 又称粉瘤。



<132> 、体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 血管瘤是指体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤。

7、A. 润肠汤

B. 六磨汤

C. 补中益气汤

D. 萆薢渗湿汤

E. 凉血地黄汤合脾约麻仁丸

<133> 、肛裂之血热肠燥证的主治方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肛裂之血热肠燥证

证候：大便两三日一行，质干硬，便时肛门疼痛、滴血或手纸染血，裂口色红，腹部胀满，溲黄。舌偏红，脉弦数。

治法：清热润肠通便。

方药：凉血地黄汤合脾约麻仁丸。

<134> 、肛裂之阴虚津亏证的主治方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肛裂之阴虚津亏证

证候：大便干结，数日一行，便时疼痛点滴下血，裂口深红。口干咽燥，五心烦热。舌红，苔少或无苔，脉细数。

治法：养阴清热润肠。

方药：润肠汤。

8、A. 归脾汤

B. 寿胎丸

C. 泰山磐石散

D. 补中益气汤

E. 保阴煎合二至丸

<135> 、气血虚弱型滑胎，首选

A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 滑胎气血虚弱证

主要证候：屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：益气养血，固冲安胎。

方药：泰山磐石散。

<136> 、治疗血热型滑胎，首选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 滑胎血热证

主要证候：屡孕屡堕，孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。

治法：清热养血，滋肾安胎。

方药：保阴煎合二至丸加白术。

9、A. 胶艾汤

B. 逍遥散

C. 当归芍药散

D. 温胞饮

E. 寿胎丸

<137> 、治疗妊娠腹痛血虚证，应首选的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠腹痛之血虚证

主要证候：妊娠后小腹绵绵作痛，按之痛减；面色萎黄，头晕目眩，或心悸少寐；舌淡，苔薄白，脉细滑弱。

治法：养血安胎止痛。

方药：当归芍药散加减。

<138> 、治疗妊娠腹痛虚寒证，应首选的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠腹痛之虚寒证

主要证候：妊娠后小腹冷痛，绵绵不休，喜温喜按；面色（白光）白，形寒肢冷，



纳少便溏；舌淡，苔白滑，脉沉细滑。

治法：暖宫止痛，养血安胎。

方药：胶艾汤加减。

10、A. 归肾丸

B. 滋血汤

C. 六味地黄丸

D. 保阴煎

E. 右归丸

<139> 、肾虚型月经过少的首选方是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 月经过少之肾虚证

主要证候：经量素少或渐少，色黯淡，质稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，或小腹冷，或夜尿多；舌淡，脉沉弱或沉迟。

治法：补肾益精，养血调经。

方药：归肾丸或当归地黄饮。

<140> 、血虚型月经过少的首选方是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 月经过少之血虚证

主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。

治法：养血益气调经。

方药：滋血汤或小营煎。

11、A. 生脉散合沙参麦冬汤

B. 补中益气汤合生脉饮

C. 黄芪桂枝五物汤

D. 玉屏风散合六君子汤

E. 金匱肾气丸合理中丸

<141> 、反复呼吸道感染脾肾两虚证应首选的方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 反复呼吸道感染之脾肾两虚证

证候：反复外感，面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。

治法：温补肾阳，健脾益气。

代表方剂：金匮肾气丸合理中丸。

<142> 、反复呼吸道感染肺脾阴虚证应首选的方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 反复呼吸道感染之肺脾阴虚证

证候：反复外感，面白颧红少华，食少纳呆，口渴，盗汗自汗，手足心热，大便干结，舌质红，苔少或花剥，脉细数，指纹淡红。

治法：养阴润肺，益气健脾。

代表方剂：生脉散合沙参麦冬汤。

12、A. 补肾地黄丸

B. 人参五味子汤

C. 益脾镇惊散

D. 大补阴丸

E. 归脾汤

<143> 、治疗佝偻病脾虚肝旺证首选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 佝偻病之脾虚肝旺证

证候：头部多汗，发稀枕秃，凶门迟闭，出牙延迟，坐立行走无力，夜啼不宁，易惊多惕，甚则抽搐，纳呆食少，舌淡苔薄，脉细弦。

治法：健脾助运，平肝息风。

代表方剂：益脾镇惊散。

<144> 、治疗佝偻病肺脾气虚证首选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 佝偻病之肺脾气虚证

证候：多汗夜惊，烦躁不安，发稀枕秃，凶门增大，伴有轻度骨骼改变，形体虚胖，肌肉松软，食欲不振，易反复感冒，舌淡苔薄白，脉细无力。

治法: 健脾补肺。

代表方剂: 人参五味子汤。

- 13、A. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
B. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘
C. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
D. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
E. 外踝高点上 2 寸，腓骨前缘

<145> 、悬钟穴的定位是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 悬钟穴：外踝高点上 3 寸，腓骨前缘。

<146> 、丘墟穴的定位是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 丘墟穴：在外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

14、A. 五脏病证

B. 六腑病证

C. 急性病证

D. 表里经脉病证

E. 慢性病证

<147> 、络穴主治的是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 十二络脉的主要功能是加强十二经脉中表里经之间的联系，故络穴在临床上有主治表里两经有关病症的作用。《灵枢·邪气脏腑病形》记载合治六腑，概括了下合穴的主治功能，临床上的六腑病症均可选用相应的下合穴治疗。

<148> 、下合穴主治的是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 十二络脉的主要功能是加强十二经脉中表里经之间的联系，故络穴在临床上有主治表里两经有关病症的作用。《灵枢·邪气脏腑病形》记载合治六腑，概括了下合穴的主治功能，临床上的六腑病症均可选用相应的下合穴治疗。

- 15、A. 中府
B. 巨阙
C. 膻中
D. 中极
E. 中脘

<149> 、肺的募穴是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脏腑之气结聚于胸腹部的腧穴，称募穴。大肠的募穴是天枢。而肺的募穴是中府；心的募穴是巨阙；心包的募穴是膻中；膀胱的募穴是中极。

<150> 、膀胱的募穴是

- A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 脏腑之气结聚于胸腹部的腧穴，称募穴。大肠的募穴是天枢。而肺的募穴是中府；心的募穴是巨阙；心包的募穴是膻中；膀胱的募穴是中极。