



## 中医执业医师第一单元

### 一、A1

1、《素问》关于“丈夫六八”在生理上的表现是

- A、阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白
- B、肾气衰，发堕齿槁
- C、肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少
- D、肾藏衰，形体皆极
- E、三阳脉衰于上，面皆焦，发始白

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 《素问·上古天真论》记述了肾气由稚嫩到充盛，由充盛到衰少继而耗竭的演变过程，说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕，六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更。二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极。四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白。七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极。八八，则齿发去。”

2、气血两虚病变多见的脏腑是

- A、心与肺
- B、心与肾
- C、心与脾
- D、脾与胃
- E、肺与肝

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 心与脾的关系主要是表现在血液的生成和运行方面，心脾两虚多表现为气血两虚。

3、肾的“外华”是

- A、发
- B、爪
- C、毛
- D、面
- E、唇

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肾之华在发。



#### 4、推动血液运行的基本动力是

- A、心的功能
- B、脾的功能
- C、肝的功能
- D、肺的功能
- E、肾的功能

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 心阳的推动和温煦、肺气的宣发与肃降、肝气的疏泄是推动和促进血液运行的重要因素；心阴的宁静与凉润、脾气的统摄、肝气的藏血是控制和固摄血液运行的重要因素。但是血行于脉道，脉道的通利需要心气的推动，所以心的功能是基本动力。



#### 5、关于奇经八脉的叙述正确的是

- A、与五脏六腑有直接的络属关系
- B、和十二正经相似，分布规律
- C、左右对称分布
- D、调节十二经脉气血
- E、加强了足三阴、足三阳与心脏的关系

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 奇经是与正经相对而言的，由于其分布不如十二经脉那样有规律，与五脏六腑没有直接的属络联系，相互之间也没有表里关系，有异于十二正经，故曰“奇经”。又因其数有八，故曰“奇经八脉”。经别加强了足三阴、足三阳与心脏的关系。

奇经八脉的主要功能：密切十二经脉的联系；调节十二经脉气血；与某些脏腑（如脑、髓、女子胞、肾脏等）关系密切。

#### 6、具有加强十二经脉表里两经在体内的联系的经络是

- A、别络
- B、经筋
- C、皮部
- D、跷脉



E、经别

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 经别的生理功能：①加强十二经脉表里两经在体内的联系；②加强体表与体内、四肢与躯干的向心性联系；③加强了十二经脉和头面部的联系，这为“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍的理论奠定了基础。④扩大十二经脉的主治范围；⑤加强足三阴、足三阳经脉与心脏的联系。

7、偏食辛温燥热饮食，则可致

- A、心肝火旺
- B、肺胃热盛
- C、肺胃津伤
- D、肝经湿热
- E、肠胃积热

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 过于偏嗜寒热饮食，可导致人体阴阳失调而发生某些病变。如偏食生冷寒凉之品日久，则易损伤脾胃阳气，导致寒湿内生；如偏嗜辛温燥热饮食日久，则易致肠胃积热等。

8、关于瘀血的主要病症特点，说法错误的是

- A、疼痛
- B、肿块
- C、出血
- D、唇甲青紫
- E、脉滑数

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 瘀血致病，症状错综繁多，其主要病症特点大致如下：①疼痛：多为刺痛，痛处固定不移，拒按，夜间痛甚。②肿块：瘀血积于皮下或体内则可见肿块，肿块部位固定。③出血：因瘀血阻滞，损伤血络，血逸脉外而出血色紫黯，或夹有瘀血块。④色紫黯：一是面色紫黯，口唇、爪甲青紫等；二是舌质紫黯，或舌有瘀斑、瘀点等。⑤可出现肌肤甲错，脉涩或脉结代等。

9、气的升之太过或降之不及的病理变化为

- A、气滞
- B、气逆
- C、气陷

- D、气闭
- E、气脱

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 气逆：指气升之太过，或降之不及，以致气逆于上的一种病理状态。气逆，多因情志所伤，或饮食不当，或外邪侵犯，或痰浊壅阻所致，亦可因虚而无力下降导致气机上逆者。气逆多见于肺、肝、胃等脏腑。

## 10、内生“五邪”包括

- A、内风、内暑、内湿、内燥、内火
- B、内风、内寒、内暑、内燥、内火
- C、内风、内寒、内湿、内燥、内火
- D、内风、内寒、内湿、内暑、内热
- E、内风、内寒、内湿、内燥、内暑

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 内生“五邪”，指在疾病过程中，机体自身由于脏腑功能异常而导致化风、化火、化寒、化燥、化湿的病理变化。因病起于内，又与风、寒、湿、燥、火外邪所致病证的临床征象类似，故分别称为“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”，统称为内生“五邪”。

## 11、具有阴阳互滋互制关系的两脏是

- A、肝与脾
- B、肝与肾
- C、肺与肝
- D、肝与心
- E、脾与肾

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 阴阳互滋互制：肝气由肝精肝血所化所养，内含肝阴与肝阳；肾气由肾精化生，内含肾阴与肾阳。不仅肝血与肾精之间存在着同源互化的关系，而且肝肾阴阳之间也存在着相互资养和相互制约的联系。

## 12、在十二经脉中，足之三阳的走向是

- A、从足走头
- B、从手走头

- C、从脏走手
- D、从头走足
- E、从足走腹

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 手之三阴，从脏走手；手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足；足之三阴，从足走腹。

### 13、根据五行相生规律确定的治法是

- A、滋水涵木法
- B、抑木扶土法
- C、培土制水法
- D、佐金平木法
- E、泻南补北法

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 依据五行相生规律确定的治法，常用的有滋水涵木法、益火补土法、培土生金法和金水相生法四种。依据五行相克规律确定的治法，常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种。

### 14、心肾不交的治法是

- A、佐金平木
- B、扶土抑木
- C、滋水涵木
- D、培土生金
- E、泻南补北

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 佐金平木法是滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺病证的治法。  
抑木扶土法是疏肝健脾或平肝和胃以治疗肝脾不和（或）肝气犯胃病证的治法。  
滋水涵木法是滋肾阴以养肝阴的治法。  
培土生金法是健脾生气以补益肺气的治法。  
泻南补北法是泻心火补肾水以治疗心肾不交病证的治法。

### 15、贯心脉以行血气和下蓄丹田以资先天的是

- A、元气

- B、宗气
- C、营气
- D、卫气
- E、正气

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 宗气的生理功能主要有走息道以行呼吸、贯心脉以行血气和下蓄丹田以资先天三个方面。

16、具有繁衍生命，濡养脏腑，化血，化气，化神功能的是

- A、精
- B、气
- C、血
- D、津
- E、液

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 精的功能

(1) 繁衍生命：由先天之精与后天之精合化而生成生殖之精，具有繁衍生命的作用。

(2) 精能濡养脏腑：先天之精与后天之精充盛，则脏腑之精充盈，肾精也充盛，因而全身脏腑组织官窍得到精的充养，各种生理功能得以正常发挥。

(3) 精能化血：一是精可以转化为血，是血液生成的来源之一。二是精化血，是指精作为精微的生命物质，既可单独存在于脏腑组织中，也可不断地融合于血液中。如心精一般融入心血中，肝精一般融入肝血中以发挥其濡养作用。

(4) 精能化气：先天之精可以化生先天之气（元气），水谷之精可以化生谷气，再加上肺吸入的自然界清气，综合而成一身之气。精是气的化生本原。

(5) 精能化神：精是神化生的物质基础。只有积精，才能全神，这是生命存在的根本保证。反之，精亏则神疲，精亡则神散，生命休矣。

17、“髓之海”指的是

- A、脑
- B、脊柱
- C、骨
- D、脉
- E、胆

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脑为髓之海。



## 18、部位三焦的中焦包括

- A、心肺
- B、肝胆
- C、大肠
- D、小肠
- E、女子胞

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 横膈以上的胸部，包括心、肺两脏，以及头面部，称作上焦。

中焦在横膈以下、脐以上的上腹部，包括脾胃、肝胆等脏腑。

脐以下的部位为下焦，包括小肠、大肠、肾、膀胱、女子胞、精室等脏腑以及两下肢。

## 19、在发病过程中，邪气的作用是

- A、发病的重要条件
- B、对疾病无影响
- C、决定疾病的病程
- D、决定疾病的性质
- E、发病的决定因素

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 邪气是发病的重要条件。

## 20、下列哪项是“大实有羸状”的病机

- A、邪实正虚，正气无力祛除病邪
- B、实邪结聚于里，气血不能畅达于外
- C、阴虚邪恋，余热不退
- D、内生五邪兼正气不足
- E、邪气侵袭，伤及营卫气血

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 大实有羸状，指实邪结聚的病证，出现类似虚弱的假象。其机理是邪气过盛，结聚体内，阻滞经络，气血不能外达所致。

### 21、肺的阴阳属性是

- A、阴中之阴
- B、阴中之阳
- C、阳中之阳
- D、阳中之阴
- E、阴中之至阴

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 心肺居胸膈之上属阳，肺属金，位西方，通于秋，属阳中之阴。

### 22、下列各项，属于阳证的是

- A、表实热证
- B、里实寒证
- C、表实寒证
- D、里虚热证
- E、里实热证

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 阳证：凡见兴奋、躁动、亢进、明亮等表现的表证、热证、实证，以及症状表现于外的、上的、容易发现的，或病邪性质为阳邪致病、病情变化较快等，均属阳证范畴。

### 23、“冬伤于寒，春必病温”的发病类型是

- A、合病
- B、伏而后发
- C、感邪即发
- D、徐发
- E、继发

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 伏而后发，即指感受邪气后，并不立即发病，病邪在机体内潜伏一段时间，或在诱因的作用下，过时而发病。这种发病形式多见于外感性疾病和某些外伤。

### 24、具有“五脏六腑之海”之称的是

- A、督脉
- B、任脉

- C、冲脉
- D、带脉
- E、维脉

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 冲脉上行于头，下至于足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，通受十二经之气血，为总领诸经气血之要冲。当脏腑经络气血有余时，冲脉能加以涵蓄和贮存，而在脏腑经络气血不足时，则冲脉给予补充灌注，以维持人体各组织器官正常生理活动的需要。由于冲脉能调节十二经脉气血，故又称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。

## 25、下列属于火的特性的是

- A、稼穡
- B、曲直
- C、从革
- D、润下
- E、炎上

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡，是对五行特性的经典性概括。

## 26、与脾土相应的季节是

- A、秋
- B、冬
- C、春
- D、夏
- E、长夏

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 脾气与四时之外的“长夏”（夏至～处暑）相通应。长夏之季，气候炎热，而水较多，天气下迫，地气上腾，湿为热蒸，蕴酿生化，万物华实，合于土生万物之象，而人体的脾主运化，化生精气血津液，以奉生身，类于“土爰稼穡”之理，故脾与长夏，同气相求而相通应。

## 27、针对“阳虚则寒”产生的虚寒证治疗应

- A、阴中求阳
- B、阳中求阴

- C、阴阳互补
- D、寒热平调
- E、寒者热之

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** “阳虚则寒”的虚寒证治以“益火之源，以消阴翳”，也可“阴中求阳”，即补阳时适当佐以补阴药，如真武汤中大量补阳药中配以芍药，以阴中求阳。



## 28、五行中，“土”的“所胜”之行是

- A、木
- B、火
- C、土
- D、金
- E、水

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 土克水，故土之“所胜”为水。

## 29、心为五脏六腑之大主的理论依据是

- A、心总统魂魄
- B、心总统意志
- C、心主血脉
- D、心主情志
- E、心主神志

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 心藏神，主神志，主宰和协调人体脏腑形体官窍的生理活动，同时也主宰人体的心理活动，故称心为五脏六腑之大主。心因其藏神而为五脏六腑之大主。心神是机体生命活动的主宰。故心为五脏六腑之大主的理论依据是心主神志。

## 30、水谷之悍气指的是

- A、营气
- B、卫气
- C、宗气
- D、水谷之气

E、脏腑之气

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 卫气由水谷精微中的慓悍滑利部分化生，在脉外运行。《素问·痹论》说：“卫者，水谷之悍气也。其气慓疾滑利，不能入于脉也。故循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。”卫气行于脉外，外而皮肤肌腠，内而胸腹脏腑，布散全身。

**31、以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是**

- A、阴阳偏盛
- B、阴阳格拒
- C、阴阳偏衰
- D、阴阳互损
- E、阴阳离决

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 实热证，是指邪热亢盛、内外俱实的病证，在阴阳失调上，可看作阳偏盛。实寒是以寒邪盛为主，正气不虚的病证，可看作阴偏盛。阴阳偏盛，是指人体阴阳双方中的某一方的病理性亢盛状态，属邪气盛则实的实证。

**32、在脾胃的相互关系中，最根本的是**

- A、脾主升清，胃主降浊
- B、胃主纳谷，脾主磨谷
- C、脾燥胃湿，燥湿相济
- D、胃为水谷之海，脾为胃行其津液
- E、太阴湿土得阳始运，阳明燥土得阴自安

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 在脾胃的相互关系中，最根本的是脾主升清，胃主降浊。一升一降，相反相成。

**33、关于藏象的含义，表述正确的是**

- A、五脏的功能
- B、六腑的功能
- C、奇恒之腑的功能
- D、藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 藏象，近年来又写作“脏象”，是指藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象。



34、“肾为气之根”与肾的下述功能相关的是

- A、藏精
- B、主水
- C、主纳气
- D、化生元气
- E、温煦全身

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肾主纳气指肾气有摄纳肺所吸入的自然界清气，保持吸气的深度，防止呼吸表浅的作用。人体的呼吸功能，由肺所主，但吸入的清气，由肺气的肃降下达于肾，必须再经肾气的摄纳潜藏，使其维持一定的深度，以利于气体的交换。故说：“肺为气之主，肾为气之根。”



35、中医治疗出血证时，常加入一定量的补气药，其根据是

- A、气能行血
- B、气能摄血
- C、气能生血
- D、血能生气
- E、血能载气

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 在治疗出血证时加入补气药物主要是为了防止血液继续丢失，体现了气能摄血的作用。



36、瘦长体型者针灸治疗方法正确的是

- A、进针宜浅
- B、多用温灸
- C、刺激量宜大
- D、进针多捻转
- E、多用温针艾灸

【隐藏答案】

【正确答案】 A

**【答案解析】** 体质不同, 针灸治疗后的疼痛反应和得气反应有别。一般体质强壮者, 对针石、火焯的耐受性强, 体质弱者, 耐受性差; 肥胖体质者, 多气血迟涩, 对针刺反应迟钝, 进针宜深, 刺激量宜大, 多用温针艾灸; 瘦长体型者气血滑利, 对针刺反应敏感, 进针宜浅, 刺激量相应宜小, 少用温灸。

### 37、五脏藏五神, 肾藏

- A、魄
- B、志
- C、魂
- D、神
- E、意

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 五脏藏五神, 心藏神, 肺藏魄, 肝藏魂, 脾藏意, 肾藏志。

### 38、足阳明胃经与足太阴脾经交接位置是

- A、足大趾
- B、足小趾
- C、无名指
- D、食指
- E、目内眦

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 相表里的阴经与阳经在四肢末端交接, 足阳明胃经与足太阴脾经交接于足大趾端。

**【您的答案】** C

**【答案错误, 得分: 0】**

### 39、小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下, 说明了湿邪

- A、湿性趋下
- B、湿性黏滞
- C、湿性重浊
- D、湿为阴邪
- E、易阻气机

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

【答案解析】 湿性趋下，易袭阴位：湿邪类水属阴而有趋下之势，故湿邪为病，多易伤及人体下部。如水肿、湿疹、脚气等病以下肢较为多见，故《素问·太阴阳明论》说：“伤于湿者，下先受之。”小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下等，多由湿邪下注所致。

#### 40、暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于

- A、暑为阳邪，其性炎上
- B、暑性升散，伤津耗气
- C、暑多夹湿，阻遏气机
- D、暑性升发，易扰心神
- E、暑性干涩，易伤津液

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 暑性升散，易扰心神，易伤津耗气：暑为阳邪，易升发上犯，故易上扰心神、头目，出现心胸烦闷不宁、头昏、目眩、面赤等。暑邪伤人，可致腠理开泄而多汗。且汗出过多，不仅伤津，而且气随津脱则易耗气，故临床除常见口渴喜饮、尿赤短少等津伤之症外，往往可见气短、乏力，耗伤太过，清窍失养而突然昏倒、不省人事等。

#### 41、不属于蝉蜕功效的是

- A、疏散风热
- B、利咽开音
- C、明目退翳
- D、息风止痉
- E、宣肺祛痰

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 蝉蜕功效：疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。

#### 42、治疗无汗骨蒸和有汗骨蒸的药物分别是

- A、地骨皮、牡丹皮
- B、柴胡、牡丹皮
- C、地骨皮、胡黄连
- D、牡丹皮、地骨皮
- E、青蒿、地骨皮

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 牡丹皮与地骨皮二药均能清热凉血，退虚热，均可治血热吐衄、阴虚发热证。前人有“丹皮治无汗骨蒸，地骨皮治有汗骨蒸”之说，对阴虚发热证，无论有汗、无汗均可应用，并常相须为用。

#### 43、既可止痛，又可止呕、止泻功效的药物是

- A、吴茱萸
- B、干姜
- C、丁香
- D、延胡索
- E、姜黄

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 吴茱萸

性能：辛、苦，热。有小毒。归肝、脾、胃、肾经。

功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

应用：

- (1) 寒凝疼痛。为治肝寒气滞诸痛之主药。
- (2) 胃寒呕吐。
- (3) 虚寒泄泻。

#### 44、白茅根的功效是

- A、凉血止血，散瘀解毒消痈
- B、凉血止血，解毒敛疮
- C、凉血止血，化痰止咳，生发乌发
- D、凉血止血，清热利尿，清肺胃热
- E、化瘀止血，活血定痛

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 白茅根功效：凉血止血，清热利尿，清肺胃热。

#### 45、延胡索的功效是

- A、活血行气，通经止痛
- B、活血，行气，止痛
- C、活血行气，祛风止痛
- D、活血止痛，行气解郁
- E、活血止痛，利胆退黄

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 延胡索功效：活血，行气，止痛。

#### 46、紫苏子的功效是

- A、降气化痰，泻肺平喘，利水消肿
- B、降气化痰，润肺止咳，杀虫灭虱
- C、降气化痰，止咳平喘，润肠通便
- D、降气化痰，清肺止咳，降逆止呕
- E、降气化痰，润肺下气，止咳

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 紫苏子功效：降气化痰，止咳平喘，润肠通便。

#### 47、既可以开窍醒神，又可以治疗噤口痢的药物是

- A、麝香
- B、苏合香
- C、冰片
- D、石菖蒲
- E、远志

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 石菖蒲

功效：开窍醒神，化湿和胃，宁神益智。

应用：（1）痰蒙清窍，神志昏迷。

（2）湿阻中焦，脘腹痞满，胀闷疼痛。

（3）噤口痢。

（4）健忘，失眠，耳鸣，耳聋。

此外，还可用于声音嘶哑、痈疽疮疡、风湿痹痛、跌打伤痛等证。

#### 48、下列各项中不属于黄芪的功效的是

- A、补气健脾
- B、升阳举陷
- C、利水消肿
- D、托毒生肌
- E、补血生津

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 黄芪功效: 补气健脾, 升阳举陷, 益卫固表, 利尿消肿, 托毒生肌。



49、麦冬的归经叙述正确的是

- A、肺、心、肾
- B、心、肝、脾
- C、肺、心、胃
- D、肺、心、脾
- E、肝、心、肾

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 麦冬性能: 甘、微苦, 微寒。归胃、肺、心经。

功效: 养阴润肺, 益胃生津, 清心除烦。



50、硫黄外用治疗的病证是

- A、湿疹
- B、阳痿
- C、杨梅疮
- D、虚喘冷哮
- E、虚寒便秘

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 硫黄主治病证: 外用治疥癣, 湿疹, 阴疽疮疡; 内服治阳痿, 虚喘冷哮, 虚寒便秘。



51、牡丹皮与赤芍均具有的功效是

- A、清热凉血, 活血散瘀
- B、清热凉血, 解毒定惊
- C、清热凉血, 解毒透疹
- D、清热凉血, 泻火解毒
- E、清热凉血, 养阴生津

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 牡丹皮与赤芍，均味苦性微寒，均具有清热凉血，活血散瘀的功效，具有止血不留瘀，活血不动血的特点，血热，血瘀所致的病证常相须为用。同可用于治疗热入营血，斑疹吐衄；血滞经闭，痛经癥瘕，跌打瘀肿，痈肿疮毒等证。不同的是，牡丹皮兼辛味，清热凉血并能清透阴分伏热，可用于温热病后期，邪伏阴分，夜热早凉及肠痈腹痛等证。而赤芍苦泄，散瘀止痛力强，血滞诸证尤为多用，并能泻肝火，用于肝热目赤肿痛。

## 52、功效为镇惊安神、平肝潜阳、收敛固涩的药物是

- A、朱砂
- B、磁石
- C、龙骨
- D、琥珀
- E、远志

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 龙骨功效：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

## 53、下列何药为治疗湿痹及筋脉拘挛的要药

- A、独活
- B、羌活
- C、木瓜
- D、蕲蛇
- E、威灵仙

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 木瓜应用：

- (1) 风湿痹证。善舒筋活络，且能去湿除痹，尤为湿痹，筋脉拘挛要药，亦常用于腰膝关节酸重疼痛。
- (2) 脚气水肿。为脚气水肿常用药。
- (3) 吐泻转筋。

## 54、下列各项中具有解鱼蟹之毒功效的药物是

- A、白芷
- B、细辛
- C、紫苏
- D、香薷
- E、荆芥

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 紫苏功效: 解表散寒, 行气宽中, 解鱼蟹毒。

白芷功效: 解表散寒, 祛风止痛, 通鼻窍, 燥湿止带, 消肿排脓。

细辛功效: 解表散寒, 祛风止痛, 通窍, 温肺化饮。

香薷功效: 发汗解表, 化湿和中, 利水消肿。

荆芥功效: 祛风解表, 透疹消疮, 止血。

故根据题干要求, 除了C选项外, 其余各项均不具有解鱼蟹毒之功效。



**55、两种功效相似的药物配合应用, 可以增强原有药物的疗效, 这种配伍属于**

- A、相使
- B、相须
- C、相反
- D、相畏
- E、相恶

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 相须就是两种功效相似的药物配合应用, 可以增强原有药物的疗效。如麻黄配桂枝, 能增强发汗解表, 祛风散寒的作用; 石膏与知母配合, 能明显增强清热泻火的治疗效果。

**56、功效为行气利水, 杀虫截疟的药物是**

- A、槟榔
- B、雷丸
- C、使君子
- D、莱菔子
- E、苦楝皮

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 槟榔功效: 杀虫消积, 行气, 利水, 截疟。

**57、下列何药为收敛止血的要药**

- A、白及
- B、小蓟
- C、三七
- D、茜草
- E、地榆



**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 白及应用:

- (1) 出血证。为收敛止血之要药，可治疗体内外诸出血证。多用于肺胃出血证。
- (2) 痈肿疮疡，手足皲裂，水火烫伤。

**58、善于清中焦湿热的药物是**

- A、黄芩
- B、黄连
- C、黄柏
- D、苦参
- E、龙胆草

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 黄连性能：苦，寒。归心，脾，胃，胆，大肠经。尤长于清中焦湿热。黄芩善清泻肺火及上焦实热；黄柏长于清泻下焦湿热。

**59、治疗胃热呕秽，宜选用**

- A、知母
- B、芦根
- C、天花粉
- D、夏枯草
- E、石膏

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 芦根

功效：清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。

主治病证：热病烦渴；胃热呕秽；肺热咳嗽，肺痈吐脓；热淋涩痛。

**60、石膏与知母均有的功效是**

- A、除烦止渴
- B、消肿排脓
- C、清热利湿
- D、凉血解毒
- E、清热明目



【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 石膏与知母二药，均能清热泻火，除烦止渴，常用于温病气分实热证及肺热咳嗽等。但石膏清解力强，重在清泻火热，并偏重于清泻肺胃实火，常用于肺热喘咳，胃火牙痛等，煅石膏外用还能收敛生肌；知母则滋阴润燥力强，重在滋润肺，胃，肾阴，常用于阴虚火旺证。

61、功效为活血调经，利尿消肿，清热解毒的药物是

- A、泽兰
- B、红花
- C、蒲公英
- D、败酱草
- E、益母草

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 益母草功效：活血调经，利尿消肿，清热解毒。



62、牵牛子的功效是

- A、泻水逐饮，消肿散结
- B、泻下逐水，去积杀虫
- C、峻下冷积，逐水退肿
- D、祛痰利咽，外用蚀疮
- E、润肠通便，润肺止咳

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 牵牛子功效：泻下逐水，去积杀虫。



63、具有行气止痛，温中纳气功效的药物是

- A、青皮
- B、沉香
- C、木香
- D、佛手
- E、香附

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】沉香功效：行气止痛，温中止呕，纳气平喘。

**64、发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。治疗宜首选**

- A、黄连、木香
- B、黄柏、木香
- C、苦参、木香
- D、马齿苋、木香
- E、黄芩、木香

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 黄连大苦大寒，具有清热燥湿、泻火解毒之功，常用于湿热泻痢腹痛，里急后重，与木香同用，如香连丸。此为湿热泻痢，故选 A。

**65、除哪项外均有下乳作用**

- A、山楂
- B、穿山甲
- C、王不留行
- D、通草
- E、漏芦

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 山楂功效：消食化积，行气散瘀。

**66、治疗风湿痹证，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，应首选**

- A、秦艽
- B、五加皮
- C、桂枝
- D、白花蛇
- E、防己

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 五加皮

功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。

主治病证：风湿痹证；筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力；水肿，脚气。

67、具有补血调经，活血止痛，润肠通便功效的药物是

- A、当归
- B、白芍
- C、三七
- D、何首乌
- E、阿胶

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 当归功效：补血调经，活血止痛，润肠通便。

68、驱虫药的服用时间是

- A、空腹服
- B、饭后服
- C、定时服
- D、睡前服
- E、饭前服

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 驱虫药的服用时间是空腹服。

69、具有散寒止痛、理气和胃功效的药物是

- A、干姜
- B、高良姜
- C、小茴香
- D、花椒
- E、肉桂

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 小茴香功效：散寒止痛，理气和胃。

70、下列哪项是羚羊角、天麻、钩藤的共同功效

- A、息风止痉、平抑肝阳
- B、息风止痉、清肺平喘
- C、息风止痉、清肝明目

- D、息风止痉、祛风通络
- E、息风止痉、清热解毒

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 羚羊角有平肝息风，清肝明目，清热解毒的功效；天麻有息风止痉，平抑肝阳，祛风通络的功效；钩藤有清热平肝，息风定惊的功效，故共同点为息风止痉，平抑肝阳。

## 71、桔梗具有的功效为

- A、利气宽胸
- B、燥湿化痰
- C、宣肺祛痰
- D、温肺祛痰
- E、降气止呕

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 桔梗功效：宣肺，祛痰，利咽，排脓。

## 72、下列药物中不属于配伍禁忌的是

- A、藜芦与赤芍
- B、川贝母与川乌
- C、硫黄与厚朴
- D、水银与砒霜
- E、肉桂与赤石脂

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 十八反：乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白芍、白及；甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花；藜芦反人参、沙参、玄参、丹参、苦参、细辛、芍药。

十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，牙硝畏三棱，川乌、草乌畏犀角，人参畏五灵脂，官桂畏赤石脂。

## 73、能泻火除烦，并善于清泻三焦火邪的药物是

- A、石膏
- B、栀子
- C、芦根
- D、夏枯草

E、金银花

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 决明子功效：清热明目，润肠通便。

梔子功效：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。能清泻三焦之邪火、长于泻心火而除烦，善导心、肺、三焦之热及肝胆湿热之邪由小便而解，其清热利湿作用甚佳。

芦根功效：清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。

夏枯草功效：清热泻火，明目，散结消肿。

金银花功效：清热解毒，疏散风热，兼能凉血止痢。

#### 74、能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是

A、藁本

B、白芷

C、细辛

D、吴茱萸

E、苍耳子

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 藁本功效：祛风散寒，祛湿止痛，善治巅顶头痛。

白芷功效：解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。

细辛功效：解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。

吴茱萸功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

苍耳子功效：发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。

#### 75、具有润肺止咳，散结消肿功效的药物是

A、川贝母

B、旋覆花

C、百部

D、杏仁

E、桔梗

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 川贝母功效：清热化痰，润肺止咳，散结消肿。

旋覆花功效：降气化痰，降逆止呕。

百部功效：润肺止咳，杀虫灭虱。

苦杏仁功效：止咳平喘，润肠通便。

桔梗功效：宣肺，祛痰，利咽，排脓。



### 76、茯苓与薏苡仁均有的功效是

- A、利水渗湿，宁心安神
- B、利水渗湿，补益心脾
- C、利水渗湿，消肿排脓
- D、利水消肿，渗湿健脾
- E、利水渗湿，利尿通淋

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 茯苓与薏苡仁功效相似，均能利水消肿，渗湿健脾，用治水湿内停诸证以及脾虚证。但薏苡仁性偏寒凉，善清湿热，并能除痹，消肿排脓，还可用治风湿痹证，以及肺痈，肠痈等证。而茯苓性平，补益心脾，宁心安神。

### 77、属于滑石的功效是

- A、清肝明目
- B、清热除痹
- C、清热解暑
- D、清热凉血
- E、清肺化痰

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 滑石功效：利水通淋，清热解暑，收湿敛疮。

### 78、具有开窍醒神，化湿和胃，宁神益志功效的药物是

- A、苏合香
- B、石菖蒲
- C、牛黄
- D、冰片
- E、麝香

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 苏合香功效：开窍醒神，辟秽止痛。

石菖蒲功效：开窍醒神，化湿和胃，宁神益志。

牛黄功效：化痰开窍，凉肝息风，清热解毒。

冰片功效: 开窍醒神, 清热止痛。

麝香功效: 开窍醒神, 活血通经, 消肿止痛, 催生下胎。

### 79、消化性溃疡需紧急手术治疗的并发症是

- A、门脉高压性胃病
- B、恶性贫血
- C、急性胃穿孔
- D、幽门梗阻
- E、可疑癌变

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 消化性溃疡需紧急手术治疗的并发症是: 急性胃穿孔。

### 80、慢性型特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是

- A、输注大量免疫球蛋白
- B、应用免疫抑制剂
- C、输浓缩血小板
- D、脾脏切除术
- E、糖皮质激素

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 糖皮质激素为急性型和慢性型特发性血小板减少性紫癜发作期的首选药物。

### 81、可出现下壁心肌梗死特征性心电图改变的导联是

- A、V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>
- B、I、aVL、V<sub>5</sub>、V<sub>6</sub>
- C、V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>
- D、II、III、aVF
- E、V<sub>1</sub>~V<sub>5</sub>

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 下壁心梗在 II、III、aVF 导联上出现特征性心电图改变。

### 82、局限性非小细胞性肺癌首选的治疗方法是

- A、免疫治疗
- B、中医中药治疗
- C、化学药物治疗
- D、放射治疗
- E、手术治疗

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 手术治疗为非小细胞肺癌的主要治疗方法。

### 83、药物及化学物质是继发性再障的首位病因，最常见的药物是

- A、西咪替丁
- B、抗癫痫药
- C、有机砷
- D、磺胺
- E、氯霉素

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 药物及化学物质是继发性再障的首位病因。最常见的药物是氯霉素、抗肿瘤药和保泰松等解热镇痛药，其次是磺胺、有机砷及抗癫痫药，偶有西咪替丁、胍屈嗪、氯丙嗪及抗甲状腺药甲巯咪唑等。

### 84、我国高血压病患者最主要并发症是

- A、肾脏损害
- B、高血压性心脏病
- C、脑出血与脑梗死
- D、冠心病
- E、主动脉夹层

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 脑出血和脑梗死是高血压最主要的并发症。前者多在情绪激动、用力情况下出现，表现为剧烈头痛、恶心呕吐、偏瘫、意识障碍等；后者多在安静状态或睡眠中出现，多表现为三偏综合征或伴运动性失语，轻者仅表现为短暂脑缺血发作。

### 85、急性心肌梗死最多见的心律失常是

- A、束支传导阻滞
- B、心房颤动

- C、房性早搏
- D、室性心律失常
- E、房室传导阻滞

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 心肌梗死心律失常以室性心律失常最多。



### 86、发作时心电图 ST 段呈弓背向上抬高的心绞痛是

- A、变异型心绞痛
- B、卧位型心绞痛
- C、劳累性心绞痛
- D、稳定型心绞痛
- E、恶化型心绞痛

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 变异型心绞痛发作时则相关导联 ST 段呈弓背向上抬高。

### 87、十二指肠溃疡发病的主要机制是

- A、细胞更新能力减弱
- B、胃排空延迟
- C、胃酸、胃蛋白酶等侵蚀因素增强
- D、黏膜屏障减弱
- E、黏膜血流量减低

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 胃酸及胃蛋白酶分泌增多：胃酸在致病过程中发挥着重要的作用。胃酸及胃蛋白酶分泌增多是 DU 发病的重要因素。胃酸分泌增多是绝大多数消化性溃疡特别是 DU 发生的必要条件之一。

### 88、最易发生幽门梗阻的溃疡是

- A、球后溃疡
- B、胃多发溃疡
- C、胃角溃疡
- D、胃窦溃疡
- E、幽门管溃疡

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 幽门梗阻多发生于幽门管溃疡。

89、作为胃癌普查时首选的筛选试验是

- A、钡餐透视
- B、胃液分析
- C、胃镜及活检
- D、粪便隐血实验
- E、Hp 检测

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 粪便隐血试验常持续阳性, 可作为胃癌筛选的首选方法。

90、不属肝硬化代偿期表现的是

- A、脾脏轻度肿大
- B、肝功能轻度异常
- C、乏力、食欲减退
- D、食管胃底静脉曲张
- E、肝脏质地偏硬

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肝硬化代偿期临床表现: 症状轻微, 表现为乏力、食欲减退、腹部不适、恶心、上腹部隐痛、轻微腹泻等, 症状多呈间歇性。查体示肝脏轻度肿大, 质地偏硬, 无或轻度压痛, 脾轻度或中度肿大。肝功能检查多数正常或轻度异常。

91、原发性肝癌最常见的形态学类型是

- A、弥漫型
- B、结节型
- C、块状型
- D、巨块型
- E、小癌型

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 原发性肝癌按大体形态分类: 块状型最多见, 癌块直径多>5cm, 直径>10cm 者称巨块型, 易发生肝破裂。

### 92、慢性肾衰竭各系统表现中最常见的死亡原因是

- A、消化系统
- B、神经系统
- C、心血管系统
- D、血液系统
- E、呼吸系统

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾衰竭各系统表现中心血管系统为最常见死亡原因。

### 93、完全治愈白血病最有效的治疗方法是

- A、骨髓移植
- B、营养及药物支持治疗
- C、化学药物治疗
- D、免疫治疗
- E、放射治疗

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 骨髓移植: 是当前将白血病完全治愈最有希望的措施。

### 94、脾切除治疗特发性血小板减少性紫癜的主要机制是

- A、降低毛细血管通透性
- B、降低单核-巨噬细胞系统活性
- C、减少血小板抗体的产生
- D、延长血小板寿命
- E、抑制抗原抗体反应

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 脾脏切除: 是特发性血小板减少性紫慢性型患者治疗的重要方法, 其机制在于减少血小板抗体的产生, 消除血小板的破坏场所。

95、甲亢患者给以卡比马唑治疗 6 个月，病情基本控制，药物减量后进入维持阶段，维持期时间一般是

- A、6 个月
- B、3 个月
- C、1 个月
- D、2 个月
- E、1.5~2.5 年或更长

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 抗甲状腺药物（ATD）：有硫脲类（如丙硫氧嘧啶）和咪唑类（如甲巯咪唑和卡比马唑）两类药物。适应证：①病情轻、中度患者；②甲状腺轻、中度肿大；③年龄<20 岁；④孕妇、高龄或由于其他严重疾病不适宜手术者；⑤手术前和  $^{131}\text{I}$  治疗前的准备；⑥手术后复发且不适宜  $^{131}\text{I}$  治疗者。分为初治、减量和维持期 3 个阶段，疗程通常在 1.5~2.5 年或以上。不良反应有粒细胞减少、药疹和中毒性肝病。

96、慢性阻塞性肺疾病最主要的病因是

- A、感染
- B、氧化应激
- C、吸烟
- D、职业粉尘
- E、空气污染

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 吸烟是 COPD 最主要的病因。

97、特发性血小板减少性紫癜的主要病因为

- A、免疫因素
- B、肝脾作用
- C、感染
- D、骨髓巨核细胞成熟障碍
- E、脾功能亢进

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 免疫因素是 ITP 发病的主要原因。

98、甲状腺危象抑制 TH 合成治疗的首选药物为

- A、普萘洛尔
- B、丙硫氧嘧啶
- C、甲硫氧嘧啶
- D、甲巯咪唑
- E、卡比马唑

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 甲状腺危象的治疗：积极治疗甲亢是预防危象发生的关键。抢救措施包括：①抑制 TH 合成：使用大量抗甲状腺药物，首选丙硫氧嘧啶；②抑制 TH 释放：抗甲状腺药物、复方碘溶液和碘化钠；③迅速阻滞儿茶酚胺释放，降低周围组织对甲状腺激素的反应性：如普萘洛尔；④肾上腺糖皮质激素：常用氢化可的松；⑤对症治疗：如降温、镇静、保护脏器功能、防治感染等；⑥其他如血液透析、腹膜透析或血浆置换等。

### 99、糖尿病并发感染最常见的是

- A、泌尿系感染
- B、败血症
- C、化脓性细菌感染
- D、寄生虫感染
- E、胆管感染

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 糖尿病多为化脓性细菌感染、肺结核和真菌感染等。

### 100、下列哪项为再生障碍性贫血的主要发病机制

- A、免疫功能紊乱
- B、遗传因素
- C、造血干细胞缺陷
- D、缺乏造血原料
- E、造血微环境缺陷

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 造血干细胞缺陷为再障的主要发病机制。

### 101、用铁剂治疗缺铁性贫血，疗效表现最早的是

- A、红细胞平均血红蛋白量增多

- B、红细胞计数增多
- C、血红蛋白增加
- D、网织红细胞增加
- E、红细胞体积增大

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 缺铁性贫血患者服用铁剂后，短时期网织红细胞计数明显升高。

### 102、雄激素最适合治疗下列哪种贫血

- A、再生障碍性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、海洋性贫血
- D、慢性失血性贫血
- E、铁粒幼细胞贫血

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 雄激素为治疗非重型再障的首选药物。

### 103、X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A、充盈缺损
- B、胃壁蠕动减少呈皮革状
- C、黏膜呈锯齿状增粗
- D、有激惹及变形
- E、龛影

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 X 线钡餐检查有直接和间接两种征象。直接征象为龛影，对溃疡的诊断有确诊意义。

### 104、下列关于周围型肺癌的叙述，正确的是

- A、纤维支气管镜确诊率高
- B、约占肺癌的 3 / 4
- C、以腺癌多见
- D、生长在段以上的支气管
- E、位于肺门附近

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 周围型肺癌生长在段支气管及其分支以下者, 约占肺癌的 1 / 4, 以腺癌较为常见。

### 105、肺炎链球菌致病力最强的血清型是

- A、第 9 型
- B、第 12 型
- C、第 1 型
- D、第 2 型
- E、第 3 型

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肺炎链球菌为革兰阳性球菌, 根据其抗原性不同, 可分为 90 个血清型。成人致病菌多属 1~9 及 12 型, 其中以第 3 型毒力最强。

### 106、缓解哮喘症状的首选药物是

- A、沙丁胺醇
- B、糖皮质激素
- C、氨茶碱
- D、麻黄素
- E、溴化异丙托品

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】  $\beta_2$ 受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。有短效-速效  $\beta_2$ 受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林气雾剂, 短效-迟效  $\beta_2$ 受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林片剂, 长效-迟效  $\beta_2$ 受体激动剂如沙美特罗气雾剂, 长效-速效  $\beta_2$ 受体激动剂如福莫特罗干粉吸入剂等。

### 107、慢性肺心病的首要死亡原因是

- A、消化道出血
- B、肺性脑病
- C、酸碱失衡
- D、电解质紊乱
- E、心律失常

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 由于严重缺氧及二氧化碳潴留导致中枢神经功能紊乱, 出现谵妄、意识模糊甚至昏迷等一系列神经、精神表现, 称为肺性脑病, 是慢性肺心病首要死亡原因。

108、不属甲亢高代谢综合征表现的是

- A、糖耐量减低
- B、血胆固醇升高
- C、怕热、多汗
- D、多食善饥
- E、体重锐减

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 甲状腺高代谢综合征: 怕热、多汗、皮肤潮湿、低热、多食善饥、体重锐减和疲乏无力; 糖耐量减低或加重糖尿病; 血总胆固醇降低。

109、医疗事故争议协商不成的, 当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起多长时间内, 可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请

- A、1 个月内
- B、3 个月内
- C、6 个月内
- D、1 年内
- E、2 年内

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 医疗事故争议协商不成的, 当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起 1 年内, 可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请, 也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

110、具有高等学校医学专业本科以上学历, 需在执业医师指导下在医疗机构中试用期满几年方有资格参加执业医师考试

- A、6 个月
- B、1 年
- C、2 年
- D、3 年
- E、5 年

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 具有下列条件之一的, 可以参加执业医师资格考试:

(1) 具有高等学校医学专业本科以上学历, 在执业医师指导下, 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的;

(2) 取得执业助理医师执业证书后, 具有高等学校医学专科学历, 在医疗、预防、保健机构中工作满二年的;

(3) 具有中等专业学校医学专业学历, 在医疗、预防、保健机构中工作满五年的;

(4) 以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的, 经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐。

 www.med66.com

 www.med66.com

111、卫生行政法律关系主体违反卫生行政法律规范, 尚未构成犯罪所应承担的法律后果为

- A、刑罚
- B、民事责任
- C、刑事责任
- D、行政责任
- E、道德责任

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 卫生行政责任是指卫生行政法律关系主体违反卫生行政法律规范, 尚未构成犯罪所应承担的法律后果。

112、属于乙类传染病, 但采取甲类传染病的预防和控制措施的是

- A、霍乱
- B、鼠疫
- C、艾滋病
- D、流行性感冒
- E、人感染高致病性禽流感

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感, 采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施。其他乙类传染病和突发原因不明的传染病需要采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施的, 由国务院卫生行政部门及时报经国务院批准后予以公布、实施。

 医学教育网

 医学教育网  
www.med66.com

113、下列各项属于护士行为规范的是

- A、不过度医疗
- B、不违规签署医学证明文件
- C、使用适宜诊疗技术和药物

- D、竭诚协助医生诊治，密切观察患者病情
- E、严格遵循临床诊疗规范和技术操作规范

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 护士行为规范：第二十八条 竭诚协助医生诊治，密切观察患者病情。发现患者病情危急，应立即通知医师；在紧急情况下为抢救垂危患者生命，应及时实施必要的紧急救护。

#### 114、下列情形中，不属于按劣药论处的是

- A、超过有效期的药品
- B、不注明或者更改生产批号的药品
- C、未标明有效期或者更改有效期的药品
- D、国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- E、直接接触药品的包装材料和容器未经批准的药品

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 有下列情形之一的药品按劣药论处：

- (1) 未标明有效期或者更改有效期的；
- (2) 不注明或者更改生产批号的；
- (3) 超过有效期的；
- (4) 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的；
- (5) 擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的；
- (6) 其他不符合药品标准规定的。

选项 D 属于按假药论处的药品。

## 二、B

### 1、A.通因通用

B.塞因塞用

C.寒因寒用

D.寒者热之

E.热因热用

<115>、以上选项中适用于热结旁流的治则是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

<116>、以上选项中适用于真寒假热的治则是

A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 反治法是指顺从病症的外在假象而治的一种治疗原则。由于采用的方药性质与病症中假象的性质相同, 故又称为从治。包括①热因热用; ②寒因寒用; ③塞因塞用; ④通因通用。

1 题中所示是因实邪内阻出现通泄的症状, 因此当用通因通用之法。2 题中所示是阴盛格阳的真寒假热证, 寒充塞于内, 逼迫阳气浮越于外, 故可见身反不恶寒, 面赤如妆等假热之象, 但由于阴寒内盛是病本, 因此当用热因热用之法。



2、A.肝

B.肺

C.肾

D.脾

E.胃

<117>、生痰之源为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 脾为生痰之源, 肾为主水之脏。

<118>、主水之脏为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 脾为生痰之源, 肾为主水之脏。

3、A.繁衍生命

B.护卫肌表

C.濡养作用

D.充养血脉

E.化神作用

<119>、精、血、津液共同具有的功能是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

<120>、气的功能是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 气的功能：推动与调控、温煦与凉润、防御、固摄、中介；精的功能是：繁衍生命、濡养脏腑、化血、化气、化神；血的功能是：濡养、化神；津液的功能：滋润濡养、充养血脉。



4、A.胆

B.胃

C.小肠

D.大肠

E.三焦

<121>、主决断的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 胆主决断，调节情志。胆主决断是指胆具有判断事物、作出决定的作用。

<122>、主泌别清浊的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 泌别清浊，指小肠中的食糜在作进一步消化的过程中，随之分为清浊两部分。清者，即水谷精微和津液，由小肠吸收，经脾气的运输输布全身；浊者，即食物残渣和部分水液，经胃和小肠之气的作用通过阑门传送到大肠。

5、A.阴虚则热

B.阳虚则寒

C.通因通用

D.塞因塞用

E.寒因寒用

<123>、“壮水之主，以制阳光”的治法，适用于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 补其不足，即“虚则补之”，适用于疾病过程中人体阴阳中一方虚损不足的病变。“阴虚则热”的虚热，当“壮水之主，以制阳光”，也可“阳中求阴”，即在补阴时适当佐以补阳药，如肾阴虚衰而相火上僭的虚热证，可用滋阴降火的知柏地黄丸少佐温热药性的肉桂以阳中求阴。

<124>、“益火之源，以消阴翳”的治法，适用于

A B C D E



【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 “阳虚则寒”的虚寒则“益火之源，以消阴翳”，也可“阴中求阳”，即补阳时适当佐以补阴药，如真武汤中大量补阳药中配以芍药，以阴中求阳。

6、A.既能平肝潜阳，又能重镇降逆

B.既能平肝潜阳，又能清肝明目

C.既能平肝潜阳，又能软坚散结

D.既能平肝潜阳，又能清热解毒

E.既能平肝潜阳，又能息风止痉

<125>、珍珠母的功效是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 珍珠母功效：平肝潜阳，清肝明目，镇惊安神。

<126>、代赭石的功效是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 代赭石功效：平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

7、A.仙鹤草

B.白及

C.三七

D.炮姜

E.侧柏叶

<127>、具有温经止血功效的药物是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 炮姜功效：温经止血，温中止痛。

<128>、具有凉血止血功效的药物是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 侧柏叶功效: 凉血止血, 化痰止咳, 生发乌发。

8、A.杏仁

B.旋覆花

C.款冬花

D.紫菀

E.白芥子

<129>、有小毒, 婴儿应慎用的药物是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 杏仁使用注意: 阴虚咳喘及大便溏泻者忌用。用量不宜过大, 婴儿慎用。

<130>、性辛温, 久咳肺虚及阴虚火旺者忌用的药物是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 白芥子使用注意: 本品辛温走散, 耗气伤阴, 久咳肺虚及阴虚火旺者忌用; 消化道溃疡、出血者及皮肤过敏者忌用。用量不宜过大。

9、A.小茴香

B.虎杖

C.肉桂

D.干姜

E.吴茱萸

<131>、能使因下元虚衰所致上浮的虚阳回归故里的药物是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肉桂的应用: 虚阳上浮。能使因下元虚衰所致上浮的虚阳回归故里。故曰引火归原。

<132>、为治脾肾阳虚, 五更泄泻之常用药的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 吴茱萸的应用: 虚寒泄泻。为治脾肾阳虚, 五更泄泻之常用药, 如四神丸。



10、A.久煎

B.先煎

C.包煎

D.溶化

E.另煎

<133>、车前子、旋覆花入汤剂宜

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 包煎：主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物，宜先用纱布袋装好，再与其他药物同煎，以防止药液混浊或刺激咽喉引起咳嗽及沉于锅底，加热时引起焦化或糊化。如蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土等。

<134>、蜂蜜、饴糖入汤剂宜

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 溶化：又称烱化，主要是指某些胶类药物及黏性大而易溶的药物，为避免入煎粘锅或粘附其他药物影响煎煮，可单用水或黄酒将此类药加热溶化即烱化后，用煎好的药液冲服，也可将此类药放入其他药物煎好的药液中加热烱化后服用。如阿胶、鹿角胶、龟甲胶、鳖甲胶、鸡血藤胶及蜂蜜、饴糖等。

11、A.苦味

B.咸味

C.辛味

D.甘味

E.酸味

<135>、具有发散作用的药物其药味一般是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 辛味：有发散、行气、行血等作用。

<136>、具有收敛固涩作用的药物其药味一般是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 酸味：有收敛、固涩的作用。

- 12、A.胸痛、气短  
B.右上腹部血管杂音  
C.突发急性腹痛  
D.呕血、黑粪  
E.意识障碍

<137>、提示肝癌结节破裂的症状是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

<138>、提示肝癌伴有上消化道出血的表现是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 当肝表面的癌结节破裂，坏死的癌组织经血液流入腹腔时，可突然引起剧痛，出现急腹症表现。肝癌伴有上消化道出血常表现为呕血和黑粪。



- 13、A.红细胞管型  
B.脂肪管型  
C.透明管型  
D.蜡样管型  
E.白细胞管型

<139>、肾盂肾炎患者尿中常出现的管型是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

<140>、急性肾炎患者尿中常出现的管型是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 细胞管型

- (1) 红细胞管型见于急性肾炎、慢性肾炎急性发作、狼疮性肾炎、肾移植术后急性排斥反应等。
- (2) 白细胞管型提示肾实质感染性疾病，见于肾盂肾炎、间质性肾炎。
- (3) 肾小管上皮细胞管型提示肾小管病变，见于急性肾小管坏死、慢性肾炎晚期、肾病综合征等。

- 14、A.6个月疗程  
B.半年~1年疗程

### C.3 天疗法

### D.7 天疗程

### E.7~14 天疗程

<141>、治疗急性膀胱炎目前推荐的疗程是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 膀胱炎：目前推荐短疗程（3 天）疗法：选用喹诺酮类、半合成青霉素、头孢类或磺胺类等抗生素中的 1 种，连用 3 天，治愈率达 90%，可显著降低复发率。对无复杂因素存在的急性膀胱炎，可单用 1 种抗生素治疗。停药 7 天后需检查尿细菌培养，仍为阳性者，应继续给予 2 周抗生素治疗。对妊娠妇女、糖尿病患者和复杂性尿路感染者，应采用较长疗程抗生素治疗。

<142>、治疗急性肾盂肾炎的一般疗程是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 急性肾盂肾炎：尿标本采集后立即进行治疗，一般首选对革兰阴性杆菌有效的抗生素，但应兼顾革兰阳性菌感染。72 小时无效者根据药敏结果调整用药。常用抗生素有喹诺酮类、半合成青霉素类、头孢类，必要时联合用药。热退后连续用药 3 天改为口服，总疗程一般为 7~14 天。停药后第 2、6 周复查尿细菌定量培养，随后每月复查 1 次，随访中出现感染复发，应重新进行治疗。

### 15、A.急粒白血病

### B.急淋白血病

### C.急红白血病

### D.急单核白血病

### E.急巨细胞白血病

<143>、儿童最多见的急性白血病是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

<144>、成人患者中急性白血病最多见是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 白血病是指白细胞某一系列在造血组织中呈肿瘤性增殖，并浸润其他组织器官，正常造血受抑制的一种造血干细胞的恶性克隆性疾病。我国急性白血病比慢性白血病多见（约 5.5: 1）。成人患者中急粒白血病最多见，在儿童患者中急淋白血病多见。病因尚未阐明，现认为与物理、化学和生物等因素有关。

16、A.吡格列酮

B.氯磺丙脲

C.二甲双胍

D.格列本脲

E.阿卡波糖

<145>、应于进餐时服用的降糖药是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂：进餐时服用。主要有阿卡波糖、伏格列波糖。适应证：①2 型糖尿病或 IGT，尤其是餐后高血糖为主者；②1 型糖尿病用胰岛素时加用本药，可增加疗效，减少胰岛素剂量，避免发生餐前低血糖。

<146>、应于餐前半小时服用的降糖药是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 磺脲类：餐前半小时服用，主要不良反应为低血糖反应。主要有格列本脲、格列吡嗪、格列美脲等。适应证：①经饮食与运动治疗未能良好控制的非肥胖 2 型糖尿病患者；②肥胖 2 型糖尿病患者应用双胍类血糖控制仍不满意，或因胃肠道反应不能耐受，可加用或改用磺脲类；③胰岛素治疗每日用量在 0.3U / kg 以下者。

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

17、A.一级医疗事故

B.二级医疗事故

C.三级医疗事故

D.四级医疗事故

E.以上均不是

<147>、造成患者明显人身损害的其他后果属于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

<148>、造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍属于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度, 医疗事故分为四级:

一级医疗事故: 造成患者死亡、重度残疾的;

二级医疗事故: 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;

三级医疗事故: 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;

四级医疗事故: 造成患者明显人身损害的其他后果的。





18、A.医师的社会地位

B.医师的执业条件

C.医师的职责

D.医师的权利

E.医师的义务

<149>、医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 遵守法律、法规, 遵守技术操作规范属于执业医师的义务。

<150>、医师在执业活动中, 人格尊严、人身安全不受侵犯体现了

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 在执业活动中, 人格尊严、人身安全不受侵犯属于执业医师的权利。

## 中医执业医师第二单元

一、A1





1、三焦病证的传变中, 标志着病情由浅入深, 由轻到重的病理进程是

A、逆传

B、顺传

C、直中

D、合病

E、并病

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 三焦病证多由上焦手太阴肺经开始, 传入中焦, 进而传入下焦, 为顺传, 标志着病情由浅入深, 由轻到重的病理进程。

【您的答案】 A

【答案错误, 得分: 0】

## 2、实热证患者的卧姿表现为

- A、仰卧伸足, 掀去衣被
- B、蜷卧缩足, 喜加衣被
- C、但卧不得坐, 坐则晕眩
- D、卧时喜向内, 身重不能转侧
- E、卧时常向外, 身轻能自转侧

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 阳证、热证、实证则卧时常向外, 身轻能自转侧; 阴证、寒证、虚证则卧时喜向内, 身重不能转侧。实热证则仰卧伸足, 掀去衣被; 虚寒证则蜷卧缩足, 喜加衣被。

## 3、脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表现是

- A、沉脉
- B、实脉
- C、缓脉
- D、长脉
- E、滑脉

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 缓脉多见于湿病、脾胃虚弱, 亦可见于正常人。

## 4、以身热, 心烦懊(忪), 坐卧不安, 舌苔微黄, 脉数为主要表现的证候是

- A、热灼营阴证
- B、热陷心包证
- C、热盛动血证
- D、热盛动风证
- E、热扰胸膈证

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 热扰胸膈证临床表现: 身热, 心烦懊(忪), 坐卧不安, 舌苔微黄, 脉数。

5、自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状属于

- A、谵语
- B、郑声
- C、言謇
- D、独语
- E、错语

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 独语是指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。属阴证，多因心气不足，神失所养，或气郁生痰，蒙蔽心窍所致，常见于癫病、郁病。

6、病室有蒜臭气味多见于

- A、肾衰
- B、失血
- C、消渴病
- D、瘟疫类疾病
- E、有机磷中毒

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 病室有蒜臭气味，多见于有机磷中毒。

7、以口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦欲呕，脉弦为主要表现的病证是

- A、阳明病
- B、少阳病
- C、太阳病
- D、少阴病
- E、厥阴病

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 少阳病本证临床表现：口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦欲呕，脉弦。

8、引起肠道湿热证的病机是

- A、湿热内蕴，阻滞肠道
- B、里热炽盛，腑气不通
- C、津液亏损，肠失濡养
- D、痰热交结，阻滞肠道
- E、火热炽盛，壅积肠道

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肠道湿热证，因湿热内蕴，阻滞肠道所致，临床表现可见身热口渴，腹痛腹胀，下痢脓血，里急后重，或暴泻如水，或腹泻不爽、粪质黄稠秽臭，肛门灼热，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

9、不属于心气虚、心阳虚、心阳暴脱证三者共同症状表现的是

- A、心悸
- B、胸闷
- C、气短
- D、自汗
- E、失眠

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 心气虚证、心阳虚证、心阳暴脱证的共同症状表现为心悸、怔忡、胸闷、气短，活动后加重，自汗。

10、虚里按之其动微弱者见于

- A、宗气内虚
- B、心阳不足
- C、宗气不守
- D、心肺气绝
- E、外感热邪

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 虚里按之其动微弱者为宗气内虚，或饮停心包之支饮。

11、头晕胀痛，头重脚轻，腰酸耳鸣，脉弦细者多为

- A、痰湿内阻
- B、气血亏虚
- C、胆郁痰扰

- D、肝火上炎
- E、肝阳上亢

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 头晕胀痛，头重脚轻，腰酸耳鸣，脉弦细者多为肝阳上亢。

## 12、小儿指纹紫红者，多属

- A、疼痛
- B、惊风
- C、脾虚
- D、里热证
- E、外感表证

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 小儿指纹病理变化的临床表现及其意义：

- (1) 指纹鲜红者，多属外感表证。
- (2) 指纹紫红者，多属里热证。
- (3) 指纹色青者，主疼痛、惊风。
- (4) 指纹紫黑者，为血络郁闭，病属重危。
- (5) 指纹色淡者，多属脾虚、气血不足等虚证。
- (6) 指纹深浓而暗滞者，多属实证，是邪气亢盛。
- (7) 指纹浅淡而枯槁不泽者，多属虚证，是正气虚衰。

## 13、下列各项中，不属于失眠表现的是

- A、彻夜不眠
- B、经常不易入睡
- C、睡而易醒，不能再睡
- D、睡而不酣，时易惊醒
- E、经常不自主地入睡

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 失眠指患者经常不易入睡，或睡而易醒不能再睡，或睡而不酣时易惊醒，甚至彻夜不眠的症状，又称不寐或不得眠。

## 14、多因上焦热盛或病危虚阳上越所致的异常汗出是

- A、头汗

- B、冷汗
- C、热汗
- D、半身汗
- E、手足心汗

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 头汗指患者仅见于头部，或头颈部出汗较多的症状，又称为“但头汗出”。多因上焦热盛，或中焦湿热蕴结，或病危虚阳上越所致。

### 15、下列不属于正常舌象表现的是

- A、舌质淡红
- B、舌体柔软
- C、舌苔薄白
- D、舌体滋润
- E、舌质淡嫩少苔

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 正常舌象舌色淡红鲜明，舌质滋润，舌体柔软灵活；舌苔均匀薄白而润。简称“淡红舌，薄白苔”。选项 E 是属于由于年龄因素影响的儿童的生理变异表现。

### 16、属于正常人从出生至死一生基本不变的面色是

- A、主色
- B、客色
- C、善色
- D、恶色
- E、病色

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 主色是指人生来就有的基本面色，一生基本不变。

### 17、不属于太阳中风证临床表现的是

- A、发热
- B、汗出
- C、恶风
- D、鼻鸣

E、脉浮紧

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 太阳中风证临床表现: 发热, 恶风, 汗出, 脉浮缓, 或见鼻鸣, 干呕。

辨证要点: 本证以恶风、汗出、脉浮缓为主要表现。选项 E 中脉浮紧是太阳伤寒证的表现。

**18、症见心悸气短, 神疲自汗, 面色淡白, 舌淡脉虚, 此属于**

A、心血虚证

B、心气虚证

C、心阴虚证

D、心阳虚证

E、心脾气血虚证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 心气虚证临床表现: 心悸, 胸闷, 气短, 精神疲倦, 或有自汗, 活动后诸症加重, 面色淡白, 舌质淡, 脉虚。本证以心悸、神疲与气虚症状共见为辨证的主要依据。故此题最佳的选项是 B。

**19、症见胁肋胀痛, 口苦, 阴部瘙痒, 带下色黄臭秽, 脉弦数, 此属于**

A、肝郁气滞证

B、肝胆湿热证

C、胆郁痰扰证

D、肝火炽盛证

E、湿热蕴脾证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 肝胆湿热证病位主要在肝胆(疏泄功能失职), 故以胁肋胀痛、肋下痞块、黄疸、口苦等肝胆疏泄失常症状为主, 尚可出现寒热往来及阴部瘙痒, 妇女带下黄臭等症。因此, 根据题干要求, 此题最佳选项为 B。

**20、悬饮主要表现是饮停于**

A、胃肠

B、胸胁

C、心肺

D、四肢

E、头面



**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 饮邪停于胸胁，阻碍气机，压迫肺脏，则有肋间饱满，咳唾引痛，胸闷息促等症，为悬饮。故此题的正确选项是 B。

**21、不属于湿淫证临床表现的是**

- A、头重如裹
- B、口腻不渴
- C、胸脘痞闷
- D、气短神疲
- E、纳呆恶心

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 湿淫证临床表现为头昏沉如裹，嗜睡，身体困重，胸闷脘痞，口腻不渴，纳呆，恶心，肢体关节、肌肉酸痛，大便稀，小便浑浊。或为局部渗漏湿液，或皮肤出现湿疹、瘙痒，妇女可见带下量多。面色晦垢，舌苔滑腻，脉濡缓或细等。选项 D 气短神疲是暑淫证的表现。

**22、下列属于风寒表证特征的是**

- A、恶寒重发热轻
- B、恶寒轻发热重
- C、发热重而恶风自汗
- D、恶寒重而发热自汗
- E、发热轻而恶风自汗

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症，可分为以下三种类型：

- (1) 恶寒重发热轻是风寒表证的特征。
- (2) 发热重恶寒轻是风热表证的特征。
- (3) 发热轻而恶风自汗是伤风表证的特征。

**23、不属于气分证临床表现的是**

- A、舌红苔黄
- B、脉数有力
- C、身热夜甚
- D、大便秘结

E、发热不恶寒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 气分证以发热不恶寒、舌红苔黄、脉数有力为辨证要点。由于邪热侵犯部位不同而有不同表现。邪热壅肺证为邪热壅肺，肺失清肃，肺气上逆，以咳嗽，胸痛，痰稠色黄为主要临床表现。热扰胸膈证为热扰胸膈，郁而不宣，心神不宁，以心烦懊（忪农），坐卧不安为主要临床表现。热结肠道证为热结肠道，腑气不通，里热盛实，以日晡潮热，腹满胀痛拒按，便秘，小便不畅，尿色红赤为主要临床表现。选项 C 可见于营分证的表现。

**24、疼痛不剧，尚可忍耐，绵绵不休，此属于**

- A、酸痛
- B、隐痛
- C、空痛
- D、窜痛
- E、胀痛

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 隐痛指疼痛轻微，尚可忍耐，但绵绵不休的症状。是虚证疼痛的特点。多因阳气精血亏虚，脏腑经脉失养所致。常见于头、腕腹、肋肋、腰背等部位。

**25、人中满唇反见于**

- A、脾胃积热
- B、虚火上炎
- C、心脾积热
- D、燥热伤津
- E、脾阳已绝

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 人中满唇反为脾阳已绝。

**26、按寸口脉分候脏腑，右关脉可候**

- A、心肺
- B、心肾
- C、肝胆
- D、肺肾



E、脾胃

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部疾病。

27、舌淡白湿润，舌体胖嫩者，常提示的是

- A、脾胃湿热
- B、气分有湿
- C、阴虚夹湿
- D、瘀血内阻
- E、阳虚水湿内停

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 淡白舌主气血两虚、阳虚。胖大舌多主水湿内停、痰湿热毒上泛。若淡白湿润，舌体胖嫩，多属阳虚水湿内停。

28、外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是

- A、自汗
- B、盗汗
- C、冷汗
- D、热汗
- E、战汗

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 战汗指病人先恶寒战栗而后汗出的症状。因邪盛正馁，邪伏不去，一旦正气来复，正邪剧争所致。常见于温病或伤寒邪正剧烈斗争的阶段，是病变发展的转折点。若汗出热退，脉静身凉，提示邪去正复，疾病向愈；若汗出而身热不退，烦躁不安，脉来急疾，提示邪盛正衰，病情恶化。

29、以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现，其辨证为

- A、血虚证
- B、血寒证
- C、血热证
- D、血瘀证
- E、血脱证

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 血瘀证以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现。



30、三阳热极，阴液枯竭之候，多为临死前的脉象表现为

- A、鱼翔脉
- B、雀啄脉
- C、屋漏脉
- D、虾游脉
- E、釜沸脉

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 釜沸脉为三阳热极，阴液枯竭之候，多为临死前的脉象。

31、病机属假神的是

- A、机体阴阳严重失调
- B、气血不足，精神亏损
- C、阴盛于内，格阳于外
- D、精气衰竭，虚阳外越
- E、脏腑虚衰，功能低下

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 假神是重危病人出现的精神暂时好转的虚假表现，临终前的预兆，古人比作回光返照或残灯复明。其病机是脏腑精气极度衰竭，正气将脱，阴不敛阳，虚阳外越，阴阳即将离绝。



32、病人口淡乏味，甚至无味的症状多见于

- A、湿热蕴脾
- B、痰热内盛
- C、食滞胃脘
- D、脾胃气虚
- E、肝胃郁热

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 口淡是指患者味觉减退，口中乏味，甚至无味的症状。多见于脾胃气虚。



33、视物旋转动荡，如在舟车之上的症状称为

- A、雀目
- B、目昏
- C、内障
- D、目痒
- E、目眩

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 目眩是指患者自觉视物旋转动荡，如在舟车之上，或眼前如有蚊蝇飞动的症状。因肝阳上亢、肝火上炎、肝阳化风及痰湿上蒙清窍所致者，多属实证或本虚标实证；因气虚、血亏、阴精不足所致者，多属虚证。

34、临床表现主要为胃脘嘈杂，饥不欲食、干呕呃逆，口燥咽干，舌红少苔，脉细数的证候为

- A、胃阴虚
- B、胃阳虚
- C、食滞胃脘
- D、肝胃不和
- E、肝脾不调

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 胃阴虚证临床表现：胃脘嘈杂，饥不欲食，或痞胀不舒，隐隐灼痛，干呕，呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔乏津，脉细数。

35、临床表现为喜笑不休，心神不安，精神涣散，思想不集中，甚则语无伦次，举止失常的是

- A、喜证
- B、怒证
- C、惊证
- D、悲恐证
- E、忧思证

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】喜证的临床表现为喜笑不休，心神不安，精神涣散，思想不集中，甚则语无伦次，举止失常，肢体疲软，脉缓。

36、下列各项中，不属于气滞血瘀证临床表现的是

- A、情志抑郁
- B、胸胁胀满疼痛
- C、痞块刺痛拒按
- D、舌紫暗，脉弦涩
- E、神疲乏力，少气懒言

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】气滞血瘀证临床表现：胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁或易怒，兼见痞块刺痛、拒按，妇女痛经，经血紫黯有块，或闭经，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉弦涩。选项 E 为气血两虚证的表现。

37、舌面的脏腑分部中属上脘的是

- A、舌根
- B、舌苔
- C、舌尖
- D、舌中
- E、舌两侧

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。

38、患者口唇赤肿而干，提示

- A、血虚
- B、热盛
- C、热极
- D、血瘀
- E、寒盛

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】血虚：唇色淡白；热盛：唇色深红；热极：口唇赤肿而干；血瘀：口唇青紫；寒盛：口唇青黑。

### 39、固经丸的功效为

- A、固肾止带，清热祛湿
- B、固冲摄血，益气健脾
- C、滋阴清热，固经止血
- D、调补心肾，涩精止遗
- E、温肾暖脾，固肠止泻

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 固经丸功用：滋阴清热，固经止血。主治阴虚血热之崩漏。

### 40、半夏泻心汤的功用为

- A、补脾柔肝，祛湿止泻
- B、疏肝解郁，养血健脾
- C、寒热平调，消痞散结
- D、透邪解郁，疏肝理脾
- E、清胆利湿，和胃化痰

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 半夏泻心汤功用：寒热平调，消痞散结。

### 41、四逆汤的组成药物为

- A、当归、桂枝、炙甘草
- B、肉桂、附子、炙甘草
- C、吴茱萸、生姜、炙甘草
- D、干姜、生附子、炙甘草
- E、人参、干姜、炙甘草

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 四逆汤组成：炙甘草、干姜、生附子。

### 42、右归丸功用为

- A、补肾助阳
- B、温补肾阴，填精益髓
- C、温补肾阳，填精益髓

- D、温补肾阳，滋补肝肾
- E、补肾助阳，开窍化痰

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 右归丸功用为温补肾阳，填精益髓。

#### 43、苏合香丸的功效为

- A、清热开窍，息风止痉
- B、化浊开窍，清热解毒
- C、芳香开窍，行气止痛
- D、清热解毒，开窍醒神
- E、通阳散结，行气祛痰

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 苏合香丸（吃力伽丸）功用：芳香开窍，行气止痛。

#### 44、治疗咳嗽喘急，咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥哽痛，苔白而干，选方为

- A、温胆汤
- B、二陈汤
- C、贝母瓜蒌散
- D、清气化痰丸
- E、半夏白术天麻汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 贝母瓜蒌散主治：燥痰咳嗽。症见咳嗽喘急，咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥哽痛，苔白而干。

#### 45、苓甘五味姜辛汤和半夏白术天麻汤组成中共有的药物为

- A、茯苓、甘草
- B、干姜、细辛
- C、五味子、橘红
- D、天麻、白术
- E、半夏、细辛

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 苓甘五味姜辛汤组成：茯苓、甘草、干姜、细辛、五味子。

半夏白术天麻汤组成：茯苓、甘草、半夏、天麻、橘红、白术、生姜、大枣。

46、以益气滋阴，固肾止渴为主要功用的方剂是

- A、生脉散
- B、玉液汤
- C、麦门冬汤
- D、百合固金汤
- E、清燥救肺汤

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 玉液汤功用：益气滋阴，固肾止渴。

47、功用为攻下通便，补气养血的方剂是

- A、十枣汤
- B、济川煎
- C、温脾汤
- D、黄龙汤
- E、麻子仁丸

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 黄龙汤功用：攻下通便，补气养血。

48、葛根芩连汤适应的病证是

- A、热毒血痢
- B、暑湿吐泻
- C、脾虚泄泻
- D、湿热血痢
- E、协热下利

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 葛根黄芩黄连汤主治：协热下利。

#### 49、逍遥散所主证候的病机要点是

- A、营血虚滞，肝失疏泄
- B、阴虚肝郁，横犯脾胃
- C、肝血不足，疏泄失常
- D、肝气郁滞，耗伤阴血
- E、肝郁血虚，脾失健运

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 逍遥散主治：肝郁血虚脾弱证。其病机为肝郁血虚，脾失健运。

#### 50、济川煎的组成药物中含有

- A、熟地
- B、牛膝
- C、生地
- D、玄参
- E、麦冬

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 济川煎组成：当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳。

方歌：济川归膝肉苁蓉，泽泻升麻枳壳从，温肾益精润通便，肾虚精亏便秘宜。

#### 51、败毒散的组成中含有的药物是

- A、牛蒡、山栀
- B、防风、白芷
- C、柴胡、前胡
- D、银花、连翘
- E、黄芩、黄连

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 败毒散组成：柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草。

#### 52、身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数，治宜用

- A、银翘散
- B、大青龙汤
- C、九味羌活汤



D、清暑益气汤

E、麻杏石甘汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 清暑益气汤主治：暑热气津两伤证。身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数。

### 53、除哪项外均是黄连解毒汤的组成药物

A、黄芩

B、黄连

C、黄柏

D、黄芪

E、栀子

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 黄连解毒汤组成：黄连、黄芩、黄柏、栀子。

方歌：黄连解毒汤四味，黄芩黄柏栀子备；躁狂大热呕不眠，吐衄发斑均可为。

### 54、骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力者，治宜选用

A、清骨散

B、一贯煎

C、大补阴丸

D、知柏地黄丸

E、六味地黄丸

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 大补阴丸主治：阴虚火旺证。骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力。

### 55、肝阳偏亢，肝风上扰，头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦，治疗应首选

A、大定风珠

B、地黄饮子

C、天麻钩藤饮

D、镇肝息风汤



E、羚角钩藤汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 天麻钩藤饮主治：肝阳偏亢，肝风上扰证。症见头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。

56、治疗心热移于小肠，小便短赤，溲时热涩刺痛者，应选用

- A、败毒散
- B、导赤散
- C、玉女煎
- D、竹叶石膏汤
- E、黄连解毒汤

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 导赤散功用：清心利水养阴。主治：心经火热证。症见心胸烦热，口渴面赤，意欲饮冷，口舌生疮；或心热移于小肠，小便赤涩刺痛，舌红，脉数。

57、以肝胃虚寒，浊阴上逆证为主治证候的方剂是

- A、乌梅丸
- B、小建中汤
- C、小柴胡汤
- D、吴茱萸汤
- E、大建中汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 吴茱萸汤主治肝胃虚寒，浊阴上逆证。食后泛泛欲呕，或呕吐酸水，或干呕，或吐清涎冷沫，胸满脘痛，巅顶头痛，畏寒肢凉，甚则伴手足逆冷，大便泄泻，烦躁不宁，舌淡苔白滑，脉沉弦或迟。

58、下列方剂组成药物中，不含有附子的是

- A、真武汤
- B、温脾汤
- C、阳和汤
- D、实脾散
- E、乌梅丸

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 阳和汤：熟地黄、肉桂、麻黄、鹿角胶、白芥子、炮姜炭、生甘草。

实脾散：厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、大腹子、附子、白茯苓、炮干姜、炙甘草、生姜、大枣。

乌梅丸：乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏、蜜。

真武汤：茯苓、芍药、白术、生姜、附子。

温脾汤：大黄、当归、干姜、附子、人参、芒硝、甘草。

### 59、芍药汤与白头翁汤的组成中，均含有的药物是

- A、黄柏
- B、黄芩
- C、黄连
- D、大黄
- E、秦皮

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 芍药汤：芍药、当归、黄连、槟榔、木香、炙甘草、大黄、黄芩、官桂。

白头翁汤：白头翁、黄柏、黄连、秦皮。两方均含有的药物是黄连。

(1) 黄连、黄芩并用的方剂：半夏泻心汤、普济消毒饮、芍药汤、枳实导滞丸、葛根黄芩黄连汤

(2) 黄连、黄柏并用的方剂：白头翁汤、乌梅丸

(3) 黄柏、黄芩并用的方剂：固经丸

(4) 黄连、黄芩、黄柏并用的方剂：黄连解毒汤、当归六黄汤

### 60、地黄饮子中不含有的药物是

- A、熟地
- B、生地
- C、麦冬
- D、远志
- E、生姜

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 地黄饮子组成：熟干地黄、巴戟天、炒山茱萸、石斛、肉苁蓉、炮附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、菖蒲、远志、生姜、大枣。

方歌：地黄饮子山茱萸，麦味菖蒲远志茯，苁蓉桂附巴戟天，少加姜枣啗瘕服。

### 61、三仁汤除清利湿热外，还具有的功用是

- A、通阳化气

- B、升清降浊
- C、行气和胃
- D、理气和中
- E、宣畅气机

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 三仁汤功用：宣畅气机，清利湿热。

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

## 62、朱砂安神丸中泻火除烦的药物是

- A、黄连
- B、石膏
- C、竹叶
- D、知母
- E、栀子

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 朱砂安神丸中朱砂甘寒质重，专入心经，寒能清热，重可镇怯，既重镇安神，又清心经火，治标之中兼能治本，用为君药。黄连苦寒，入心经，清心泻火，以除烦热为臣药，两药相伍，重镇以安神，清心以除烦，共收泻火安神之功。

 医学教育网

 医学教育网

## 63、温经汤的主治是

- A、气滞血瘀证
- B、营血虚滞证
- C、瘀阻胞宫证
- D、冲任虚寒，瘀血阻滞证
- E、血虚寒凝，瘀血阻滞证

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 温经汤主治：冲任虚寒，瘀血阻滞证。症见漏下不止，或血色暗而有块，淋漓不畅，或月经超前或延后，或逾期不止，或一月再行，或经停不至，而见少腹里急，腹满，傍晚发热，手心烦热，唇口干燥。舌质暗红，脉细而涩。亦治妇人宫冷，久不受孕。

 www.med66.com

 www.med66.com

## 64、玉屏风散的功用为

- A、涩肠止遗
- B、清热养血

- C、固冲摄血
- D、补肾纳气
- E、益气固表止汗

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 玉屏风散功为益气固表止汗，主治表虚自汗。

### 65、健脾丸的组成，不含有的药物是

- A、木香、神曲
- B、人参、白术
- C、陈皮、茯苓
- D、山药、肉豆蔻
- E、黄芩、薏苡仁

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 健脾丸

组成：白术、木香、酒炒黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。

方歌：健脾参苓草陈，肉蔻香连合砂仁，植肉山药曲麦炒，消补兼施不伤正。

### 66、下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

- A、消风散
- B、川芎茶调散
- C、地黄饮子
- D、羚角钩藤汤
- E、大定风珠

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 消风散：当归、生地黄、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草、木通。

方歌：消风散内有荆防，蝉蜕胡麻苦参苍，知膏蒡通归地草，风疹湿疹服之康。

### 67、定喘汤的组成药物中含有

- A、苏叶、半夏、杏仁
- B、苏子、半夏、甘草
- C、苏叶、半夏、生姜



D、苏子、厚朴、杏仁

E、苏子、前胡、半夏

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 定喘汤组成：麻黄、杏仁、桑白皮、黄芩、半夏、紫苏子、款冬花、白果、甘草。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏子黄芩甘草杏，宣肺平喘效力彰。

### 68、白术与苍术并用的方剂是

A、完带汤

B、健脾丸

C、藿香正气散

D、九味羌活汤

E、参苓白术散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 完带汤组成是：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑荆芥、柴胡。

方歌：完带汤中用白术，山药人参白芍辅，苍术车前黑芥穗，陈皮甘草与柴胡。

### 69、属于小建中汤含有的药物是

A、黄柏

B、人参

C、生地

D、熟地

E、芍药

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 小建中汤组成：桂枝、炙甘草、大枣、芍药、生姜、胶饴。

### 70、炙甘草汤中配伍桂枝、生姜的主要用意是

A、温经散寒

B、温经化气

C、温阳通脉

D、通阳化气

E、温阳化气

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 炙甘草汤的配伍意义：方中重用炙甘草，补气健脾，复脉益心；重用生地黄，滋阴养血，充脉养心。二药重用，益气养血以复脉之本，共为君药。配伍人参、大枣，益心气，补脾气，以资气血生化之源；阿胶、麦冬、麻仁滋阴，养心血，充血脉，共为臣药。桂枝、生姜辛行温通，温心阳，通血脉，使气流畅通以助脉气续接，并防诸厚味滋补之品滋腻太过，为佐药。用法中加清酒煎服，因清酒辛热，温通血脉，以行药力，为使药。诸药合用，滋而不腻，温而不燥，使气血充足，阴阳调和，则脉复悸止。

**71、下列具有疏风散邪，清热解毒功用的方剂是**

- A、普济消毒饮
- B、清暑益气汤
- C、青蒿鳖甲汤
- D、龙胆泻肝汤
- E、黄连解毒汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 黄连解毒汤泻火解毒；普济消毒饮清热解毒，疏风散邪；清暑益气汤清暑益气，养阴生津；青蒿鳖甲汤养阴透热；龙胆泻肝汤清泻肝胆实火，清利肝经湿热。

**72、半夏厚朴汤的主治病证是**

- A、暗瘵
- B、脏毒
- C、脏躁
- D、肠风
- E、梅核气

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 半夏厚朴汤主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。

**73、枳实导滞丸的组成药物中不含**

- A、黄连、白术
- B、木香、半夏
- C、大黄、泽泻
- D、枳实、黄芩
- E、神曲、茯苓



【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 枳实导滞丸组成: 大黄、枳实、神曲、茯苓、黄芩、黄连、白术、泽泻。

方歌: 枳实导滞曲连芩, 大黄术泽与茯苓, 食湿两滞生瘀热, 湿热积滞此方寻。

#### 74、咳血方与小蓟饮子中均含有

- A、生地黄
- B、栀子
- C、滑石
- D、青黛
- E、甘草

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 咳血方: 青黛、瓜蒌仁、海粉、栀子、诃子、(蜜、姜汁)。

小蓟饮子: 生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、栀子、甘草。



#### 75、下列组成药物中不含有甘草的方剂是

- A、杏苏散
- B、猪苓汤
- C、八正散
- D、小蓟饮子
- E、蒿芩清胆汤

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 猪苓汤组成药物有: 猪苓、茯苓、泽泻、滑石、阿胶。

方歌: 猪苓汤用猪茯苓, 泽泻滑石阿胶并, 小便不利兼烦渴, 利水养阴热亦平。

#### 76、防风通圣散主治病证的临床表现不包括

- A、头目眩晕
- B、憎寒壮热
- C、气短懒言
- D、大便秘结
- E、目赤睛痛

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 防风通圣散主治：风热壅盛，表里俱实证。憎寒壮热，头目昏眩，目赤睛痛，口苦口干，咽喉不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠黏，大便秘结，小便赤涩，舌苔黄腻，脉数有力。亦用治疮疡肿毒，肠风痔漏，丹斑瘾疹等。

### 77、心前区隆起见于

- A、冠心病
- B、肺心病
- C、先天性心脏病
- D、心包炎
- E、心肌炎

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 心前区隆起见于以下几种情况：①某些先天性心脏病，如法洛四联症、肺动脉瓣狭窄等。②儿童时期患慢性风湿性心脏病伴右心室增大者。

### 78、主要反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验是

- A、酚红排泌试验
- B、血清尿素氮、血清肌酐测定
- C、内生肌酐清除率测定
- D、莫氏试验
- E、对氨马尿酸盐清除率试验

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 莫氏试验可了解肾脏的稀释-浓缩功能，是反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验。

### 79、抽搐伴脑膜刺激征见于

- A、狂犬病
- B、颅内高压
- C、癫痫大发作
- D、高血压脑病
- E、蛛网膜下腔出血

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 抽搐伴脑膜刺激征：见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。



**80、下列哪项不属于脑脊液检查的禁忌证**

- A、颅内压明显增高或伴显著视乳头水肿者
- B、疑有中枢神经系统恶性肿瘤
- C、处于休克、衰竭或濒危状态者
- D、局部皮肤有炎症者
- E、颅后窝有占位性病变者

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 脑脊液检查的禁忌证为:

- (1) 颅内压明显增高或伴显著视乳头水肿者。
- (2) 有脑疝先兆者。
- (3) 处于休克、衰竭或濒危状态者。
- (4) 局部皮肤有炎症者。
- (5) 颅后窝有占位性病变者。



**81、鲜红色的圆形斑疹，直径2~3mm，由病灶周围的血管扩张所形成，压之退色，松开时又复现，多出现于胸腹部的为**

- A、斑疹
- B、玫瑰疹
- C、丘疹
- D、荨麻疹
- E、斑丘疹

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 玫瑰疹是一种鲜红色的圆形斑疹，直径2~3mm，由病灶周围的血管扩张所形成，压之退色，松开时又复现，多出现于胸腹部。对伤寒或副伤寒具有诊断意义。

**82、下列各项，引起抽搐伴瞳孔散大、意识丧失、大小便失禁，见于**

- A、各种脑膜炎
- B、蛛网膜下腔出血
- C、狂犬病
- D、癫痫大发作
- E、破伤风

**【隐藏答案】**

【正确答案】 D

【答案解析】 抽搐伴随症状:

- (1) 伴高热, 见于颅内与全身的感染性疾病、小儿高热惊厥等。注意抽搐本身也可引起高热。
- (2) 伴高血压, 见于高血压脑病、高血压脑出血、妊娠高血压综合征等。
- (3) 伴脑膜刺激征, 见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。
- (4) 伴瞳孔散大、意识丧失、大小便失禁, 见于癫痫大发作。
- (5) 不伴意识丧失, 见于破伤风、狂犬病、低钙抽搐、癔症性抽搐。
- (6) 伴肢体偏瘫者, 见于脑血管疾病及颅内占位性病变。



83、根据甲状腺肿大的临床分度, 超过胸锁乳突肌者为

- A、I 度
- B、II 度
- C、III 度
- D、IV 度
- E、V 度

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 甲状腺肿大分为三度: 不能看出肿大但能触及者为 I 度; 能看见肿大又能触及, 但在胸锁乳突肌以内者为 II 度; 超过胸锁乳突肌者为 III 度。生理性甲状腺肿大见于女性青春期、妊娠或哺乳期; 病理学甲状腺轻度肿大见于单纯性甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺炎及甲状腺肿瘤。

84、下列哪项疾病可将气管推向患侧

- A、肺硬化
- B、胸腔积液
- C、气胸
- D、纵隔肿瘤
- E、单侧甲状腺肿大

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大, 可将气管推向健侧; 肺不张、肺硬化、胸膜粘连等, 可将气管拉向患侧。



85、可引起网织红细胞增多的贫血为

- A、再生障碍性贫血
- B、骨髓病性贫血
- C、急性白血病

- D、缺铁性贫血
- E、脾功能亢进

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 网织红细胞计数反映骨髓造血功能状态: ①增多: 表示骨髓红细胞系增生旺盛。溶血性贫血和急性失血性贫血时明显增多; 缺铁性贫血和巨幼细胞贫血时可轻度增多。②减少: 表示骨髓造血功能减低, 见于再生障碍性贫血、骨髓病性贫血(如急性白血病)。

**86、急性腹膜炎病人为减轻疾病所致的痛苦, 所采取的体位是**

- A、辗转体位
- B、角弓反张位
- C、强迫仰卧位
- D、强迫俯卧位
- E、强迫坐位

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 强迫仰卧位: 患者仰卧, 双腿蜷曲, 借以减轻腹部肌肉紧张。见于急性腹膜炎等。

**87、伤寒可出现的面容为**

- A、急性热病容
- B、慢性病容
- C、无欲貌
- D、水肿面容
- E、面具面容

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 伤寒面容可见表情淡漠, 反应迟钝, 呈无欲状态。见于伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰弱患者。

**88、下列哪项疾病可见脉压减小**

- A、主动脉瓣关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄
- C、动脉导管未闭
- D、动静脉瘘
- E、甲状腺功能亢进症



【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 脉压 $<30\text{mmHg}$  称为脉压减小, 见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。

### 89、意识障碍伴瞳孔缩小可见于

- A、酒精中毒
- B、吗啡类中毒
- C、癫痫
- D、低血糖昏迷
- E、青光眼绝对期

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 意识障碍伴瞳孔散大见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。伴瞳孔缩小见于海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。



### 90、胸痛伴咯血见于

- A、肺炎
- B、肺脓肿
- C、肺梗死
- D、支气管肺癌
- E、以上都是

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 胸痛伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。



### 91、下列哪项疾病可见湿性咳嗽

- A、急性咽喉炎
- B、急性支气管炎初期
- C、慢性咽喉炎
- D、轻症肺结核
- E、胸膜炎

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 干性咳嗽可见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺结核、肺癌等。湿性咳嗽见于慢性咽喉炎、慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等。

## 92、内囊型感觉障碍常见于

- A、心肌梗死
- B、炎症
- C、脑血管疾病
- D、急性脊髓炎
- E、椎间盘突出症

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 感觉障碍内囊型，表现为病灶对侧半身感觉障碍、偏瘫、同向偏盲，常称为三偏征，常见于脑血管疾病。

## 93、腹壁紧张度增加，触诊呈揉面感，多见于

- A、急性腹膜炎
- B、急性胃肠道穿孔
- C、急性胆囊炎
- D、结核性腹膜炎
- E、急性阑尾炎

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 腹膜慢性炎症时，触诊如揉面团一样，称为揉面感，常见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎。

## 94、可出现周围血管征的是

- A、三尖瓣狭窄
- B、二尖瓣狭窄
- C、主动脉瓣关闭不全
- D、脉压差减小
- E、心动过速

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 头部随脉搏呈节律性点头运动、颈动脉搏动明显、毛细血管搏动征、水冲脉、枪击音与杜氏双重杂音统称为周围血管征，它们均由脉压增大所致，常见于主动脉瓣关闭不全、发热、贫血及甲亢等。

95、渗出液为炎性积液，形成的主要原因有

- A、糖尿病
- B、高血压
- C、肝硬化
- D、恶性肿瘤
- E、营养不良

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 渗出液为炎性积液。形成的主要原因有：①感染性：如胸膜炎、腹膜炎、心包炎等。②化学因素：如血液、胆汁、胃液、胰液等化学性刺激。③恶性肿瘤。④风湿性疾病及外伤等。

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

96、下列最不符合Ⅲ度房室传导阻滞的是

- A、QRS 波群形态正常
- B、QRS 波群宽大畸形
- C、P 与 QRS 无固定关系
- D、心房率快于心室率
- E、心房率慢于心室率

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 三度房室传导阻滞（完全性房室传导阻滞）①P 波和 QRS 波群无固定关系，P-P 与 R-R 间距各有其固定的规律性。②心房率>心室率。③QRS 波群形态正常或宽大畸形。

97、判断成年女性贫血的血红蛋白含量应低于

- A、100g/L
- B、90g/L
- C、120g/L
- D、110g/L
- E、105g/L

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 红细胞及血红蛋白减少：单位容积循环血液中血红蛋白量、红细胞数低于参考值下限称为贫血。以血红蛋白为标准，成年男性 Hb<120g/L，成年女性 Hb<110g/L，即为贫血。

98、下列哪项是急性心肌梗死最早期的心电图特征

- A、ST段弓背向上抬高
- B、频发室性早搏
- C、病理性Q波
- D、T波压低
- E、T波高耸

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 急性心梗超早期的心电图表现为T波高耸。

### 99、心包摩擦音通常听诊最清楚的是下列哪个部位

- A、心尖部
- B、心底部
- C、左侧腋前线3、4肋间
- D、胸骨右缘第3、4肋间
- E、胸骨左缘第3、4肋间

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 心包摩擦音多在胸骨左缘第3、4肋间听及，多呈收缩期和舒张期双相的粗糙摩擦感，以收缩期、前倾位或呼气末更为明显。是有急性心包膜纤维素渗出致表面粗糙，心脏收缩时脏层与壁层心包摩擦产生的振动传至胸壁所致。

### 100、突发的心绞痛，胸痛部位通常位于

- A、心尖部
- B、上腹部
- C、左肩背部
- D、左或右胸
- E、胸骨体后方

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 心绞痛胸痛部位通常位于胸骨体后方。

### 101、巨大脾多见于

- A、慢性淋巴细胞白血病
- B、慢性粒细胞性白血病
- C、急性淋巴细胞白血病



- D、急性粒细胞性白血病
- E、肝硬化脾功能亢进

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 脾大一般分为三度，巨大脾属于高度脾大，其表面光滑者见于慢性粒细胞性白血病、慢性疟疾和骨髓纤维化等，表面不平而有结节者见于淋巴瘤等。

### 102、肝癌、结肠癌发生淋巴结转移时常出现在

- A、颈部
- B、腋窝
- C、滑车上
- D、左锁骨上窝
- E、右锁骨上窝

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 左锁骨上窝淋巴结肿大，多为腹腔脏器癌肿（胃癌、肝癌、结肠癌等）转移。

### 103、下列不属于个人健康史的内容是

- A、习惯与嗜好
- B、冶游史
- C、职业和生活条件
- D、生育史
- E、社会经历

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 生育史属于月经生育史。

### 104、关于尿胆红素测定，下列叙述正确的是

- A、肝细胞性黄疸时，尿胆红素可增高
- B、阻塞性黄疸时，尿胆红素阴性
- C、溶血性黄疸时，尿胆红素增高不明显
- D、严重肾损伤时，尿胆红素明显增加
- E、正常可出现阳性反应

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肝细胞黄疸时尿胆红素可增高。

### 105、容易闻及二尖瓣杂音的体位是

- A、立位
- B、平卧位
- C、右侧卧位
- D、左侧卧位
- E、坐位

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 左侧卧位可使二尖瓣杂音的舒张中晚期的杂音更明显；上半身前倾坐位可使主动脉瓣关闭不全的舒张期音更容易听到。

### 106、喷射性呕吐，可见于

- A、肠梗阻
- B、耳源性眩晕
- C、胃炎
- D、颅内高压
- E、尿毒症

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 喷射状呕吐多见于颅内高压。

### 107、医学道德原则不包括的是

- A、行善原则
- B、尊重原则
- C、公正原则
- D、无伤原则
- E、互助原则

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 医学道德原则主要包括了以下四种：行善原则、尊重原则、公正原则、无伤原则。

### 108、患者的义务内容不包括的是

- A、积极配合诊疗的义务
- B、保持和恢复健康的义务
- C、对疾病认知的义务
- D、支持医学科学发展的义务
- E、遵守医院各种规章制度的义务

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 患者的义务内容

- (1) 保持和恢复健康的义务;
- (2) 积极配合诊疗的义务;
- (3) 遵守医院各种规章制度的义务;
- (4) 支持医学科学发展的义务。

### 109、人体实验的类型包括

- A、天然实验、自愿实验、强迫实验、欺骗实验
- B、天然实验、强迫实验、动物实验、志愿实验
- C、药物实验、志愿实验、自然实验、强迫实验
- D、自然实验、自我实验、强迫实验、临床实验
- E、随机实验、天然实验、自我实验、强迫实验

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 人体实验的类型

- (1) 天然实验: 天然实验是不受研究者控制的, 这种实验的开始、发展、结束都是自然演进的结果, 与研究者的意志无关, 所以这种研究是没有道德代价的。
- (2) 自愿实验: 包括自我实验和志愿实验。
- (3) 强迫实验: 通常是在一定的军事、政治或行政组织的强大压力下, 强迫受试者进行人体实验。
- (4) 欺骗实验: 对一些风险较大的人体实验, 实验者对受试者告知的实验信息不准确, 或者采用蒙骗手法的, 即是欺骗性人体实验。

### 110、除哪项外均是医德品质的内容

- A、奉献
- B、精诚
- C、仁爱
- D、严谨
- E、诚挚

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 医德品质的内容:

- (1) 仁爱
- (2) 严谨
- (3) 诚挚
- (4) 公正
- (5) 奉献



### 111、下列中国古代医德思想中不包括

- A、普同一等，一心赴救的服务态度
- B、注重自律，忠于医业的献身精神
- C、仁爱救人，赤诚济世的行医宗旨
- D、不图名利，清廉正直的道德品质
- E、探索研究，大胆创新的敬业精神

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 中国医学道德的优良传统:

- (1) 仁爱救人，赤诚济世的行医宗旨;
- (2) 不图名利，清廉正直的道德品质;
- (3) 普同一等，一心赴救的服务态度;
- (4) 尊重同道，谦和不矜的医疗作风;
- (5) 注重自律，忠于医业的献身精神。

### 112、符合医学伦理学研究的是

- A、研究道德的形成、本质及其发展规律的科学
- B、道德科学或道德哲学
- C、研究人与人之间关系的科学
- D、研究人与社会之间关系的科学
- E、研究医学活动中的道德关系和道德现象的科学

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 医学伦理学的研究对象是医学领域中的医学道德现象和医学道德关系。

### 113、医患沟通的意义中不包括


- A、是医学人文精神的需要
- B、是医学诊断的需要

- C、是医学目的的需要
- D、是提高医生技术水平的需要
- E、是临床治疗的需要

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 医患沟通的意义：是医学目的的需要，是医学诊断的需要，是临床治疗的需要，是医学人文精神的需要，是减少纠纷的需要。



#### 114、符合药物治疗的道德要求是

- A、合理配伍，细致观察
- B、尽量周全，知情同意
- C、灵活用药，免担风险
- D、少用药物，节约费用
- E、联合用药，观察疗效

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 药物治疗中的道德要求：

- (1) 对症下药，剂量安全；
- (2) 合理配伍，细致观察；
- (3) 节约费用，公正分配。



## 二、B

1、A.心气虚

B.脾肺气虚

C.心肺气虚

D.肾气不固

E.肺肾气虚

<115>、胸闷气喘，少气不足以息者多为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 胸闷气喘，少气不足以息者，多为肺气虚或肺肾气虚。

<116>、久病咳喘，胸闷心悸，神疲乏力，自汗声低，舌淡脉弱，其证候是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 心肺气虚证临床表现：胸闷，咳嗽，气短而喘，心悸，动则尤甚，吐痰清稀，神疲乏力，声低懒言，自汗，面色淡白，舌淡苔白，或唇舌淡紫，脉弱或结或代。

2、A. 芤脉

B. 革脉

C. 散脉

D. 牢脉

E. 结脉

<117>、浮取散漫，中候似无，沉取不应，伴节律不齐的脉象是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 散脉：浮取散漫，中候似无，沉取不应，伴节律不齐或脉力不匀。

<118>、脉象表现为浮大中空，如按葱管的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 芤脉：浮大中空，如按葱管。

3、A. 红舌

B. 绛舌

C. 淡红舌

D. 淡白舌

E. 青紫舌

<119>、主气血两虚、阳虚的舌质表现是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 淡白舌主气血两虚、阳虚。

<120>、主里热亢盛、阴虚火旺及瘀血的舌质表现是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 绛舌主里热亢盛、阴虚火旺、瘀血。



4、A.少阴经头痛

B.少阳经头痛

C.太阳经头痛

D.厥阴经头痛

E.太阴经头痛

<121>、全头重痛多为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 根据头痛部位不同，可辨识病在何经

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。
- (6) 全头重痛：多为太阴经头痛。

<122>、后头部连项痛多为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。
- (6) 全头重痛：多为太阴经头痛。

5、A.气分热盛

B.阴虚火旺

C.心火亢盛

D.肝胆火盛

E.胃肠热盛

<123>、舌红而起芒刺多为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 点、刺舌提示脏腑热极，或血分热盛。点、刺是由蕈状乳头增生，数目增多，充血肿大而形成。一般点、刺越多，邪热越盛。舌红而起芒刺多为气分热盛。

<124>、舌红而点刺色鲜红多为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 舌红而点刺色鲜红：多为血热内盛，或阴虚火旺。

 www.med66.com

 www.med66.com

6、A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

<125>、目的脏腑分属中，黑珠属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 黑珠属肝，称为“风轮”。

<126>、目的脏腑分属中，瞳仁属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 瞳仁属肾，称为“水轮”。

7、A.清燥救肺汤

B.桑杏汤

C.麦门冬汤

D.百合固金汤

E.杏苏散

<127>、含有半夏、人参的方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 麦门冬汤：麦冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣。

<128>、含有生地、熟地的方剂是



A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 百合固金汤组成：熟地、生地、当归身、白芍、甘草、桔梗、玄参、贝母、麦冬、百合。生地、熟地并用的方剂：百合固金汤、当归六黄汤、大秦艽汤。

8、A.杏仁

B.细辛

C.熟地黄

D.石膏

E.黄连

<129>、小青龙汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。

<130>、九味羌活汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 九味羌活汤：羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草。

9、A.天麻钩藤饮

B.消风散

C.半夏白术天麻汤

D.二陈汤

E.川芎茶调散

<131>、外感风邪头痛，治宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 川芎茶调散主治：外感风邪头痛。偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

<132>、风痰上扰头痛、眩晕，治宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 半夏白术天麻汤主治: 风痰上扰证。眩晕, 头痛, 胸膈痞闷, 恶心呕吐, 舌苔白腻, 脉弦滑。

10、A.煨姜

B.干姜

C.炮干姜

D.生姜皮

E.生姜

<133>、生化汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 生化汤的组成药物有: 全当归、川芎、桃仁、炮干姜、炙甘草、黄酒、童便。

方歌: 生化汤是产后方, 归芎桃草酒炮姜, 恶露不行少腹痛, 温养活血最见长。

<134>、温经汤的组成药物中含有

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 温经汤的组成药物有: 吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。

方歌: 温经汤用萸桂芎, 归芍丹皮姜夏冬, 参草益脾胶养血, 调经重在暖胞宫。

11、A.疏散风热, 透邪解郁

B.透邪解郁, 疏肝理脾

C.清利咽喉, 养血健脾

D.透邪解郁, 清利头目

E.疏肝解郁, 养血健脾

<135>、四逆散的功用为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 四逆散的功用为透邪解郁, 疏肝理脾。

<136>、逍遥散的功用为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 逍遥散的功用为疏肝解郁，养血健脾。

12、A.香苏散

B.桂枝汤

C.加減葳蕤汤

D.柴葛解肌汤

E.大承气汤

<137>、以峻下热结为主要功用的方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 大承气汤功用：峻下热结。

<138>、以解肌清热为主要功用的方剂是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 柴葛解肌汤功用：解肌清热。

13、A.蛙腹

B.球状腹

C.舟状腹

D.尖腹

E.气腹

<139>、肝硬化腹水的腹部外形常呈

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 全腹膨隆见于各种原因的肠梗阻或肠麻痹、气腹、腹腔巨大肿块（如巨大卵巢囊肿等）以及肝硬化门脉高压症、右心衰竭、缩窄性心包炎、肾病综合征、结核性腹膜炎、腹膜转移癌等引起的腹腔积液（腹腔大量积液时，仰卧位腹部外形宽而扁，呈蛙腹状）。

<140>、恶病质的腹部外形常呈

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 全腹凹陷见于严重脱水、明显消瘦及恶病质等，严重者呈舟状腹。

- 14、A.穿孔
- B.急性肠炎
- C.十二指肠溃疡
- D.急性胰腺炎
- E.输尿管结石

<141>、暴饮暴食后上腹疼痛，向左腰背放散，多见于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍，多有慢性胃炎病史，容易诊断。输尿管结石出现下腹痛，剧烈，容易诊断。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛，向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

<142>、腹痛，伴有腹泻，多见于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍，多有慢性胃炎病史，容易诊断。输尿管结石出现下腹痛，剧烈，容易诊断。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛，向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

- 15、A.钝痛
- B.绞痛
- C.胀痛
- D.烧灼痛
- E.针刺痛

<143>、胆石症所见疼痛是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。

<144>、泌尿系结石所见疼痛是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。



16、A. 呕吐物呈咖啡色

B. 呕吐物含胆汁者较多

C. 呕吐物有粪臭

D. 呕吐隔日食物

E. 呕吐物中有蛔虫

<145>、空肠梗阻的临床表现是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 呕吐物的性质：呕吐物呈咖啡色，见于上消化道出血。呕吐隔餐或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。呕吐物含胆汁者多见于十二指肠乳头以下的十二指肠或空肠梗阻。呕吐物有粪臭者提示低位肠梗阻。呕吐物中有蛔虫者见于胆道蛔虫、肠道蛔虫。

<146>、低位肠梗阻的临床表现是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 呕吐物的性质：呕吐物呈咖啡色，见于上消化道出血。呕吐隔餐或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。呕吐物含胆汁者多见于十二指肠乳头以下的十二指肠或空肠梗阻。呕吐物有粪臭者提示低位肠梗阻。呕吐物中有蛔虫者见于胆道蛔虫、肠道蛔虫。



17、A. 直立时两踝并拢而两膝分离

B. 两膝并拢而两踝分离

C. 踝关节呈固定型内收位

D. 踝关节呈固定型外展位

E. 膝部肿大而股胫消瘦

<147>、膝外翻见

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 两膝并拢而两踝分离，称为膝外翻（又称“X”形腿）。

<148>、膝内翻见

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 直立时两踝并拢而两膝分离，称为膝内翻（又称“O”形腿）。

18、A.生物医学模式

B.生物-心理-社会医学模式

C.神灵主义医学模式

D.自然哲学医学模式

E.机械论医学模式

<149>、疾病是机器某部分零件失灵,用机械观解释一切人体现象属于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 机械论医学模式:这种医学模式是在西方经验哲学和现代物理学的影响下发展起来的,16~17世纪,欧洲文艺复兴运动带来了工业革命,推动了科学进步,也影响了医学观。当时把人比作机器,疾病是机器某部分零件失灵,用机械观解释一切人体现象。这种医学模式忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性,具有机械性和片面性的缺点。

<150>、认为人的心理与生理、精神与躯体、机体内外环境是一个完整的统一体属于

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 认为人的心理与生理、精神与躯体、机体内外环境是一个完整的统一体属于生物-心理-社会医学模式。

## 中医执业医师第三单元



### 一、A1

1、噎膈的病理因素主要是

A、气、痰、瘀

B、风、火、痰

C、气、湿、痰

D、痰、湿、瘀

E、气、火、瘀

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 噎膈病理因素主要为气、痰、瘀。

【您的答案】 A

【答案正确,得分: 1】

## 2、下列关于呕吐的预防调护, 错误的是

- A、胃中有热者, 禁服温燥药物
- B、服药前, 药汁中可加入少量蒜汁
- C、服药应少量频服为佳
- D、起居有节, 生活有常
- E、选择刺激性、气味小的药物

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 呕吐的预防调护:

起居有常, 生活有节, 避免风寒暑湿秽浊之邪的入侵。保持心情舒畅, 避免精神刺激, 对肝气犯胃者, 尤当注意。饮食方面也应注意调理。脾胃素虚患者, 饮食不宜过多, 同时勿食生冷瓜果等, 禁服寒凉药物。若胃中有热者, 忌食肥甘厚腻、辛辣香燥、醇酒等食品, 禁服温燥药物, 戒烟。对呕吐不止的病人, 应卧床休息, 密切观察病情变化。尽量选择刺激性、气味小的药物, 否则随服随吐, 更伤胃气。服药方法, 应少量频服为佳, 以减少胃的负担。

## 3、不属关格主要病理因素的是

- A、瘀血
- B、内风
- C、湿浊
- D、水气
- E、外风

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 关格病理因素主要为湿浊、水气、瘀血、内风。

## 4、治疗真心痛寒凝心脉证, 首选的方剂是

- A、当归四逆汤
- B、天王补心丹
- C、补阳还五汤
- D、栝楼薤白白酒汤
- E、栝楼薤白半夏汤

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 真心痛之寒凝心脉

证候主症: 胸痛彻背, 胸闷气短, 心悸不宁, 神疲乏力, 形寒肢冷, 舌质淡黯, 舌苔白腻, 脉沉无力, 迟缓或结代。

证机概要: 阴寒凝滞, 心阳痹阻, 心脉闭塞。

治法: 温补心阳, 散寒通脉。

代表方: 当归四逆汤加味。

## 5、大肠癌之瘀毒内阻证的主治方剂

- A、膈下逐瘀汤
- B、失笑散
- C、少腹逐瘀汤
- D、复元活血汤
- E、血府逐瘀汤

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 大肠癌, 瘀毒内阻证

证候主症: 腹部拒按, 或腹内结块, 里急后重, 大便脓血, 色紫暗, 量多, 烦热口渴, 面色晦暗, 或有肌肤甲错, 舌质紫暗或有瘀点、瘀斑, 脉涩。

证机概要: 瘀血内结, 瘀滞化热, 热毒内生。

治法: 活血化瘀, 清热解毒。

代表方: 膈下逐瘀汤加减。

## 6、下列关于呃逆的各项叙述中, 错误的是

- A、主症能自我控制
- B、多有受凉、饮食不当之诱因
- C、病机是胃气上逆冲膈
- D、主症为喉间呃呃连声
- E、常伴有胸膈痞闷、脘中不适、情绪不安等症状

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呃逆是指胃气上逆动膈, 以气逆上冲, 喉间呃呃连声, 声短而频, 难以自制为主要表现的病证。

## 7、关于胃痛特点, 错误的是

- A、以老年人居多
- B、其疼痛有胀痛、刺痛、隐痛、剧痛等不同的性质
- C、以上腹胃脘部近心窝处疼痛为主症
- D、常伴食欲不振、恶心呕吐、嘈杂泛酸、嗝气吞腐等上消化道症状
- E、多有反复发作病史

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 胃痛特点:

1. 上腹近心窝处胃脘部发生疼痛为特征, 其疼痛有胀痛、刺痛、隐痛、剧痛等不同的性质。
2. 常伴食欲不振, 恶心呕吐, 嘈杂泛酸, 暖气吞腐等上消化道症状。
3. 发病特点: 以中青年居多, 多有反复发作病史。发病前多有明显的诱因, 如天气变化、恼怒、劳累、暴饮暴食、饥饿、进食生冷干硬辛辣醇酒, 或服用有损脾胃的药物等。



## 8、血厥实证的主治方剂是

- A、生化汤
- B、失笑散
- C、补阳还五汤
- D、羚角钩藤汤
- E、复元活血汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 血厥, 实证

证候主症: 多因急躁恼怒而发, 突然昏倒, 不知人事, 牙关紧闭, 面赤唇紫, 舌黯红, 脉弦有力。

证机概要: 怒而气上, 血随气升, 菀阻清窍。

治法: 平肝潜阳, 理气通瘀。

代表方: 羚角钩藤汤或通瘀煎加减



## 9、鼓胀的主要病位在

- A、肝脾
- B、大小肠
- C、心肝
- D、心肺
- E、肝肾

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 鼓胀, 其病位主要在于肝脾, 久则及肾。



## 10、痴呆的基本病机为

- A、以虚为本, 虚实夹杂
- B、气滞血瘀, 痰浊内阻
- C、阴精不足, 气血亏虚

- D、髓海不足，神机失用
- E、脏腑亏虚，痰瘀内阻

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 痴呆的基本病机为髓海不足，神机失用。

### 11、肺痿的治疗原则

- A、补肺生津
- B、培土生金
- C、降气化痰
- D、生津止渴
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肺痿的基本病机为肺虚，津气大伤，失于濡养，以致肺叶枯萎。肺痿治疗总以补肺生津为原则。

### 12、下列哪项不是眩晕肝阳上亢证的主症

- A、口苦
- B、乏力
- C、头痛
- D、面赤
- E、烦躁

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 眩晕肝阳上亢证。主症：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳、郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。

### 13、黄疸胆腑郁热证的主治方剂是

- A、升麻葛根汤
- B、龙胆泻肝汤
- C、小柴胡汤
- D、大柴胡汤
- E、葛根芩连汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 黄疸之胆腑郁热证。治法：疏肝泄热，利胆退黄。代表方：大柴胡汤加减。

#### 14、泄泻的病位主要在

- A、肝
- B、胆
- C、脾
- D、胃
- E、肠

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻的病位主要在肠，脾失健运是关键，同时与肝、肾密切相关。

#### 15、泄泻之肾阳虚衰证，应首选的方剂是

- A、四神丸
- B、参苓白术散
- C、柴胡疏肝散
- D、痛泻要方
- E、五磨饮子

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 泄泻之肾阳虚衰证

证候主症：黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，完谷不化，腹部喜暖，泻后则安，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。

治法：温肾健脾，固涩止泻。

代表方：四神丸加减。

#### 16、下列各项，不属痫病病因的是

- A、饮食失调
- B、脑部外伤
- C、先天遗传
- D、七情失调
- E、劳欲过度

【隐藏答案】



【正确答案】 E

【答案解析】 痫病的病因：先天遗传、七情失调、惊恐、饮食失调、脑部外伤、六淫所干、它病之后。

### 17、消渴病合理的饮食是

- A、高脂饮食
- B、绝对无糖饮食
- C、少食多餐
- D、定时定量进餐
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 消渴的生活调摄十分重要，尤其是节制饮食，具有基础治疗的重要作用。在保证机体合理需要的情况下，应限制粮食、油脂的摄入，忌食糖类，饮食宜以适量米、麦、杂粮，配以蔬菜、豆类、瘦肉、鸡蛋等，定时定量进餐。

### 18、痫病病位在脑，涉及的脏腑为

- A、肝、脾、心、肾
- B、肝、心、脾、肺
- C、肝、脾、肺、肾
- D、肺、脾、心、肾
- E、肝、肺、心、肾

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痫病的病位在脑，涉及肝、脾、心、肾诸脏。

### 19、治疗泄泻肝气乘脾证，应首选的方剂是

- A、四七汤
- B、参苓白术散
- C、柴胡疏肝散
- D、痛泻要方
- E、五磨饮子

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 泄泻之肝气乘脾证

证候主症：腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，每因抑郁恼怒，或情绪紧张之时而作，素有胸胁

胀闷, 暖气食少, 舌淡红, 脉弦。

治法: 抑肝扶脾。

代表方: 痛泻要方加减。

## 20、消渴的治疗原则是

- A、清热润燥, 养阴生津
- B、滋阴益气, 活血化瘀
- C、健脾补肾
- D、滋阴温阳
- E、滋阴清热, 益气健脾

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 消渴的基本病机是阴虚为本, 燥热为标, 故清热润燥、养阴生津为本病的治疗大法。

## 21、痴呆的病位在

- A、肝
- B、脾
- C、心
- D、肾
- E、脑

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 痴呆病位在脑, 与心、肾、肝、脾均有关系。

## 22、治疗内伤发热血虚发热证, 首选的方剂是

- A、补中益气汤
- B、青蒿鳖甲汤
- C、清营汤
- D、清骨散
- E、归脾汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 内伤发热之血虚发热证

证候主症: 发热, 热势多为低热, 头晕眼花, 身倦乏力, 心悸不宁, 面白少华, 唇甲色淡, 舌质淡, 脉细弱。

治法: 益气养血。

代表方: 归脾汤加减。

### 23、下列各项, 不属于便秘病因的是

- A、年老体虚
- B、感受外邪
- C、饮食不节
- D、情志失调
- E、外伤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 便秘病因: 饮食不节、情志失调、年老体虚、感受外邪。

### 24、下列关于癫狂病机的叙述中, 正确的是

- A、癫证日久, 郁火宣泄而痰气留结, 又可转化狂证
- B、脏气不平, 阴阳失调, 脑之神机逆乱是病机的关键
- C、癫为痰火上扰, 神明失主
- D、狂为痰气郁结, 蒙蔽神机
- E、狂证痰气郁而化火, 可转化为癫证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 脏气不平, 阴阳失调, 脑之神机逆乱是癫狂病机的关键所在。

### 25、痞满的病机关键是

- A、胃失和降, 膈间气机不利
- B、脾胃肝肾功能失调, 津枯血燥, 气痰瘀互结
- C、胃气阻滞, 胃失和降, 不通则痛
- D、胃失和降, 胃气上逆
- E、中焦气机不利, 脾胃升降失职

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 中焦气机不利, 脾胃升降失职为痞满发生的病机关键。

### 26、治疗呕吐肝气犯胃证, 首选的方剂是

- A、理中汤
- B、黄芪建中汤
- C、香砂六君子汤
- D、参苓白术散
- E、四七汤

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 呕吐之肝气犯胃证

证候主症：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃降逆。

代表方：四七汤加减。

27、下列各项，不属腹痛常见病因的是

- A、素体阳虚
- B、胃气上逆
- C、外感时邪
- D、饮食不节
- E、情志失调

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 腹痛病因：

外感时邪、饮食不节、情志失调及素体阳虚等可导致本病。此外，跌仆损伤，络脉瘀阻，或腹部术后也可致腹痛。

28、下列各项中，不属内伤发热病因的是

- A、情志失调
- B、外伤出血
- C、感受外邪
- D、久病体虚
- E、饮食劳倦

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 内伤发热的病因：久病体虚、饮食劳倦、情志失调及外伤出血。

29、下列关于关格的各项叙述中，错误的是

- A、多见于水肿、淋证、癃闭等病证的晚期
- B、关格较重者，给高热量、高蛋白饮食
- C、临床特征是小便不通与呕吐并见
- D、基本病机是脾肾衰惫，气化不利，湿浊毒邪内蕴三焦
- E、病理性质为本虚标实

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 关格较重者，应绝对卧床休息，给高热量、低蛋白、富有维生素的饮食。

### 30、真心痛其本在

- A、肺
- B、肝
- C、肾
- D、心
- E、脾

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 本病其位在心，其本在肾，总的病机为本虚标实，而在急性期则以标实为主。

### 31、肝癌之湿热聚毒证的主治方剂为

- A、八正散
- B、藿香正气散
- C、茵陈蒿汤
- D、柴胡疏肝散
- E、龙胆泻肝汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肝癌，湿热聚毒证

证候主症：右胁疼痛，甚至痛引肩背，右胁部结块，身黄目黄，口干口苦，心烦易怒，食少厌油，腹胀满，便干溲赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑或滑数。

证机概要：湿邪化热，聚而为毒。

治法：清热利胆，泻火解毒。

代表方：茵陈蒿汤加减。

### 32、脑瘤痰瘀阻窍证的主治方剂为

- A、大定风珠
- B、二陈汤
- C、复元活血汤
- D、通窍活血汤
- E、血府逐瘀汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 痰瘀阻窍证

证候主症：头晕头痛，项强，目眩，视物不清，呕吐，失眠健忘，肢体麻木，面唇暗红或紫暗，舌质紫暗或有瘀点、瘀斑，脉涩。

证机概要：痰瘀互结，蔽阻清窍。

治法：息风化痰，祛瘀通窍。

代表方：通窍活血汤加减。

### 33、肺胀痰浊壅肺证的治法是

- A、补肺纳肾，降气平喘
- B、温肾健脾，化饮利水
- C、化痰降气，健脾益肺
- D、清肺化痰，降逆平喘
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肺胀痰浊壅肺证

证候主症：胸部膨满，憋闷如塞，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力，舌暗，苔薄腻或浊腻，脉小滑。

证机概要：肺虚脾弱，痰浊内蕴，肺失宣降。

治法：化痰降气，健脾益肺。

### 34、增液汤治疗便秘，适用于

- A、阳虚秘
- B、热秘
- C、阴虚秘
- D、气虚秘
- E、血虚秘

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 阴虚秘。治法：滋阴通便。代表方：增液汤加减。

### 35、呕吐的基本病机是

- A、胃气上逆
- B、脾胃不和
- C、胃火亢盛
- D、肝气犯胃
- E、肝脾不和

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呕吐的病位主要在胃，但与肝脾有密切的关系。基本病机为胃失和降，胃气上逆。

### 36、不寐肝火扰心证，治宜

- A、黄连解毒汤
- B、温胆汤
- C、龙胆泻肝汤
- D、黄连温胆汤
- E、归脾汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 不寐之肝火扰心证。治法：疏肝泻火，镇心安神。代表方：龙胆泻肝汤加减。

### 37、厥证的基本病机是

- A、肝肾阴虚，气血衰少
- B、痰气郁结，蒙蔽神机
- C、气机逆乱，升降乖戾
- D、阴阳失调，气血逆乱
- E、痰湿壅盛，气血逆乱

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 厥证的基本病机为气机逆乱，升降乖戾，气血阴阳不相顺接。

### 38、虚劳辨证中，首先要辨别的要点是

- A、辨明有无因虚致实的表现

- B、辨明原有疾病是否还继续存在
- C、辨别五脏气血阴阳亏虚
- D、辨本症与并发症
- E、是否兼夹外邪

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 虚劳辨证中，首先辨别五脏气血阴阳亏虚。

### 39、下列关于厥证描述中，错误的是

- A、伴有尖叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等
- B、发病前或有精神刺激，或有大失血病史
- C、突然昏倒，不省人事
- D、昏厥时间较长，甚至一厥不复
- E、短小时内苏醒，醒后无偏瘫

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 “伴有尖叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等”属于痫病的表现。

### 40、感冒暑湿伤表证的治法

- A、益气解表
- B、滋阴解表
- C、辛温解表
- D、辛凉解表
- E、清暑祛湿解表

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 感冒暑湿伤表证

证候主症：身热，微恶风，汗少，肢体酸重或疼痛，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦口渴，或口中黏腻，渴不多饮，胸闷脘痞，泛恶，腹胀，大便或溏，小便短赤，舌苔薄黄而腻，脉濡数。

治法：清暑祛湿解表。

### 41、治疗肺痈溃脓期，应首选

- A、桔梗杏仁煎
- B、桔梗白散
- C、千金苇茎汤

- D、加味桔梗汤
- E、如金解毒散

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肺痈之溃脓期

证候主症：咳吐大量脓痰，或如米粥，或痰血相兼，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数或数实。

治法：排脓解毒。

代表方：加味桔梗汤加减。

#### 42、治疗痰饮内停引起的呕吐，除取主穴外还应选取

- A、梁门、内庭
- B、丰隆、公孙
- C、脾俞、章门
- D、下脘、足三里
- E、上脘、行间

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 呕吐配穴：寒邪客胃配上脘、胃俞；热邪内蕴配合谷、金津、玉液；饮食停滞配梁门、天枢；肝气犯胃配期门、太冲；痰饮内停配丰隆、公孙；脾胃虚寒配脾俞、胃俞。

#### 43、以下哪个经脉具有调节肢体运动和眼睑开合功能

- A、足少阳胆经
- B、十二经筋
- C、督脉
- D、阴跷与阳跷
- E、足太阳膀胱经

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 奇经八脉的功能。督脉调节全身阳经经气，称为“阳脉之海”，阴跷与阳跷调节肢体运动，司眼睑开合，十二经筋具有约束骨骼，屈伸关节，维持人体正常运动功能的作用。

#### 44、下列哪项属于表里经配穴


- A、咳嗽取尺泽、鱼际
- B、感冒取列缺、合谷

- C、膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D、胃痛取中脘、内庭
- E、痛经取地机、隐白

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 表里经配穴法：表里经配穴法是以脏腑、经脉的阴阳表里配合关系为依据的配穴方法。当某一脏腑经脉发生疾病时，取本经和其相表里经脉的腧穴配合组成处方。



#### 45、手少阴心经的原穴是

- A、神门
- B、少冲
- C、大陵
- D、合谷
- E、三阴交

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 手少阴心经的原穴是神门。

#### 46、下列各项中，不属于大椎穴主治病证的是

- A、痢疾、脱肛
- B、风疹、痤疮
- C、热病、疟疾
- D、项强、脊痛
- E、癫狂、惊风

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 大椎【主治】①热病、疟疾、恶寒发热、咳嗽、气喘等外感病证；②骨蒸潮热；③癫狂病证、小儿惊风等神志病证；④项强，脊痛；⑤风疹，痤疮。

#### 47、治疗中风闭证，主穴除选太冲、劳宫穴外，还应选

- A、水沟、十二井、丰隆
- B、下关、颊车、合谷
- C、中冲、太冲、丰隆
- D、丰隆、涌泉、大椎
- E、水沟、中冲、风池



【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 中风之中脏腑

闭证主穴: 水沟、十二井、太冲、丰隆、劳宫。

#### 48、属足少阴肾经的腧穴是

- A、照海
- B、气海
- C、血海
- D、少海
- E、小海

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 血海穴属足太阴脾经; 少海穴属手少阴心经; 小海穴属手太阳小肠经; 照海穴属足少阴肾经; 气海穴属任脉。



#### 49、眉间至后发际正中第 7 颈椎棘突下的骨度分寸是

- A、13 寸
- B、14 寸
- C、16 寸
- D、18 寸
- E、12 寸

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 眉间至后发际正中第 7 颈椎棘突下的骨度分寸是 18 寸。



#### 50、按照五行生克关系，治疗胆经实证应首选

- A、足窍阴
- B、足临泣
- C、侠溪
- D、阳辅
- E、丘墟

【隐藏答案】

【正确答案】 D

**【答案解析】** 足少阳胆经五行属木, 依五行生克关系, 实则泻其子, 木生火, 所以当泻其火穴。依据阴井木, 阳井金五输穴与五行的配属关系, 足少阳胆经的经穴阳辅五行属火, 所以, 因泻阳辅穴以治胆经实证。

### 51、下列腧穴在五行配属中属金的是

- A、大陵
- B、阳溪
- C、后溪
- D、经渠
- E、少府

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 十二经脉中每条经各有 5 个穴位属于五输穴; 五输穴不仅有经脉归属, 而且具有自身的五行属性, 按照“阴井木”“阳井金”的规律进行配属。少府为手少阴心经之荥穴, 属火; 大陵为手厥阴心包经之输穴, 属土; 阳溪为手阳明大肠经之经穴, 属火; 后溪为手太阳小肠经之输穴, 属木; 经渠为手太阴肺经之经穴, 属金。

### 52、膀胱的下合穴是

- A、上巨虚
- B、下巨虚
- C、合谷
- D、曲池
- E、委中

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 下合穴共有六个, 胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦的下合穴依次为足三里、上巨虚、下巨虚、阳陵泉、委中、委阳。

### 53、尺泽穴主治病证不包括哪项

- A、齿痛、口眼歪斜
- B、中暑、小儿惊风
- C、急性吐泻
- D、咯血、咽痛
- E、咳嗽、气喘

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

【答案解析】 尺泽

【主治】①咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛等肺系实热性病证；②肘臂挛痛；③急性吐泻、中暑、小儿惊风等急症。

#### 54、大肠的募穴所属的经脉是

- A、任脉
- B、脾经
- C、大肠经
- D、小肠经
- E、胃经

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 大肠募穴为天枢穴，属于足阳明胃经。

#### 55、乳头直下，第 7 肋间隙的穴位是

- A、期门
- B、带脉
- C、京门
- D、日月
- E、章门

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 日月属足少阳胆经，为其募穴，位于上腹部，当乳头直下，第 7 肋间隙，前正中线旁开 4 寸处，符合本题意。章门穴属肝经，位于侧腹，第 11 肋游离端下方；期门亦属肝经，位于胸部，乳头直下，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸；带脉在侧腹部，第 11 肋骨游离端垂线与脐水平线的交点上；京门位于 12 肋游离端，均未在第 7 肋间，与题干不符。

#### 56、翳风穴位于

- A、胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中
- B、后发际正中直上 0.5 寸，旁开 1.3 寸，当斜方肌外缘凹陷中
- C、乳突后下方凹陷中
- D、胸锁乳突肌后缘，平下颌角处
- E、乳突前下方与下颌角之间的凹陷中

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】翳风穴属手少阳三焦经，位于耳垂后方，当乳突与下颌角之间的凹陷处，选项 E 符合题干，其余选项均为错误选项。

### 57、治疗痛经，在下列穴位中应首选

- A、阳陵泉
- B、冲门
- C、地机
- D、公孙
- E、漏谷

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】地机为脾经郄穴，可疏理脾经经气而止痛。其余选项中漏谷、冲门、公孙均为脾经穴，主要治疗脾胃病和循行处病，止痛作用较差，而阳陵泉属胆经穴，主要治疗肝胆病，如胁痛、口苦等，对痛经疗效较差。

### 58、足厥阴肝经的起始穴是

- A、章门
- B、期门
- C、大敦
- D、涌泉
- E、隐白

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】足厥阴肝经起于大敦止于期门。

### 59、光明穴可以治疗的病证是

- A、胸乳胀痛
- B、足跗肿痛
- C、痴呆
- D、热病
- E、失眠

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】光明【主治】①目痛、夜盲、目视不明、近视等目疾；②胸乳胀痛；③下肢痿痹。



60、以下各项中，不属于拔罐治疗作用的是

- A、消肿止痛
- B、解毒杀虫
- C、通经活络
- D、祛风散寒
- E、行气活血

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 拔罐法具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用。



61、位于头部，眉上 1 寸，瞳孔直上的腧穴是

- A、四白
- B、隐白
- C、承泣
- D、阳白
- E、睛明

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 阳白【定位】在头部，眉上 1 寸，瞳孔直上。



62、颈椎病，病在太阳经应配

- A、大椎
- B、昆仑
- C、照海
- D、申脉
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 颈椎病，病在太阳经配申脉。



63、腰眼穴除腰痛外还可治疗的病证是

- A、呕吐、消渴
- B、目疾、鼻疾
- C、胃痛、胸胁痛



D、月经不调、虚劳

E、头痛，癫狂

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 腰眼【主治】①腰痛；②月经不调，带下；③虚劳。

#### 64、以下哪项不是照海穴的主治病证

A、小便频数、癃闭

B、咽喉干痛、目赤肿痛

C、失眠、癫痫

D、呕吐涎沫、吐舌

E、月经不调、带下

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 照海主治：①癫痫、失眠等精神、神志病证；②咽喉干痛、目赤肿痛等五官热性病证；③月经不调、痛经、带下、阴挺，阴痒等妇科病证；④小便频数，癃闭。

#### 65、属足少阴肾经的腧穴是

A、少海

B、小海

C、照海

D、气海

E、血海

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 血海穴属足太阴脾经；少海穴属手少阴心经；小海穴属手太阳小肠经；照海穴属足少阴肾经；气海穴属任脉。

#### 66、太冲穴的定位是

A、足背，第 2、3 跖骨结合部之前凹陷中

B、内踝前 1 寸，胫骨前肌腱内缘凹陷中

C、足背，当第 1、2 趾间的趾蹼缘上方纹头处

D、足背，当第 2、3 趾间的趾蹼缘上方纹头处

E、足背，第 1、2 跖骨结合部之前凹陷中

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 太冲【定位】在足背，第1、2跖骨间，跖骨底结合部前方凹陷中，或触及动脉搏动。

67、不属于足太阳膀胱经的腧穴是

- A、申脉
- B、攒竹
- C、大椎
- D、天柱
- E、昆仑

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 大椎属于督脉的穴位。

68、足少阴肾经的络穴是

- A、复溜
- B、大钟
- C、涌泉
- D、然谷
- E、太溪

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 大钟为足少阴肾经的络穴。

69、治疗丹毒首选的拔罐法是

- A、走罐法
- B、留针拔罐法
- C、刺血拔罐法
- D、闪罐法
- E、留罐法

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 治疗丹毒，采用拔罐法时，应先在红肿部位用皮肤针叩刺或散刺，然后再拔罐，使淤血邪毒尽去。其余选项中拔罐法祛邪之力较差。

刺血拔罐法, 又称刺络拔罐法。多用于热证、实证、瘀血证及某些皮肤病, 如神经性皮炎、痰疮、丹毒、扭伤、乳痈等。

### 70、足太阳膀胱经的输穴是

- A、飞扬
- B、束骨
- C、昆仑
- D、委阳
- E、申脉

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 束骨为足太阳膀胱经的输穴。

### 71、下列腧穴中, 归经错误的是

- A、太溪-肝经
- B、列缺-肺经
- C、阳陵泉-胆经
- D、阴陵泉-脾经
- E、合谷-大肠经

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 太溪为足少阴肾经的腧穴。

### 72、原络配穴是指

- A、阳经的原穴与后病的相表里阴经的络穴相配合
- B、同一条经脉的原穴与络穴相配合
- C、先病经脉的原穴与后病的相表里经脉的络穴相配合
- D、后病经脉的原穴与先病的相表里经脉的络穴相配合
- E、阴经的原穴与后病的相表里阳经的络穴相配合

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 临床上把先病经脉的原穴与后病的相表里经脉的络穴相配合, 称为原络配穴法或主客原络配穴法。

73、关于十二经筋，说法错误的是

- A、结聚于关节骨骼部
- B、走向躯干头面
- C、约束骨骼，屈伸关节
- D、行于体表，入于内脏
- E、起始于四肢末端

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 十二经筋的分布特点是：“行于体表，不入内脏”。

74、下列各项中，叙述不正确的是

- A、所行为经
- B、所入为合
- C、所根为井
- D、所溜为荣
- E、所注为输

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 《灵枢·九针十二原》：“所出为井，所溜为荣，所注为输，所行为经，所入为合。”

75、下列腧穴中，小肠的募穴是

- A、神阙
- B、中脘
- C、中极
- D、关元
- E、气海

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 关元为小肠的募穴。

76、雀啄灸属于

- A、艾条灸
- B、温灸器灸
- C、天灸

- D、温针灸
- E、艾炷灸

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 雀啄灸属于艾条灸中的悬起灸。

### 77、治疗心胆虚怯型心悸，除主穴外，应加用

- A、太冲
- B、太溪
- C、膻中
- D、膈俞
- E、胆俞

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 心悸之配穴：心胆虚怯配胆俞；心脾两虚配脾俞、足三里；阴虚火旺配太溪、肾俞；水气凌心配气海、阴陵泉；心脉瘀阻配膻中、膈俞。

## 二、A2

78、患者，女性，30岁。下肢弛缓无力年余，肌肉明显萎缩，功能严重受限，并感麻木，发凉，腰痛，头晕，舌红少苔，脉细数。治疗应选取何经穴为主

- A、太阳经
- B、阳明经
- C、少阳经
- D、厥阴经
- E、督脉经

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 本病属痿证。取穴侧重阳明之经，阳明多血多气，又主润宗筋，宗筋约束骨骼，利于关节运动，故治痿证重在调理阳明、补益气血、舒筋通络。其余选项中经脉取穴均不如阳明经脉取穴疗效显著。

79、患者，女性，40岁。自觉发热近1年，多为低热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，肋肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红苔黄，脉弦数。治疗本病首选的方剂是

- A、一贯煎



- B、黄连温胆汤
- C、清肝饮
- D、龙胆泻肝汤
- E、丹栀逍遥散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 内伤发热指气郁发热证

证候主症：发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红苔黄，脉弦数。

治法：疏肝理气，解郁泄热。

代表方：丹栀逍遥散加减。



**80、患者杨某，眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉细涩。治法宜选用**

- A、补益气血，调养心脾
- B、平肝潜阳，清火息风
- C、化痰祛湿，健脾和胃
- D、祛瘀生新，活血通窍
- E、滋养肝肾，益精填髓

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 眩晕之瘀血阻窍证

证候主症：眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩或细涩。

治法：祛瘀生新，活血通窍。

**81、患者张某，心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，甚则心痛彻背，背痛彻心，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重，舌质紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治法宜选用**

- A、辛温散寒，宣通心阳
- B、益气养阴，活血通脉
- C、疏肝理气，活血通络
- D、活血化瘀，通脉止痛
- E、通阳泄浊，豁痰宣痹

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 胸痹之心血瘀阻证

证候主症：心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，甚则心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸



闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重，舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦涩。

治法：活血化瘀，通脉止痛。

**82、** 张某，患肺痿病多年，咯吐涎沫，喘促短气，呼多吸少，动辄尤甚，唇面青紫，舌质暗红或有瘀斑，脉虚而涩。治法宜用

- A、纳气定喘，活血化瘀
- B、温肺益气
- C、寒热平调，清温并用
- D、滋阴清热，润肺生津
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肺痿，肾虚血瘀证

证候主症：咯吐涎沫，喘促短气，呼多吸少，动辄尤甚，唇面青紫，舌质暗红或有瘀斑，脉虚而涩。

证机概要：肺肾两虚，气不摄纳，气虚血瘀。

治法：纳气定喘，活血化瘀。



**83、** 患者虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。辨证为

- A、不寐之心肾不交证
- B、不寐之心胆气虚证
- C、不寐之肝火扰心证
- D、不寐之痰热扰心证
- E、不寐之心脾两虚证

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 不寐之心胆气虚证。主症：虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。

**84、** 患者泄泻多日，便质清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。同时伴有恶寒发热头痛，肢体酸痛的症状。治疗宜选用

- A、升麻葛根汤
- B、四神丸
- C、痛泻要方
- D、葛根芩连汤
- E、藿香正气散



【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻之寒湿内盛证。主症：泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。若兼外感风寒，则恶寒发热头痛，肢体酸痛，苔薄白，脉浮。治法：散寒化湿。代表方：藿香正气散加减。

85、患者，男，45岁。平素头晕头痛，痛有定处，常伴单侧肢体抽搐，颜面口唇青紫。舌质暗红有瘀斑，舌苔薄白，脉弦涩。诊断为痫病，辨证处方为

- A、通窍活血汤
- B、涤痰汤
- C、血府逐瘀汤
- D、少腹逐瘀汤
- E、定痫丸

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痫病之瘀阻脑络证。主症：平素头晕头痛，痛有定处，常伴单侧肢体抽搐，或一侧面部抽动，颜面口唇青紫。多继发于颅脑外伤、产伤、颅内感染性疾病后遗症等，或先天脑发育不全，舌质暗红或有瘀斑，舌苔薄白，脉涩，或弦。治法：活血化瘀，熄风通络。

代表方：通窍活血汤加减。

86、患者发病急骤，痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，里急后重明显，壮热口渴，舌红绛苔黄燥，脉滑数。其诊断是

- A、寒湿痢
- B、休息痢
- C、湿热痢
- D、疫毒痢
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 疫毒痢主症：起病急骤，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，大便频频，痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝。



87、患者呕吐多为清水痰涎，胸闷纳差，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。其证候是

- A、痰饮内阻
- B、饮食停滞
- C、胃阴不足

- D、外邪客胃
- E、脾阳不振

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 脾不运化，痰饮内停，胃气上逆则呕吐清水痰涎，脘闷不食；水饮上犯，清阳之气不展则头眩；水饮凌心则心悸；苔白腻，脉滑为痰饮停留之征。故诊断为呕吐痰饮内阻证。

88、患者大便秘结，胸胁痞满，甚则腹中胀痛，噎气，食少，苔薄腻，脉弦。治疗上应首选

- A、保和丸
- B、六磨汤
- C、柴胡疏肝散
- D、黄芪汤
- E、润肠丸

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 本患者出现症状为情志失和，肝气郁结所致的便秘，即气秘。治疗宜顺气导滞。方用六磨汤。

89、患者，女，48岁。咳嗽阵作，咳血鲜红，烦躁易怒，胸胁疼痛，小便黄，大便干，舌红苔黄，脉弦数，治疗宜用

- A、芍药汤
- B、龙胆泻肝汤
- C、泻白散合黛蛤散
- D、清燥救肺汤
- E、百合固金汤

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 咳血之肝火犯肺证。主症：咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。治法：清肝泻火，凉血止血。代表方：泻白散合黛蛤散加减。

90、患者多食易饥，但形体消瘦，口渴喜饮，大便干燥，苔黄，脉滑实有力。治疗应首选

- A、二冬汤
- B、六味地黄丸
- C、消渴方
- D、玉女煎



E、白虎汤

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 患者多食易饥，形体消瘦，口渴喜饮可以判断为消渴；多食易饥则说明患者胃火亢盛，故辨证为胃热炽盛。治法：清胃泻火，养阴增液。方选玉女煎加减。

91、患者头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，兼有胁痛，舌红苔黄，脉弦数。治疗方剂宜选用

- A、天麻钩藤饮
- B、加味四物汤
- C、芎芷石膏汤
- D、羌活胜湿汤
- E、川芎茶调散

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 肝阳头痛

证候主症：头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，或兼胁痛，舌红苔黄，脉弦数。

治法：平肝潜阳息风。

代表方：天麻钩藤饮加减。

92、患者反复发病，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。治宜

- A、六君子汤合归脾汤加减
- B、归脾汤合补中益气汤
- C、左归丸合天王补心丹
- D、龙胆泻肝汤合涤痰汤
- E、失笑散合丹参饮

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 痼病之心脾两虚证。主症：反复发病，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。治法：补益气血，健脾宁心。代表方：六君子汤合归脾汤加减。

93、患者，女，42岁。平素多病，自觉头晕、目眩加重半月，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急，闭经，面色不华，唇、指甲色淡，肌肤枯糙，舌质淡红，苔少，脉细。本证候的证机概要



- A、肝阳上亢，神窍闭阻
- B、气虚血瘀，脉络失养
- C、肝肾阴虚，瘀血阻络
- D、阴虚阳亢，上扰清空
- E、肝血亏虚，筋脉失养

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 虚劳之肝血虚证

证候主症：头晕，目眩，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急，或筋惕肉瞤，妇女月经不调甚则闭经，面色不华。

证机概要：肝血亏虚，筋脉失养。



94、林某，男性，18岁。3天来双膝关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起有恶风、发热。舌苔薄白，脉浮。此病证的证机概要

- A、寒邪兼夹风湿，留滞经脉，闭阻气血
- B、痰瘀互结，留滞肌肤，闭阻经脉
- C、湿邪兼夹风寒，留滞经脉，闭阻气血
- D、风邪兼夹寒湿，留滞经脉，闭阻气血
- E、风湿热邪壅滞经脉，气血闭阻不通

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 行痹

证候主症：肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起可见有恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓。

证机概要：风邪兼夹寒湿，留滞经脉，闭阻气血。

95、一患者，呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。中医辨证为呕吐

- A、肝气犯胃证
- B、外邪犯胃证
- C、痰饮内阻证
- D、食滞内停证
- E、以上均非

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呕吐之肝气犯胃证

证候主症：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。



96、患者张某，便血数日，便血色红，食少体倦，面色萎黄，心悸少寐，舌质淡，脉细。治疗方剂宜选用

- A、调胃承气汤
- B、地榆散
- C、黄土汤
- D、归脾汤
- E、小蓟饮子

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 便血之气虚不摄证。主症：便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。治法：益气摄血。代表方：归脾汤加减。

97、患者，女，35岁。长期低热，头晕眼花，心悸不宁，面白少华，唇甲淡白，舌质淡，脉细。其治法是

- A、益气养血
- B、滋阴清热
- C、补肝益肾
- D、疏肝清热
- E、活血化瘀

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干所述，诊断为内伤发热之血虚发热。治疗宜选用益气养血之法。血虚发热主症：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。

98、孙某，女，50岁。有胸闷病史3年，近日来心胸刺痛，胸部闷窒，动则加重，短气乏力，舌体胖大，边有齿痕，舌质暗淡，舌苔薄白，脉弦细无力。其治疗应首选的方剂是

- A、桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
- B、保元汤合血府逐瘀汤
- C、天王补心丹合炙甘草汤
- D、生脉散合人参养荣汤
- E、枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤

【隐藏答案】

【正确答案】 B



【答案解析】 真心痛之气虚血瘀

证候主症: 心胸刺痛, 胸部闷窒, 动则加重, 伴短气乏力, 汗出心悸, 舌体胖大, 边有齿痕, 舌质黯淡或有瘀点瘀斑, 舌苔薄白, 脉弦细无力。

证机概要: 心气不足, 血行无力, 心脉瘀滞。

治法: 益气活血, 通脉止痛。

代表方: 保元汤合血府逐瘀汤加减。

**99、患者, 女性, 43 岁。眩晕半年, 加重 1 周, 伴神疲乏力, 面色(白光)白, 时有心悸, 夜寐欠安, 舌淡, 脉细。治疗应在主穴基础上, 配**

- A、百会、太阳、印堂
- B、气海、脾俞、胃俞
- C、风池、肝俞、肾俞
- D、中脘、内关、解溪
- E、百会、上星、风池

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 眩晕, 气血两虚配气海、脾俞、胃俞。

**100、患者, 男性, 31 岁。口角歪向右侧, 左眼不能闭合 2 天, 左侧额纹消失, 治疗应选取何经穴为主**

- A、手、足厥阴经
- B、手、足阳明经
- C、手、足少阳经
- D、手、足太阴经、
- E、手、足太阳经

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 面瘫的治法: 祛风通络, 疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。

**101、患者, 男性, 46 岁。自觉心慌心烦, 时息时作, 健忘失眠, 治疗应首选**

- A、太溪
- B、合谷
- C、三阴交
- D、神门
- E、足三里、



【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 本证为不寐，治疗时以宁心安神为主，不寐的病位在心，故取心经的原穴神门穴为主穴宁心安神，其余穴皆为配穴。



102、患者，女性，30 岁。非周期性子宫出血，量多、色紫红、质稠，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外，还应加

- A、中极、阴交
- B、血海、中极
- C、关元、合谷
- D、气海、百会
- E、曲泉、血海

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 崩漏血热证，配中极、血海。



103、患者，女性，50 岁。头痛多年，后头部疼痛固定不移，痛如锥刺，舌暗，脉细涩。针灸治疗除主穴外，宜取

- A、阿是穴、血海、膈俞
- B、三阴交、肝俞、脾俞
- C、后溪、申脉、侠溪
- D、太阳、太溪、侠溪
- E、太冲、太溪、侠溪

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 患者头痛多年，应为内伤头痛。疼痛部位固定不移，痛如锥刺，舌暗，应考虑为瘀血头痛。故除主穴外，瘀血头痛配血海、膈俞。

104、患者，女性，48 岁。失眠 1 年，多梦少寐，入睡迟，易惊醒，多疑善惊，气短头晕，舌淡，脉弦细。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A、肝俞、间使
- B、脾俞、胃俞
- C、心俞、胆俞
- D、心俞、肾俞
- E、心俞、脾俞

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 不寐之心胆气虚证，配心俞、胆俞

 医学教育网  医学教育网  
**105、患者，男性，46岁。两耳轰鸣，按之不减，听力减退，兼见烦躁易怒，咽干，便秘，脉弦。治疗应首选**

- A、手、足少阴经穴
- B、手、足少阳经穴
- C、手阳明经穴
- D、足太阳经穴
- E、手、足太阴经穴

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干可辨证为肝胆火盛型耳鸣，因手足少阳两经经脉均入于耳中，故取此两经的穴位治疗。

 医学教育网  医学教育网  
**106、患者，女性，56岁。腰部隐隐作痛2年，下肢酸软乏力，腰冷，脉细。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是**

- A、风府、足三里
- B、足三里、气海
- C、肾俞、太溪
- D、大杼、阳陵泉
- E、合谷、三阴交

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 本病属肾虚腰痛。肾虚腰痛配肾俞、太溪。

 医学教育网  医学教育网  
**107、患者，男性，26岁。发热恶寒，寒重热轻，头痛身痛，鼻塞流涕，咳嗽，咳痰清稀，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选**

- A、手太阴、手阳明、督脉
- B、手太阴、足太阳、阿是穴
- C、手少阴、手太阳、督脉
- D、手太阴、手少阳、阿是穴
- E、手阳明、足阳明、任脉

【隐藏答案】



【正确答案】 A

【答案解析】 感冒治法：祛风解表。取手太阴、手阳明经穴及督脉穴为主。

108、患者，女性，48 岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除主穴外，还应加

- A、大椎、曲池
- B、肾俞、关元
- C、脾俞、气海
- D、肾俞、合谷
- E、脾俞、胃俞

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干辨证为痹症之热痹。大椎属督脉，为退热要穴，治一切热病；曲池属手阳明大肠经，亦可治疗各种热病。题干中患者除膝痛外并见热证之象，故除选用治疗膝痛的穴位外，配伍取用清热泻火的大椎、曲池。



109、患者，男性，50 岁。咳嗽月余，加重 1 周，咳引胸胁疼痛，痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，脉弦数。治疗应首选

- A、足阳明、手阳明经穴
- B、手阳明、足厥阴经穴
- C、手太阴、手阳明经穴
- D、手太阴、足太阴经穴
- E、足厥阴、手太阴经穴

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 经诊断此患者为咳嗽，以肃肺理气，止咳化痰为主，当取手太阴肺经，如太渊为肺经原穴，本脏真气所注，取之肃理肺气。患者同时可见咳引胸胁疼痛及痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，则应取足厥阴穴位疏肝理气。

110、某患者胃痛暴作，恶寒喜暖，脘腹得温则痛减，口淡不渴，喜热饮，舌苔薄白，脉弦紧。治疗应首选

- A、良附丸
- B、理中汤
- C、藿朴夏苓汤
- D、小建中汤
- E、黄芪建中汤

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 胃痛之寒邪客胃证

证候主症: 胃痛暴作, 恶寒喜暖, 得温痛减, 遇寒加重, 口淡不渴, 或喜热饮, 舌淡苔薄白, 脉弦紧。

证机概要: 寒凝胃脘, 阳气被遏, 气机阻滞。

治法: 温胃散寒, 行气止痛。

代表方: 良附丸加减。



### 三、B

1、A.饮流胁下

B.饮停胃肠

C.饮邪支撑胸肺

D.饮停头面

E.饮溢肢体

<111>、痰饮的病位为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

<112>、溢饮的病位为

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 痰饮: 心下满闷, 呕吐清水痰涎, 胃肠沥沥有声, 形体昔肥今瘦, 属饮停胃肠。

悬饮: 胸肋饱满, 咳唾引痛, 喘促不能平卧, 或有肺癆病史, 属饮流胁下。

溢饮: 身体疼痛而沉重, 甚则肢体浮肿, 当汗出而不汗出, 或伴咳喘, 属饮溢肢体。

支饮: 咳逆倚息, 短气不得平卧, 其形如肿, 属饮邪支撑胸肺。



2、A.消食导滞, 理气止痛

B.活血化瘀, 和络止痛

C.散寒温里, 理气止痛

D.泄热通腑, 行气导滞

E.疏肝解郁, 理气止痛

<113>、腹痛之肝郁气滞证, 治法宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 腹痛之肝郁气滞证

证候主症：腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得嗳气或矢气则舒，遇忧思恼怒则剧，舌淡红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气止痛。

<114>、腹痛之瘀血内停证，治法宜选用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 腹痛之瘀血内停证

证候主症：腹痛较剧，痛如针刺，痛处固定，经久不愈，舌质紫黯，脉细涩。

治法：活血化瘀，和络止痛。

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

3、A.温补脾胃，降逆止呃

B.清胃泄热，降逆止呃

C.顺气解郁，和胃降逆

D.温中散寒，降逆止呃

E.养胃生津，降逆止呃

<115>、呃逆胃中寒冷证的治法是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 呃逆之胃中寒冷证

证候主症：呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，遇寒更甚，进食减少，喜食热饮，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。

治法：温中散寒，降逆止呃。

<116>、呃逆脾胃阳虚证的治法是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 呃逆之脾胃阳虚证

证候主症：呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒，喜温喜按，面色（白光）白，手足不温，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：温补脾胃，降逆止呃。

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

4、A.郁金、延胡索

B.青皮、薤白

C.大腹皮、枳实



D. 党参、黄芪

E. 檀香、乌药

<117>、胃痛瘀血停胃证，胃痛甚者，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 胃痛瘀血停胃证，若胃痛甚者，可加延胡索、木香、郁金、枳壳以加强活血行气止痛之功。

<118>、胃痛瘀血停胃证，若四肢不温，舌淡脉弱者，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 胃痛瘀血停胃证，若四肢不温，舌淡脉弱者，当为气虚无以行血，加党参、黄芪等以益气活血。

5、A. 地黄、当归

B. 银柴胡、地骨皮

C. 煨益智

D. 天花粉、川贝母

E. 钟乳石、五味子

<119>、肺痿虚寒证，肺虚失约，唾沫多而尿频者，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 肺虚失约，唾沫多而尿频者加煨益智。

<120>、肺痿虚寒证，肾虚不能纳气，喘息，短气者，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 肾虚不能纳气，喘息，短气者，可配钟乳石、五味子，另吞蛤蚧粉。

6、A. 济生肾气丸合真武汤

B. 实脾饮

C. 五皮饮合胃苓汤

D. 桃红四物汤合五苓散

E. 麻黄连翘赤小豆汤

<121>、水肿瘀水互结证的主治方剂

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 水肿瘀水互结证

证候主症：水肿延久不退，肿势轻重不一，四肢或全身浮肿，以下肢为主，皮肤瘀斑，腰部刺痛，或伴血尿，舌紫暗，苔白，脉沉细涩。

治法：活血祛瘀，化气行水。

代表方：桃红四物汤合五苓散。

<122>、水肿肾阳衰微证的主治方剂

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 水肿肾阳衰微证

证候主症：水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下甚，按之凹陷不起，尿量减少或反多，腰酸冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，面色（白光）白，甚者心悸胸闷，喘促难卧，腹大胀满，舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟无力。

治法：温肾助阳，化气行水。

代表方：济生肾气丸合真武汤加减。

7、A.柴胡疏肝散

B.龙胆泻肝汤

C.玉女煎

D.桑菊饮

E.银翘散

<123>、鼻衄热邪犯肺证的主治方剂

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 鼻衄热邪犯肺证

证候主症：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，脉数。

治法：清泄肺热，凉血止血。

代表方：桑菊饮加减。

<124>、鼻衄肝火上炎证的主治方剂

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 鼻衄肝火上炎证

证候主症：鼻衄，头痛，目眩，耳鸣，烦躁易怒，两目红赤，口苦，舌红，脉弦数。

治法：清肝泻火，凉血止血。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

- 8、A.黄芩、黄连  
B.金钱草、海金沙  
C.延胡索、川楝子  
D.茵陈、黄柏  
E.大黄、芒硝

<125>、胁痛肝胆湿热证，若兼见发热、黄疸，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 胁痛肝胆湿热证，若兼见发热、黄疸者，加茵陈、黄柏以清热利湿退黄。

<126>、胁痛肝胆湿热证，如砂石阻滞胆道，应加用

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 若湿热煎熬，结成砂石，阻滞胆道，症见胁肋剧痛，连及肩背者，可加金钱草、海金沙、郁金、川楝子。

- 9、A.在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加关元、命门  
B.在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加照海、阴谷  
C.在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加百会、风池、太冲  
D.在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加中脘、阴陵泉、丰隆  
E.在气海、三阴交、肝俞、太溪、肾俞基础上加归来、隐白

<127>、绝经前后诸证肾阳不足证，治疗应

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

<128>、绝经前后诸证肾阴亏虚证，治疗应

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 绝经前后诸证，肾阴虚配照海、阴谷；肾阳虚配关元、命门。



10、A.中极、血海

B.血海、膈俞

C.中极、阴陵泉

D.膻中、太冲

E.阴谷、照海

<129>、崩漏血热证，除主穴外，配穴应选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 崩漏针灸配穴：血热配中极、血海；血瘀配血海、膈俞；湿热配中极、阴陵泉；气郁配膻中、太冲。

<130>、崩漏血瘀证，除主穴外，配穴应选

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 崩漏针灸配穴：血热配中极、血海；血瘀配血海、膈俞；湿热配中极、阴陵泉；气郁配膻中、太冲。

11、A.郄门

B.梁丘

C.地机

D.养老

E.外丘

<131>、属于手太阳小肠经的郄穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 郄穴是经脉之气深聚部位的腧穴，十二经脉各有一个，膀胱经的郄穴是金门，肺经为孔最，心经为阴郄，心包经为郄门，脾经为地机，肾经为水泉，肝经为中都，阴维为筑宾，阳维为阳交，大肠经为温溜，小肠经为养老，三焦经为会宗，胃经为梁丘，胆经为外丘，阴跷为交信，阳跷为跗阳。

<132>、属于足阳明胃经的郄穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 郄穴是经脉之气深聚部位的腧穴，十二经脉各有一个，膀胱经的郄穴是金门，肺经为孔最，心经为阴郄，心包经为郄门，脾经为地机，肾经为水泉，肝经为中都，阴维为筑宾，阳维为阳交，大肠经为温溜，小肠经为养老，三焦经为会宗，胃经为梁丘，胆经为外丘，阴跷为交信，阳跷为跗阳。

- 12、A.腰痛取命门、肾俞  
B.腹泻取天枢、尺泽  
C.头痛取率谷、太冲  
D.头痛取头维、丰隆  
E.牙痛取合谷、内庭

<133>、属于本经配穴的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 本经配穴法是指某一脏腑、经脉发生病变时，即遵循“不盛不虚，以经取之”的治疗原则，选用本经脉的腧穴配伍组成处方的方法。如：头痛取足阳明胃经的头维和丰隆。

<134>、属于同名经配穴的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 同名经配穴法是将手足同名经的腧穴相互配合组成处方的方法。本法是基于同名经“同气相通”的理论，即名称相同的经络相互沟通、交会。如：牙痛取手阳明经的合谷配足阳明经的内庭。

- 13、A.大杼  
B.阳陵泉  
C.丘墟  
D.悬钟  
E.血海

<135>、八会穴中的筋会是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 八会穴中的筋会是阳陵泉。

<136>、八会穴中的骨会是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A



【答案解析】 八会穴中的骨会是大杼。

- 14、A.外踝高点上 3 寸，腓骨前缘  
B.外踝高点上 4 寸，腓骨前缘  
C.内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处  
D.外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中  
E.外踝高点上 2 寸，腓骨前缘

<137>、悬钟穴的定位是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 悬钟穴：外踝高点上 3 寸，腓骨前缘。

<138>、丘墟穴的定位是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 丘墟穴：在外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

15、A.五脏病证

B.六腑病证

C.急性病证

D.表里经脉病证

E.慢性病证

<139>、络穴主治的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 十二络脉的主要功能是加强十二经中表里经之间的联系，故络穴在临床上有主治表里两经有关病症的作用。

<140>、下合穴主治的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 《灵枢·邪气脏腑病形》记载合治六腑，概括了下合穴的主治功能，临床上的六腑病症均可选用相应的下合穴治疗。



16、A.中都

B.梁丘

C.郄门

D.地机

E.养老

<141>、手厥阴心包经的郄穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

<142>、足厥阴肝经郄穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 郄门属手厥阴心包经，为心包经郄穴，养老为手太阳小肠经郄穴，A 中都为足厥阴肝经郄穴，B 为足阳明胃经郄穴，D 为足太阴脾经郄穴。



17、A.列缺

B.孔最

C.少商

D.太渊

E.鱼际

<143>、手太阴肺经的原穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。

<144>、手太阴肺经的输穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。



18、A.公孙

B.足临泣

C.悬钟



D.太渊

E.太白

<145>、既是原穴又是八会穴的脉穴是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 太渊既是手太阴肺经的原穴，又是八会穴之脉会。

<146>、既是络穴又是八脉交会穴的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 A

【答案解析】 公孙既是足太阴脾经的络穴，又是八脉交会穴，通冲脉。

19、A.荥穴

B.合穴

C.经穴

D.输穴

E.井穴

<147>、曲池在五输穴中，属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

<148>、太溪在五输穴中，属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 十二经脉中每条经各有 5 个穴位属于五输穴。曲池为手阳明大肠经之合穴，太溪为足少阴肾经之输穴。

20、A.七福饮

B.还少丹

C.半夏白术天麻汤

D.涤痰汤

E.当归活血饮

<149>、治疗痴呆脾肾两虚证，应首选的方剂是

A B C D E



**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 痴呆之脾肾两虚证

证候主症：表情呆滞，沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，词不达意，伴腰膝酸软，肌肉萎缩，食少纳呆，气短懒言，口涎外溢，或四肢不温，腹痛喜按，鸡鸣泄泻，舌质淡白，舌体胖大，苔白，或舌红，苔少或无苔，脉沉细弱，双尺尤甚。

治法：补肾健脾，益气生精。

代表方：还少丹加减。

<150>、治疗痴呆痰浊蒙窍证，应首选的方剂是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 痴呆之痰浊蒙窍证

证候主症：表情呆钝，智力衰退，或哭笑无常，喃喃自语，或终日无语，呆若木鸡，伴不思饮食，脘腹胀痛，痞满不适，口多涎沫，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。

治法：豁痰开窍，健脾化浊。

代表方：涤痰汤加减。

## 中医执业医师第四单元

### 一、A1

1、前列腺增生症脾肾气虚证，采用的治疗方药为

- A、补中益气汤
- B、八正散
- C、沉香散
- D、知柏地黄丸
- E、济生肾气丸

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 前列腺增生症脾肾气虚证

证候：尿频，滴沥不畅，尿线细甚或夜间遗尿或尿闭不通，神疲乏力，纳谷不香，面色无华，便溏脱肛。舌淡，苔白，脉细无力。

治法：补脾益气，温肾利尿。

方药：补中益气汤加减。

**【您的答案】** C

**【答案错误，得分：0】**

2、治疗阴茎痰核痰浊凝结证，采用的治疗方药为

- A、橘核丸
- B、仙方活命饮
- C、阳和汤合化坚二陈丸
- D、滋阴除湿汤合透脓散
- E、十全大补汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 阴茎痰核之痰浊凝结证：阴茎背侧可触及条索状结块，皮色不变、温度正常，无明显压痛，阴茎勃起时可发生弯曲或疼痛。舌淡边有齿印，苔薄白，脉滑。

治法：温阳通脉，化痰散结。

方药：阳和汤合化坚二陈丸加减。

3、白疔进行期基本治疗原则为

- A、清热凉血止痒
- B、清热凉血解毒
- C、疏风清热止痒
- D、疏风散寒止痒
- E、养血润燥，息风止痒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 白疔进行期多以清热凉血解毒为基本治疗原则。

4、药毒湿毒蕴肤证治疗的最佳方药为

- A、益胃汤
- B、麻黄桂枝各半汤
- C、萆薢渗湿汤
- D、清营汤
- E、增液汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 药毒湿毒蕴肤证

证候：皮疹为红斑、丘疹、风团、水疱，甚则糜烂渗液，表皮剥脱；伴灼热剧痒，口干，大便燥结，小便黄赤，或有发热；舌红，苔薄白或黄，脉滑或数。

治法：清热利湿，解毒止痒。

方药：萆薢渗湿汤加减。

### 5、黄水疮主要治法为

- A、健脾除湿
- B、凉血息风
- C、益气补血
- D、清暑利湿
- E、滋补肝肾

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 黄水疮治疗以清暑利湿为主要治法。

### 6、脂溢性皮炎肠胃湿热证最佳方药为

- A、五味消毒饮
- B、通窍活血汤
- C、四物汤合六味地黄汤
- D、消风散合当归饮子
- E、参苓白术散合茵陈蒿汤

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 脂溢性皮炎之肠胃湿热证

证候：皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：健脾除湿，清热止痒。

方药：参苓白术散合茵陈蒿汤。

### 7、相当于西医的恶性肿瘤颈部淋巴结转移的疾病是

- A、肉瘤
- B、乳岩
- C、失荣
- D、颈痈
- E、石瘿

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 失荣相当于西医的颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤。多见于 40 岁以上的男性，属古代外科四大绝证之一。



8、下列各项中不属血管瘤特点的是

- A、边界不清
- B、触之如海绵状
- C、大多数为先天性
- D、色泽鲜红或暗紫
- E、盘曲如蚯蚓状

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 血管瘤是指体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤。可发生于身体任何部位，大多数为先天性，其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫，或呈局限性柔软肿块，边界不清，触之如海绵状。相当于西医的血管瘤。常见的有毛细血管瘤和海绵状血管瘤。

筋瘤是以筋脉色紫、盘曲突起状如蚯蚓、形成团块为主要表现的浅表静脉病变。相当于西医的下肢静脉曲张。

9、可用于治疗蛇串疮的药物是

- A、疯油膏
- B、红油膏
- C、青黛散
- D、冲和膏
- E、回阳玉龙膏

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 冲和膏活血止痛，疏风祛寒，消肿软坚，适用于半阴半阳证。

回阳玉龙膏温经散寒，活血化瘀，适用于阴证。

红油膏防腐生肌，适用于一切溃疡。

疯油膏润燥杀虫止痒，适用于牛皮癣、慢性湿疮、皲裂等。

青黛散油膏收湿止痒、清热解毒，适用于蛇串疮、急性慢性湿疮等皮肤焮红痒痛、渗液不多之症，或疔腮，以及对各种油膏过敏者。

10、属于瘾疹的特点是

- A、呈带状分布的红斑上成簇的水疱
- B、大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退
- C、皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D、皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑
- E、对称分布，多形损害，剧烈瘙痒



**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** “呈带状分布的红斑上成簇的水疱”是蛇串疮的特点；  
“大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退”是瘾疹的特点；  
“皮肤上浅在性脓疱和脓痂”是黄水疮的特点；  
“皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑”是脂溢性皮炎的特点；  
“对称分布，多形损害，剧烈瘙痒”是湿疹的特点。



**11、疔的病因病机不包括**

- A、内郁湿火，外感风邪
- B、跌打损伤，瘀血留滞
- C、汗出不畅，湿热蕴蒸肌肤
- D、搔抓痒子，破伤染毒
- E、感受暑毒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 疔常因内郁湿火，外感风邪，两相搏结，蕴阻肌肤所致；或夏秋季节感受暑毒而生；或因汗出不畅，暑湿热蕴蒸肌肤，引起痒子，复经搔抓，破伤染毒而成。

**12、疥疮的特异性皮损是**

- A、丘疹
- B、丘疱疹
- C、小水疱
- D、隧道
- E、结节

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 疥疮的临床特点：夜间剧痒，在皮损处有灰白色、浅黑色或普通皮色的隧道，可找到疥虫。

**13、梅毒肝经湿热证的主治方剂为**

- A、清营汤
- B、柴胡疏肝散
- C、地黄饮子
- D、龙胆泻肝汤

E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 梅毒之肝经湿热证

证候: 多见于一期梅毒。外生殖器疳疮质硬而润, 或伴有横痃, 杨梅疮多在下肢、腹部、阴部; 兼见口苦口干, 小便黄赤, 大便秘结; 舌质红, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 清热利湿, 解毒驱梅。

方药: 龙胆泻肝汤加减。

14、关于接触性皮炎说法错误的是

- A、皮损呈多样性
- B、有明显接触史
- C、有一定的潜伏期
- D、常见于暴露部位
- E、有渗出倾向

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 接触性皮炎的诊断要点

(1) 发病前有明显的接触史, 均有一定的潜伏期。

(2) 一般急性发病, 常见于暴露部位, 如面、颈、四肢。

(3) 皮损的形态、范围、严重程度取决于接触物质种类、性质、浓度、接触时间的久暂、接触部位和面积大小及机体对刺激物的反应程度。皮损呈多样性。

“有渗出倾向”是湿疹的特点。

15、下列哪项不属于急性淋病的特点

- A、尿道口溢脓
- B、排尿后疼痛加重
- C、可出现血尿
- D、尿道刺痛
- E、尿道口红肿、发痒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 急性淋病: 尿道口红肿、发痒及轻度刺痛, 继而有稀薄黏液流出, 引起排尿不适, 24 小时后症状加剧。排尿开始时尿道外口刺痛或灼热痛, 排尿后疼痛减轻。尿道口溢脓, 开始为浆液性分泌物, 以后逐渐变稠出现黄色黏稠的脓性分泌物, 特别是清晨起床后分泌物的量较多。当病变上行蔓延至后尿道时, 可出现终末血尿、血精、会阴部轻度坠胀等现象。

16、烧伤面积的计算按中国九分法，躯干面积占

- A、9%
- B、18%
- C、27%
- D、36%
- E、46%

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 中国新九分法：成人的估算：将中国成人体表面积分为 11 个九等份，即头颈 9%=头部（3%）+面部（3%）+颈部（3%）；

双上肢 9%×2=双上臂（7%）+双前臂（6%）+双手（5%）；

躯干 9%×3=躯干前（13%）+躯干后（13%）+会阴（1%）；

双下肢 9%×5+1%=双臀（5%）+双大腿（21%）+双小腿（13%）+双足（7%）。

17、痒的常见病因中，不包括

- A、风胜
- B、血虚
- C、痰阻
- D、湿胜
- E、虫淫

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 痒是因风、湿、热、虫之邪客于皮肤肌表，引起皮肉间气血不和，郁而生微热所致；或因血虚风燥阻于皮肤，肤失濡养，内生虚热而发。

18、不属于湿疮特点的是

- A、皮损对称分布
- B、皮损呈多形损害
- C、传染性强
- D、易反复发作
- E、瘙痒剧烈

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 湿疮皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，有渗出倾向，反复发作，易成慢

性等。根据病程可分为急性、亚急性、慢性三类。急性湿疮以丘疱疹为主, 炎症明显, 易渗出; 慢性湿疮以苔藓样变为主, 易反复发作。

### 19、肉瘰相当于西医的

- A、甲状腺癌
- B、脂肪瘤
- C、甲状腺炎
- D、甲状腺腺瘤
- E、甲状腺肿大

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肉瘰是瘰病中较常见的一种, 其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块, 柔韧而圆, 如肉之团, 随吞咽动作而上下移动, 发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿, 属甲状腺的良性肿瘤。石瘰相当于西医的甲状腺癌。肉瘤相当于西医的脂肪瘤。瘰疬相当于西医的急性、亚急性甲状腺炎。气瘰相当于西医的甲状腺肿大。

### 20、肛裂的主要特点是

- A、疼痛, 坠胀, 便秘
- B、疼痛, 出血, 瘙痒
- C、瘙痒, 疼痛, 便秘
- D、疼痛, 出血, 便秘
- E、出血, 坠胀, 脱垂

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 肛裂临床上以肛门周期性疼痛、出血、便秘为主要特点。

### 21、饮食不节所致外科疾病的特点是

- A、经络阻塞, 气血凝滞
- B、阴液受损, 咽喉干燥
- C、脏腑气血受损, 阴阳失和
- D、具有一定传染性
- E、脾胃功能失调, 湿热火毒内生

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 脾胃者, 仓廩之官。饮食不节, 脾胃当最先受损, 日久最易化生湿热火毒之



邪。

22、关于肥疮，说法错误的是

- A、病变四周约 1cm 左右头皮不易受损
- B、皮损处不会形成永久性脱发
- C、头发干燥，穿过皮损，易折断
- D、皮损处可闻及鼠尿臭
- E、皮损处有黄癣痂堆积

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 肥疮相当于西医的黄癣。本病为头癣中最常见的一种，多见于农村，好发于儿童。其特征是：有黄癣痂堆积，癣痂呈蜡黄色，肥厚，富黏性，边缘翘起，中心微凹，上有毛发贯穿，质脆易粉碎，有特殊的鼠尿臭。久之毛囊被破坏而成永久性脱发。当病变痊愈后，则在头皮留下广泛、光滑的萎缩性疤痕。病变四周约 1cm 左右头皮不易受损。

23、关于蛇串疮的特点，说法正确的是

- A、瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退
- B、带状分布，皮肤上成簇的水疱
- C、皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D、皮肤黏膜交界处成群的水疱
- E、对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱，多呈带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。

24、肉瘤相当于西医的

- A、血管瘤
- B、骨骼肌肉瘤
- C、平滑肌肉瘤
- D、纤维肉瘤
- E、脂肪瘤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 肉瘤，相当于西医的脂肪瘤。



25、石瘕的病因病机，不包括

- A、情志内伤
- B、痰湿内生
- C、气滞血瘀
- D、感受疫毒
- E、肝脾气逆

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 石瘕病因病机：由于情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，瘀血与痰湿凝结，上逆于颈部而成。亦有由肉瘕日久转化而来。

26、对于子痰溃后症状的叙述，错误的是

- A、溃后易敛
- B、容易形成窦道
- C、脓液清稀
- D、易反复发作
- E、脓液中夹有豆腐渣样絮状物

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 子痰临床表现：溃破后脓液清稀，或夹有豆腐渣样絮状物，易形成反复发作、经久不愈的窦道。

27、下列各项，不属于诊断性刮宫禁忌证的是

- A、急性或亚急性生殖道炎症
- B、不孕症，了解有无排卵
- C、疑有妊娠要求继续妊娠者
- D、急性或严重的全身性疾病
- E、手术前体温大于 37.5℃者

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 诊断性刮宫禁忌证

- (1) 急性或亚急性生殖道炎症。
- (2) 疑有妊娠要求继续妊娠者。
- (3) 急性或严重的全身性疾病。



(4) 手术前体温大于 37.5℃者。

28、妊娠小便不通气虚证的代表方剂为

- A、导赤散
- B、加味五苓散
- C、补中益气汤
- D、益气导溺汤
- E、肾气丸

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 妊娠小便不通气虚证

主要证候：妊娠期间，小便不通，或频数量少，小腹胀急疼痛，坐卧不安，面色（白光）白，神疲倦怠，头重眩晕；舌淡，苔薄白，脉虚缓滑。

治法：补中益气，导溺举胎。

方药：益气导溺汤。

29、下列各项，属胎萎不长常见病因的是

- A、气血虚弱，气滞血瘀，血寒宫冷
- B、气血虚弱，脾肾不足，血寒宫冷
- C、脾肾不足，气血虚弱，肝经湿热
- D、脾虚湿阻，肾阴亏损，血寒宫冷
- E、脾肾不足，气血虚弱，气滞血瘀

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 胎萎不长的主要机理是气血不足以营养其胎，而致胎儿生长迟缓。主要病因有气血虚弱、脾肾不足、血寒宫冷。

30、治疗经行浮肿气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A、四物汤
- B、八物汤
- C、逍遥散
- D、四神丸合健固汤
- E、六味地黄丸

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B



**【答案解析】** 经行浮肿气滞血瘀证

主要证候：经行肢体肿胀，按之随手而起，经血色黯有块，脘闷胁胀，善叹息；舌紫黯，苔薄白，脉弦涩。

治法：理气行滞，养血调经。

方药：八物汤加泽泻、益母草。

31、我国现存的第一部产科专著是

- A、《傅青主女科》
- B、《景岳全书》
- C、《内经》
- D、《女科要旨》
- E、《经效产宝》

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 我国现存的第一部产科专著是《经效产宝》。

32、下列各项，不属于异位妊娠已破损期不稳定型临床表现的是

- A、腹部有压痛及反跳痛
- B、腹部可触及界线不清的包块
- C、腹痛拒按
- D、一侧下腹撕裂样疼痛
- E、阴道少量出血

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 异位妊娠已破损期不稳定型

主要证候：腹痛拒按，腹部有压痛及反跳痛，但逐渐减轻，可触及界线不清的包块，兼有少量阴道流血，血压平稳，脉细缓。

治法：活血祛瘀，佐以益气。

方药：宫外孕 I 号方。

33、治疗产后身痛风寒证，应首选的方剂是

- A、独活寄生汤
- B、人参败毒散
- C、桂枝汤
- D、黄芪桂枝五物汤
- E、参苏饮

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 产后身痛之风寒证

主要证候: 产后肢体关节疼痛, 屈伸不利, 或痛无定处, 或冷痛剧烈, 宛如针刺, 得热则舒, 或关节肿胀, 麻木, 重着, 伴恶寒怕风; 舌淡苔薄白, 脉濡细。

治法: 养血祛风, 散寒除湿。

方药: 独活寄生汤或趁痛散、防风汤。



**34、与月经产生关系最密切的是**

- A、肝、脾、肾
- B、心、肝、肺
- C、心、肝、脾
- D、肾、肺、脾
- E、肾、肝、心

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 五脏之中, 肾藏精, 肝藏血, 脾生血, 心主血, 肺主气, 气帅血, 在月经产生中各司其职, 如肾气旺盛, 使天癸泌至; 肝血充足, 气机条达, 则经候如期; 脾胃健运, 则血海充盈, 血循常道。故在月经产生的机理中, 与肾、肝、脾关系尤为密切。

**35、不属于急性盆腔炎诊断要点的是**

- A、宫体触压痛, 拒按
- B、小腹部疼痛难忍
- C、小腹部肌紧张、压痛、反跳痛
- D、易疲劳, 劳则复发
- E、赤白带下或恶露量多

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 急性盆腔炎的诊断

(1) 病史: 近期有经行、产后、妇产科手术、房室不洁等发病因素。

(2) 临床表现: 呈急性病容, 辗转不安, 面部潮红, 高热不退, 小腹部疼痛难忍, 赤白带下或恶露量多, 甚至如脓血, 亦可伴有腹胀、腹泻、尿频、尿急等症状。

(3) 检查

①妇科检查: 小腹部肌紧张, 压痛、反跳痛; 阴道充血, 脓血性分泌物量多; 宫颈充血, 宫体触压痛拒按, 宫体两侧压痛明显, 甚至触及包块; 盆腔形成脓肿, 位置较低者则后穹隆饱满, 有波动感。

②辅助检查: 血常规检查见白细胞升高, 粒细胞更明显。阴道、宫腔分泌物或血培养可见

致病菌。后穹隆穿刺可吸出脓液。B 超可见盆腔内有炎性渗出液或肿块。

D 选项是慢性盆腔炎的临床表现。

**36、关于子痫，说法错误的是**

- A、妊娠后期，出现头面四肢水肿
- B、妊娠后期，忽然四肢抽搐，全身强直，须臾醒，醒复发
- C、妊娠后期，忽然眩晕倒扑，昏不知人，两目上视，牙关紧闭
- D、新产后，忽然昏不知人，牙关紧闭
- E、妊娠后期，突然出现昏迷不醒

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 子痫又称“子冒”、“妊娠痫证”，其主症是妊娠晚期或临产前及新产后，突然发生眩晕倒扑，昏不知人，两目上视，牙关紧闭，四肢抽搐，全身强直，须臾醒，醒复发，甚至昏迷不醒者，称为“子痫”。

**37、下列各项，不属于子宫脱垂中医病名的是**

- A、产肠不收
- B、阴脱
- C、阴挺
- D、阴蚀
- E、阴痔

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 子宫从正常位置沿阴道下降，宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出于阴道口以外，称“阴挺”。常合并阴道前壁和后壁膨出。也称“阴脱”、“阴菌”、“阴痔”、“产肠不收”、“葫芦（疝颓）”。本病相类于西医的“子宫脱垂”。

**38、对于产后腹痛气血两虚证，治疗应首选**

- A、血府逐瘀汤
- B、当归芍药散
- C、小建中汤
- D、八珍汤
- E、肠宁汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E



**【答案解析】** 产后腹痛之气血两虚证

主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血益气，缓急止痛。

方药：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

**39、子淋之湿热下注证，应首选**

- A、小蓟饮子
- B、八正散
- C、导赤散
- D、加味五苓散
- E、知柏地黄丸

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 子淋之湿热下注证

主要证候：妊娠期间，突感尿频、尿急、尿痛，尿意不尽，欲解不能，小便短赤，小腹坠胀，胸闷食少，带下黄稠量多；舌红苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热利湿，润燥通淋。

方药：加味五苓散。

**40、产后抑郁瘀血内阻证，治疗应首选**

- A、加味逍遥散
- B、芎归泻心汤
- C、归脾汤
- D、逍遥散
- E、当归补血汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 产后抑郁瘀血内阻证

主要证候：产后抑郁寡欢，默默不语，失眠多梦，神志恍惚；恶露淋漓日久，色紫黯有块，面色晦暗；舌暗有瘀斑，苔白，脉弦或涩。

治法：活血逐瘀，镇静安神。

方药：调经散或芎归泻心汤。

**41、下列关于子宫位置的描述，不正确的是**

- A、带脉之下
- B、神阙上方

- C、小腹正中
- D、膀胱之后
- E、直肠之前

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 子宫位于带脉之下，小腹正中，膀胱之后，直肠之前，下口连接阴道。

42、止带方常用于治疗带下过多之

- A、脾虚证
- B、湿毒证
- C、肾阳虚证
- D、肾阴虚证
- E、湿热下注证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 带下过多之湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。

方药：止带方。

43、妊娠肿胀多发生在

- A、妊娠 1~2 月以后
- B、妊娠 2~3 月以后
- C、妊娠 4~5 月以后
- D、妊娠 5~6 月以后
- E、妊娠 7~8 月以后

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 妊娠肿胀多发生在妊娠 5~6 月以后。

44、下列哪项不属于妊娠病的范畴

- A、胞阻
- B、子冒
- C、宫缩痛

- D、胞转
- E、恶阻病

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** “宫缩痛”、“产后痛”，属生理现象，一般不需治疗。

**45、产后用药三禁是指**

- A、禁大汗、禁峻下、禁利小便
- B、禁祛寒、禁开郁、禁化瘀
- C、禁活血、禁通便、禁消导
- D、禁清热、禁凉血、禁滋阴
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 产后用药“三禁”：禁大汗以防亡阳；禁峻下以防亡阴；禁通利小便以防亡津液。

**46、治疗经间期出血肾阴虚证，应首选**

- A、逐瘀止血汤
- B、调肝汤
- C、清肝止淋汤
- D、左归丸
- E、两地汤合二至丸

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 经间期出血之肾阴虚证

主要证候：两次月经中间，阴道少量出血或稍多，色鲜红，质稍稠；头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，便艰尿黄；舌体偏小质红；脉细数。

治法：滋肾养阴，固冲止血。

方药：两地汤合二至丸或加减一阴煎。

**47、小儿泄泻发病率较高的季节是**

- A、冬春
- B、秋冬
- C、春夏

- D、夏秋
- E、四季无差异

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 泄泻一年四季均可发生，以夏秋季节发病率为高。

**48、治疗口疮之虚火上浮证，应首选的方剂是**

- A、凉膈散
- B、六味地黄丸
- C、导赤散
- D、泻黄散
- E、清胃散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 口疮之虚火上浮证

证候：口腔溃疡或糜烂，周围色不红或微红，疼痛不甚，反复发作或迁延不愈，神疲颧红，口干不渴，舌红，苔少或花剥，脉细数，指纹淡紫。

治法：滋阴降火，引火归原。

代表方剂：六味地黄丸加肉桂。

**49、小儿添加辅食的时间，一般选择**

- A、3~6个月起
- B、4~7个月起
- C、3~5个月起
- D、4~5个月起
- E、4~6个月起

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 断奶时间视母婴情况而定。小儿4~6个月起应逐渐添加辅食，8~12个月时可以完全断乳。若遇婴儿患病或正值酷暑、严冬，可延至婴儿病愈、秋凉或春暖季节断奶。

**50、胎怯的病变脏腑主要在**

- A、肺、心
- B、心、脾
- C、脾、肾



- D、肺、脾
- E、肝、肾

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 胎怯的病因为先天禀赋不足，病变脏腑主要在肾与脾，发病机制为先天禀赋不足，化源未充，涵养不足，肾脾两虚，五脏失养。

51、小儿睡时露睛，属于

- A、胃气不降
- B、肾不纳气
- C、脾胃不和
- D、肝脾不和
- E、脾虚气弱

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 小儿寐时眼睑张开而不能闭合，属于脾虚气弱。

52、学龄期儿童药剂用量是成人量的

- A、2/3
- B、1/2
- C、1/6
- D、1/3
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 小儿用药剂量常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握，中药汤剂可采用下列比例用药：新生儿用成人量的 1/6，乳婴儿用成人量的 1/3，幼儿用成人量的 1/2，学龄期儿童用成人量的 2/3 或接近成人量。

53、佝偻病的病机主要是

- A、肝风阴虚
- B、肺脾两虚
- C、脾肾虚亏
- D、心肝血虚
- E、肝肾阴虚

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 佝偻病的病机主要是脾肾虚亏，常累及心肺肝。



54、诊断 6 岁以上小儿营养性缺铁性贫血的标准，其血红蛋白值应低于的数值是

- A、110g/L
- B、120g/L
- C、80g/L
- D、90g/L
- E、100g/L

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 小儿营养性缺铁性贫血：3 个月～6 岁血红蛋白<110g/L，6 岁以上血红蛋白<120g/L。



55、水痘的好发年龄是

- A、6～9 岁
- B、9 岁以上
- C、6 月～1 岁
- D、1～3 岁
- E、3～6 岁

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 水痘，任何年龄小儿皆可发病，以 6～9 岁儿童最为多见。



56、丹痧的主要辨证方法是

- A、脏腑
- B、六经
- C、八纲
- D、阴阳
- E、卫气营血

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 丹痧属于瘟疫，以卫气营血为主要辨证方法。

57、以热退疹出为特征的疾病是

- A、丹痧
- B、手足口病
- C、麻疹
- D、奶麻
- E、风痧

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 奶麻，又称假麻，西医学称为幼儿急疹，是由人疱疹病毒 6 型感染而引起的一种急性出疹性传染病，临床以持续高热 3~5 天，热退疹出为特征。

58、麻疹早期诊断的特征性依据是

- A、玫瑰色斑丘疹
- B、枕部淋巴结肿大
- C、发热起伏
- D、咳嗽频繁
- E、麻疹黏膜斑

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 初期发热，流涕，咳嗽，两目畏光多泪，口腔两颊黏膜近白齿处可见麻疹黏膜斑。麻疹黏膜斑为麻疹早期诊断的特征性依据。

59、小儿尿频脾肾气虚证的主治方剂为

- A、八正散
- B、知柏地黄丸
- C、缩泉丸
- D、理中丸
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 尿频之脾肾气虚证

证候：病程日久，小便频数，滴沥不尽，尿液不清，神倦乏力，面色萎黄，食欲不振，甚则畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，眼睑浮肿，舌质淡或有齿痕，苔薄腻，脉细弱。

治法：温补脾肾，升提固摄。

代表方剂: 缩泉丸。

60、小儿脏腑娇嫩, 表现突出的是

- A、肝脾肾
- B、肺脾肾
- C、心肺肾
- D、心肝肾
- E、肺肝肾

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 小儿病理特点就是: “肺常不足”、“脾常不足”、“肾常虚”。所以小儿的脏腑娇嫩, 肺脾肾三脏表现尤为突出。

61、小儿营养不良的标准是体重低于正常均值的

- A、体重低于正常均值的 95%
- B、体重低于正常均值的 90%
- C、体重低于正常均值的 85%
- D、体重低于正常均值的 70%
- E、体重低于正常均值的 60%

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 体重低于正常均值的 85% 者为营养不良。

62、疝腮之毒窜睾腹证, 治疗首选

- A、清瘟败毒饮
- B、龙胆泻肝汤
- C、普济消毒饮
- D、犀角地黄汤
- E、黄连解毒汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 疝腮之毒窜睾腹证

证候: 腮部肿胀消退后, 一侧或双侧睾丸肿胀疼痛, 或脘腹、少腹疼痛, 痛时拒按, 舌红, 苔黄, 脉数。

治法: 清肝泻火, 活血止痛。

代表方剂: 龙胆泻肝汤。

63、构成传染病流行过程的三个基本条件是

- A、季节、地区、暴发
- B、侵袭力、数量、外环境
- C、病原体、机体、外环境
- D、社会因素、变异性、毒力
- E、传染源、传播途径、易感人群

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 传染病的流行过程就是传染病在人群中发生、发展和转归的过程。流行过程的构成需要有三个基本条件,包括传染源、传播途径和易感人群。同时流行过程又受到社会因素和自然因素的影响。

64、治疗普通型流行性脑脊髓膜炎首选抗菌药物是

- A、庆大霉素
- B、青霉素
- C、红霉素
- D、磺胺药
- E、氨苄西林

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 流行性脑脊髓膜炎抗生素治疗原则: 早期、足量、连续、足疗程。首选青霉素 G。

65、有关丙型肝炎流行特征的叙述, 不正确的是

- A、主要为散发
- B、多见于儿童
- C、使用血制品可传播
- D、见于世界各国
- E、发病无季节性

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 丙型肝炎: 见于世界各国, 主要为散发, 多见于成人, 尤以输血与使用血制品者、静脉药瘾者、血液透析者、肾移植者、同性恋者等为多见, 发病无季节性。



66、属于被动性特异性免疫的是

- A、疫苗
- B、抗毒素
- C、菌苗
- D、类毒素
- E、锻炼身体

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 接种疫苗、菌苗、类毒素等可提高人群的主动性特异性免疫，接种抗毒素、丙种球蛋白或高效价免疫球蛋白可使机体获得被动特异性免疫。儿童计划免疫对传染病预防起关键性的作用。

67、典型伤寒出现玫瑰疹的时间是

- A、第 22~28 天
- B、第 28 天以后
- C、第 3~5 天
- D、第 6~12 天
- E、第 14~21 天

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 玫瑰疹多出现在病程第 6~12 日皮肤出现暗红色小斑丘疹，称为玫瑰疹，散在分布于前胸和上腹部，2~4mm 大小，压之褪色，数目不多，6~10 个，分批出现，多在 2~4 日内消失。

68、鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是

- A、潜伏期的长短
- B、毒血症状的轻重
- C、大便常规检查红白细胞的多少
- D、大便检出病原体
- E、抗生素治疗是否有效

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 细菌性痢疾粪便培养志贺菌阳性；而阿米巴痢疾粪便检查可找到溶组织内阿米巴滋养体或包囊。



69、下列哪项是细菌性痢疾散发流行的主要传播途径

- A、接触患者的分泌物
- B、接触患者的血液
- C、集体食堂食物被污染
- D、供水系统被污染
- E、手或蔬菜、瓜果等被污染

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 细菌性痢疾的传播途径主要为粪-口途径，一般通过手或蔬菜、瓜果等被污染后而传播。

70、临床诊断病毒性肝炎，采用最可靠的依据是

- A、症状及体征
- B、病原学及肝功能检查结果
- C、接触史
- D、传播途径
- E、起病方式

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 病原学及肝功能检查是临床上诊断病毒性肝炎最可靠的依据。

71、传染病与感染性疾病的主要区别是

- A、是否是病原携带者
- B、是否有坏死组织
- C、机体免疫力的强与弱
- D、是否具有传染性
- E、发热的高低

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 传染病是由各种病原微生物和寄生虫感染人体后产生的有传染性的疾病。感染性疾病是由病原微生物和寄生虫侵入人体引起的疾病，较之传染病不同点在于感染性疾病包括传染病，但范围更广泛，且不一定具有传染性。

72、下述各项, 属低效消毒剂的是

- A、碘类
- B、苯扎溴铵
- C、酚类消毒剂
- D、电离辐射
- E、戊二醛

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 低效消毒法只能消灭细菌繁殖体、部分真菌和亲脂性病毒。物理低效消毒方法有通风换气、冲洗和洗手等; 化学低效消毒剂有氯己定(洗必泰)、苯扎溴铵(新洁尔灭)等。

73、有关流行性出血热发热期的治疗, 叙述不正确的是

- A、发病 3 日内可给予利巴韦林
- B、使用血管活性药静脉滴注
- C、预防 DIC 给予低分子右旋糖酐
- D、发热后期给予 20% 甘露醇
- E、减轻外渗应早期卧床休息

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 流行性出血热发热期的治疗: 1. 抗病毒: 发病 3 日内可给予利巴韦林, 每日 1g, 静脉滴注, 疗程 3~5 日, 可抑制病毒, 减轻病情和缩短病程。2. 减轻外渗: 应早期卧床休息。为降低血管通透性, 可给予芦丁、维生素 C、输注平衡盐液等。发热后期给予 20% 甘露醇 125~250ml。3. 改善中毒症状: 高热以物理降温为主, 慎用发汗退热药; 中毒症状重者, 可给予地塞米松静脉注射; 呕吐频繁者给予甲氧氯普胺肌内注射。4. 预防 DIC: 给予低分子右旋糖酐或丹参注射液静脉滴注, 以降低血液黏滞度。

74、下列属于脑膜炎球菌的描述的是

- A、目前我国流行株以 C 群为主
- B、对营养要求较高
- C、革兰染色阳性, 体外抵抗力很弱, 能产生自溶酶
- D、特异性荚膜多糖抗原与其致病作用无关
- E、能产生毒力较强的外毒素

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 脑膜炎球菌仅存在于人体, 可从带菌者鼻咽部及患者的血液、脑脊液、皮肤

痰点中检出, 专性需氧, 对营养要求较高。

75、下列有关戊型肝炎的流行特征, 叙述不正确的是

- A、存在流行和散发两种形式
- B、流行主要发生于不发达国家
- C、多发生于雨季或洪水泛滥之后
- D、散发病例主要是冬春季节
- E、老年人戊型肝炎所占比例更高

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 戊型肝炎: 存在流行和散发两种形式。流行主要发生于亚洲、非洲和中美洲的一些不发达国家。在我国成人急性病毒性肝炎中, 多数地区戊型肝炎已占首位, 尤其是老年人戊型肝炎所占比例更高。多发生于雨季或洪水泛滥之后。散发病例一年四季均可发生。

76、引起伤寒不断传播或流行的主要传染源是

- A、普通型患者
- B、慢性带菌者
- C、顿挫型患者
- D、恢复期患者
- E、潜伏期患者

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 伤寒传染源: 少数患者病后可成为长期带菌者, 持续带菌超过 3 个月者称为慢性带菌者。

77、某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平, 称为

- A、大流行
- B、流行
- C、散发
- D、暴发
- E、以上都不对

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 流行: 某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。



78、中毒性细菌性痢疾最严重的临床表现是

- A、循环衰竭和呼吸衰竭
- B、昏迷
- C、起病急骤
- D、高热
- E、惊厥

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 中毒型菌痢：多见于 2~7 岁儿童，成人偶有发生。起病急骤、发展快、病势凶险。突起畏寒、高热，全身中毒症状重，可有烦躁或嗜睡、昏迷及抽搐等，数小时内可迅速发生循环衰竭和呼吸衰竭。病情最为凶险，病死率最高（90%以上）。

79、肺炎型流感在临床中最常见的人群是

- A、2 岁以下的小儿
- B、孕妇
- C、中老年
- D、青少年
- E、学龄前儿童

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 肺炎型流感多发生在 2 岁以下的小儿。

80、菌痢急性期的基本病变是

- A、全身小血管内皮细胞肿胀，血浆渗出
- B、肠黏膜弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
- C、肠黏膜水肿、增厚、溃疡形成
- D、肠壁形成口小底大的烧瓶样溃疡
- E、嗜酸性肉芽肿的形成

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 菌痢的主要病变部位是乙状结肠和直肠，严重者可波及整个结肠甚至回肠末端。急性期的基本病理变化是弥漫性纤维蛋白渗出性炎症，1 周病变逐渐愈合，不留瘢痕。

81、伤寒患者出现玫瑰疹，多见于

- A、缓解期
- B、恢复期
- C、潜伏期
- D、发热初期
- E、极期

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 伤寒极期特点有：发热、消化系统症状、神经系统症状、循环系统症状、肝脾大、皮疹，皮疹即为玫瑰疹，多见于极期。

82、下列有关 SARS 临床表现的叙述，错误的是

- A、严重者出现呼吸窘迫
- B、常以发热为首发和主要症状
- C、常伴有呼吸道卡他症状
- D、肺部体征不明显
- E、部分患者出现消化道症状

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** SARS 临床表现常无上呼吸道卡他症状。

83、患者，男，48 岁，尿道口红肿，尿液混浊如脂，尿道口溢脓，尿急，尿频，尿痛，尿道灼热，严重时尿道黏膜水肿，伴有发热等全身症状；舌红，苔黄腻，脉滑数，其证候为

- A、肝肾亏损证
- B、血热蕴毒证
- C、肝经湿热证
- D、阴虚毒恋证
- E、湿热毒蕴证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 淋病湿热毒蕴证（急性淋病）

证候：尿道口红肿，尿液混浊如脂，尿道口溢脓，尿急，尿频，尿痛，尿道灼热，严重者尿道黏膜水肿，附近淋巴结红肿疼痛，女性宫颈充血、触痛，并有脓性分泌物，或有前庭大腺红肿热痛等；可伴有发热等全身症状；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，解毒化浊。



方药: 龙胆泻肝汤加减。

84、炎热夏季, 某患儿局部皮肤出现红肿结块, 灼热疼痛, 根脚很浅, 范围局限。伴发热, 口干, 便秘, 溲赤。舌苔薄腻, 脉滑数。中医诊断为疖, 治疗宜选用

- A、五味消毒饮
- B、清暑汤
- C、黄连解毒汤
- D、参苓白术散
- E、普济消毒饮

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 疖之暑热浸淫证

证候: 发于夏秋季节, 以小儿及产妇多见。局部皮肤红肿结块, 灼热疼痛, 根脚很浅, 范围局限。伴发热, 口干, 便秘, 溲赤。舌苔薄腻, 脉滑数。

治法: 清暑化湿解毒

代表方: 清暑汤加减。



85、患者孙某, 55 岁。患肢疼痛、肿胀、皮色红紫, 活动后则甚, 小腿胫部挤压刺痛, 可见条索状物, 按之柔韧或似弓弦; 舌有瘀点, 脉沉涩。治疗宜

- A、疏肝解郁, 活血解毒
- B、活血化瘀, 行气散结
- C、清热利湿, 解毒通络
- D、行气活血, 疏肝解郁
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 血栓性浅静脉炎之血瘀湿阻证

证候: 患肢疼痛、肿胀、皮色红紫, 活动后则甚, 小腿胫部挤压刺痛, 或见条索状物, 按之柔韧或似弓弦; 舌有瘀点、瘀斑, 脉沉细或沉涩。

治法: 活血化瘀, 行气散结。

代表方: 活血通脉汤加减。



86、患者王某, 42 岁。丹毒发于胸腹腰胯部, 皮肤红肿蔓延, 摸之灼手, 肿胀疼痛, 伴口干且苦。舌红, 苔黄腻, 脉弦滑数。治疗宜选用

- A、犀角地黄汤
- B、龙胆泻肝汤
- C、黄连解毒汤



D、普济消毒饮

E、桃红四物汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 丹毒之肝脾湿火证

证候：发于胸腹腰部，皮肤红肿蔓延，摸之灼手，肿胀疼痛，伴口干且苦。舌红，苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清肝泻火利湿。

代表方：柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

87、患儿，6岁。颈部结块，形如鸡卵，皮色不变，灼热疼痛，边界清楚，伴风温外感症状。其治法是

A、清热利湿，和营消肿

B、和营托毒，清热利湿

C、清热解毒，和营消肿

D、散风清热，化痰消肿

E、清热解毒，消肿止痛

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 颈痈之风热痰毒证

证候：颈旁结块，初起色白濡肿，形如鸡卵，灼热疼痛，逐渐红肿化脓。伴恶寒发热，头痛，项强，咽痛，口干，溲赤便秘。苔薄腻，脉滑数等。

治法：散风清热，化痰消肿。

方药：牛蒡解肌汤或银翘散加减。

88、油风患者。症见：产后头发呈斑块状脱落，并呈渐进性加重，范围由小而大，毛发稀疏枯槁，触摸易脱；伴唇白，心悸，气短懒言，倦怠乏力；舌质淡，舌苔薄白，脉细弱。

治疗宜选用

A、人参养荣汤

B、八珍汤

C、大补元煎

D、四君子汤

E、参苓白术散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 油风之气血两虚证

证候：多在病后或产后头发呈斑块状脱落，并呈渐进性加重，范围由小而大，毛发稀疏枯槁，

触摸易脱; 伴唇白, 心悸, 气短懒言, 倦怠乏力; 舌质淡, 舌苔薄白, 脉细弱。

治法: 益气补血。

方药: 八珍汤加减。

89、患者王某, 38 岁。患疔疮日久, 疮面苍白, 肉芽色淡, 周围皮色黑暗、板硬; 肢体沉重, 倦怠乏力; 舌淡紫或有瘀斑, 苔白, 脉细涩无力。辨证为

- A、气虚血瘀证
- B、湿热下注证
- C、寒湿阻络证
- D、气滞血瘀证
- E、外伤瘀滞证

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 疔疮之气虚血瘀证

证候: 病程日久, 疮面苍白, 肉芽色淡, 周围皮色黑暗、板硬; 肢体沉重, 倦怠乏力; 舌淡紫或有瘀斑, 苔白, 脉细涩无力。

治法: 益气活血, 祛瘀生新。

代表方: 补阳还五汤和四妙汤加减。

90、患者, 女性, 29 岁。左肩部可及 4cm×2.5cm×3cm 的肿物, 质地软, 呈分叶状, 推之可移, 无明显压痛, 局部皮色正常, 病史已有 4 年。应首先考虑的是

- A、血管瘤
- B、骨瘤
- C、肉瘤
- D、气瘤
- E、脂瘤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 肉瘤多见于成年女性, 可发于身体各部, 好发于肩、背、腹、臀及前臂皮下。

大小不一, 边界清楚, 皮色不变, 生长缓慢, 触之柔软, 呈扁平团块状或分叶状, 推之可移动, 基底较广阔, 一般无疼痛。

91、妊娠 6 月, 腹部增大异常, 胸膈满闷, 呼吸短促, 神疲体倦, 四肢不温, 小便短少, 舌淡胖, 苔白, 脉沉滑无力。其治法是

- A、逐水消肿, 养血安胎
- B、疏肝健脾, 逐水消肿
- C、理气行滞, 除湿消肿



- D、温肾健脾，泻肺利水
- E、健脾利水，养血安胎

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 本病诊断为子满，此证为本虚标实证，治宜标本兼顾，本着治病与安胎并举的治则，健脾消水而不伤胎。

主要证候：妊娠中期后，腹部增大异常，胸膈满闷，呼吸短促，神疲体倦，四肢不温，小便短少，甚则喘不得卧；舌淡胖，苔白，脉沉滑无力。

治法：健脾利水，养血安胎。

方药：鲤鱼汤加黄芪、桑白皮或当归芍药散。

92、患者人工流产后 3 天，高热腹痛，下腹部疼痛拒按，阴道流血，气味臭秽，量较多，脓血混杂，大便燥结，小便黄；舌红，苔黄厚，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A、清瘟败毒饮
- B、黄连解毒汤
- C、仙方活命饮
- D、少腹逐瘀汤
- E、五味消毒饮合大黄牡丹汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 急性盆腔炎之热毒炽盛证

主要证候：高热腹痛，恶寒或寒战，下腹部疼痛拒按，咽干口苦，大便秘结，小便短赤，带下量多，色黄，或赤白兼杂，质黏稠，如脓血，味臭秽，月经量多或淋漓不净；舌红，苔黄厚，脉滑数。

治法：清热解毒，利湿排脓。

方药：五味消毒饮合大黄牡丹汤。

93、患者张某，连续两个周期月经提前 9 天，量多。经色深红，质稠，经行不畅，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。诊断为

- A、经行乳房胀痛
- B、经行情志异常
- C、月经先期
- D、月经过多
- E、崩漏

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 月经先期又称为“经期超前”、“经行先期”、“经早”、“经水不及期”等。其主症



是月经周期提前 7 天以上, 甚至 10 余日一行, 连续两个周期以上者称为“月经先期”。

94、患者新产后, 低热不退, 腹痛绵绵, 喜按, 恶露量少, 色淡质稀, 自汗, 头晕心悸; 舌质淡, 苔薄白, 脉细数。其治法是

- A、清热解毒, 凉血化瘀
- B、解毒清营, 凉血养阴
- C、活血化瘀, 和营退热
- D、补血益气, 和营退热
- E、养血祛风, 疏解表邪

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 产后发热之血虚证

主要证候: 产后低热不退, 腹痛绵绵, 喜按, 恶露量或多或少, 色淡质稀, 自汗, 头晕心悸; 舌质淡, 苔薄白, 脉细数。

治法: 补血益气, 和营退热。

方药: 补中益气汤加地骨皮。



95、陈某, 女, 婚后 5 年未怀孕, 月经多推后几天, 经来小腹胀痛, 经色紫黯, 有血块, 块下痛减, 有时经行不畅; 伴见肛门坠痛, 性交痛; 舌质紫黯, 脉弦细涩。治疗选用

- A、少腹逐瘀汤
- B、苍附导痰丸
- C、百灵调肝汤
- D、养精种玉汤
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 不孕症之瘀滞胞宫证

主要证候: 婚久不孕, 月经多推后或周期正常, 经来腹痛, 甚或呈进行性加剧, 经量多少不一, 经色紫黯, 有血块, 块下痛减; 有时经行不畅, 淋漓难净, 或经间出血; 或肛门坠胀不适, 性交痛; 舌质紫暗或舌边有瘀点, 苔薄白, 脉弦或弦细涩。

治法: 逐瘀荡胞, 调经助孕。

方药: 少腹逐瘀汤或隔下逐瘀汤。



96、患者, 女性, 26 岁。妊娠 5 个半月, 面目四肢水肿, 皮薄光亮, 按之凹陷不起, 面色黄白无华, 神疲气短懒言, 口淡而腻, 脘腹胀满, 食欲不振, 大便溏薄, 舌胖嫩苔白腻, 脉缓滑。治疗应首选

- A、猪苓汤

- B、健脾利水汤
- C、茯苓导水汤
- D、真武汤
- E、天仙藤散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 子肿之脾虚证。

主要证候：妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍及全身，皮薄光亮，按之凹陷不起，面色黄白无华，神疲气短懒言，口淡而腻，脘腹胀满，食欲不振，小便短小，大便溏薄；舌淡体胖，边有齿痕，舌苔白润或腻，脉缓滑。

治法：健脾利水。

方药：白术散加砂仁或健脾利水汤。

97、患者，女性，32岁。2年前自然流产一次，现妊娠45天，常有腰酸腹痛下坠，阴道不时出血，色黯红，舌有瘀斑，脉沉弦。治法宜选用

- A、补肾健脾，益气安胎
- B、清热凉血，养血安胎
- C、活血化瘀，补肾安胎
- D、补气养血，固肾安胎
- E、疏肝理气，养血安胎

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 胎动不安之血瘀证

主要证候：宿有癥积，孕后常有腰酸腹痛下坠，阴道不时出血，色黯红，或妊娠期跌仆闪挫，继之腹痛或少量阴道出血；舌黯红，或有瘀斑，脉弦滑或沉弦。

治法：活血化瘀，补肾安胎。

方药：桂枝茯苓丸合寿胎丸。

98、患者下腹部肿块，疼痛月余，伴低热，经行量多，带下量多，色黄如脓；身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤。妇检盆腔右侧触及鸭卵大包块，形不整，触压痛阳性；舌红苔黄，有瘀斑，脉弦滑数。其治法是

- A、清热利湿，缓急止痛
- B、清热解毒，利湿止带
- C、清热利湿，化瘀消癥
- D、清热利湿，消癥止血
- E、清热利湿，止血调经

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 根据患者表现诊断为癥瘕之湿热瘀阻证

主要证候: 下腹部肿块, 热痛起伏, 触之痛剧, 痛连腰骶, 经行量多, 经期延长, 带下量多, 色黄如脓, 或赤白兼杂; 兼见身热口渴, 心烦不宁, 大便秘结, 小便黄赤; 舌黯红, 有瘀斑, 苔黄, 脉弦滑数。

治法: 清热利湿, 化瘀消癥。

方药: 大黄牡丹汤。



99、患者月经先后无定期, 经量或多或少, 色黯红或经行不畅; 胸胁、乳房、少腹胀痛, 脘闷不舒, 时叹息, 暖气食少; 苔薄白, 脉弦。其证候是

- A、肝郁证
- B、肾虚证
- C、脾虚证
- D、肝郁肾虚证
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 月经先后无定期之肝郁证

主要证候: 经来先后无定, 经量或多或少, 色黯红或紫红, 或有血块, 或经行不畅; 胸胁、乳房、少腹胀痛, 脘闷不舒, 时叹息, 暖气食少; 苔薄白或薄黄, 脉弦。

治法: 疏肝理气调经。

方药: 逍遥散。

100、患者, 女, 45岁。月经不规律9个月, 现阴道出血40天, 量时多时少, 近3天量极多、色淡、质稀, 面色(白光)白, 神疲气短, 小腹空坠, 四肢不温, 纳呆便溏; 舌质淡胖, 边有齿印, 苔白, 脉沉弱。治疗应首选

- A、清热固经汤
- B、保阴煎
- C、举元煎
- D、补中益气汤
- E、固本止崩汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 崩漏之脾虚证

主要证候: 经血非时暴下不止, 或淋漓日久不尽, 血色淡, 质清稀; 面色(白光)白, 神疲气短, 或面浮肢肿, 小腹空坠, 四肢不温, 纳呆便溏; 舌质淡胖, 边有齿印, 苔白, 脉沉弱。

治法: 补气摄血, 固冲止崩。



方药: 固本止崩汤或固冲汤。

101、患儿, 3 岁。面色苍白, 神疲乏力, 发黄稀疏, 消瘦 3 个月, 诊断为营养性缺铁性贫血。选用铁剂治疗时, 正确的停药时间为

- A、血红蛋白恢复至正常后 4 个月左右
- B、血红蛋白恢复至正常后 6 个月左右
- C、血红蛋白开始升高时
- D、血红蛋白恢复正常时
- E、血红蛋白恢复至正常后 2 个月左右

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 小儿贫血的西医治疗: 使用铁剂治疗。一般用硫酸亚铁口服, 每次 5~10mg/kg, 1 日 2~3 次, 同时口服维生素 C 有助吸收, 服用至血红蛋白达正常水平后 2 个月左右再停药。

102、患儿, 出生 6 周。症见面目皮肤发黄, 色泽晦暗, 持久不退, 精神萎靡, 四肢欠温, 纳呆, 大便溏薄色灰白, 小便短少, 舌质淡, 苔白腻。治疗首选的方剂是

- A、易黄汤
- B、茵陈蒿汤
- C、茵陈理中汤
- D、参苓白术散
- E、血府逐瘀汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 黄疸之寒湿阻滞证

症状: 面目皮肤发黄, 色泽晦暗, 持久不退, 精神萎靡, 四肢欠温, 纳呆, 大便溏薄色灰白, 小便短少, 舌质淡, 苔白腻。

治法: 温中化湿退黄。

主方: 茵陈理中汤加减。

103、患儿, 2 岁。过食油腻, 症见: 不思饮食, 噤腐酸馊, 脘腹胀满疼痛, 大便酸臭, 烦躁啼哭, 夜眠不安, 手足心热, 舌质红, 苔黄厚腻, 脉象弦滑, 指纹紫滞。最有可能的诊断是

- A、干疳
- B、泄泻
- C、厌食



- D、积滞
- E、疝气

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 积滞之乳食内积证

症状：不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔白厚或黄厚腻，脉象弦滑，指纹紫滞。

治法：消乳化食，和中导滞。

主方：乳积者，选消乳丸加减。食积者，选保和丸加减。

104、患儿，7岁。心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，脘闷呕恶，面色晦暗，唇甲青紫，舌体胖，舌质紫暗，舌苔腻，脉滑或结代。诊断为病毒性心肌炎，治疗应首选方剂是

- A、葛根黄芩黄连汤
- B、桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- C、瓜蒌薤白半夏汤合失笑散
- D、血府逐瘀汤
- E、生脉散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 病毒性心肌炎之痰瘀阻络证

证候：心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，脘闷呕恶，面色晦暗，唇甲青紫，舌体胖，舌质紫暗，或舌边尖见有瘀点，舌苔腻，脉滑或结代。

治法：豁痰化瘀，宁心通络。

代表方剂：瓜蒌薤白半夏汤合失笑散。

105、患儿，7岁。突然出现头面眼睑浮肿，并迅速波及全身，呈紧张性水肿，尿少，色如浓茶，伴发热，恶风，口渴，咽痛，苔薄白，脉浮。治法宜选用

- A、疏风解表，利水消肿
- B、活血化瘀，利水消肿
- C、益气养阴，利水消肿
- D、清热解毒，利水消肿
- E、以上均非

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 小儿水肿之风水相搏证

证候：水肿大都先从眼睑开始，继而四肢，甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少或有尿血，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。



治法: 疏风解表, 利水消肿。

代表方剂: 麻黄连翘赤小豆汤。

106、患儿, 7 个月。近期夜间啼哭, 啼哭时哭声低弱, 时哭时止, 睡喜蜷曲, 腹喜摩按, 四肢欠温, 吮乳无力, 胃纳欠佳, 大便溏薄, 小便色清, 面色青白, 唇色淡红, 舌苔薄白, 指纹多淡红。其治法为

- A、温脾散寒, 行气止痛
- B、温经散寒, 补气养心
- C、温补脾肾, 益阴养血
- D、健脾化湿, 行气止痛
- E、滋脾养胃, 佐以助运

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 夜啼之脾寒气滞证

证候: 啼哭时哭声低弱, 时哭时止, 睡喜蜷曲, 腹喜摩按, 四肢欠温, 吮乳无力, 胃纳欠佳, 大便溏薄, 小便色清, 面色青白, 唇色淡红, 舌苔薄白, 指纹多淡红。

治法: 温脾散寒, 行气止痛。

方药: 乌药散合匀气散。

107、患儿, 4 岁。平素喜食肥甘厚味, 现症见汗出过多, 以额、心胸为甚, 汗出肤热, 汗渍色黄, 口臭, 口渴不欲饮, 小便色黄, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。治疗应首选

- A、黄芪桂枝五物汤
- B、当归六黄汤
- C、玉屏风散
- D、牡蛎散
- E、泻黄散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 汗证之湿热迫蒸证

证候: 汗出过多, 以额、心胸为甚, 汗出肤热, 汗渍色黄, 口臭, 口渴不欲饮, 小便色黄, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清热泻脾。

代表方剂: 泻黄散。

108、患儿, 5 岁。发热咳嗽 3 天。壮热不退, 咳嗽剧烈, 痰黄稠难咯或痰中带血, 气急喘憋, 呼吸困难, 鼻翼扇动, 神昏谵语, 舌红少津, 苔黄腻, 脉洪数。其主治方剂是

- A、黄连解毒汤合麻杏石甘汤



- B、沙参麦冬汤
- C、人参五味子汤
- D、参附龙牡救逆汤
- E、华盖散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 肺炎喘嗽之毒热闭肺证

证候：壮热不退，咳嗽剧烈，痰黄稠难咯或痰中带血，气急喘憋，呼吸困难，鼻翼扇动，胸高肋满，张口抬肩，鼻孔干燥，面色红赤，口唇紫绀，涕泪俱无，烦躁不宁或嗜睡，甚至神昏谵语，口渴引饮，便秘，小便黄少，舌红少津，苔黄膩或黄燥，脉洪数，指纹紫滞。

治法：清热解毒，泻肺开闭。

代表方剂：黄连解毒汤合麻杏石甘汤。

109、患儿，生后 4 天。症见全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，臀、小腿、臂、面颊硬肿，色暗红、青紫，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，气息微弱，指纹紫滞。应首选的方剂是

- A、参附汤
- B、血府逐瘀汤
- C、附子理中汤
- D、当归四逆汤
- E、人参五味汤

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 小儿硬肿症之寒凝血涩证

证候：全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿多局限于臀、小腿、臂、面颊等部位，色暗红、青紫，或红肿如冻伤，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，或伴呼吸不匀，气息微弱，指纹紫滞。

治法：温经散寒，活血通络。

代表方剂：当归四逆汤。

110、患儿，3 岁。发热重，恶风，有汗或少汗，头痛，鼻塞，流浊涕，喷嚏，咳嗽，痰稠色白或黄，咽红肿痛，口渴，舌质红，苔薄黄，脉浮数。辨证为

- A、风热感冒
- B、风寒感冒
- C、暑邪感冒
- D、时疫感冒
- E、感冒夹滞

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 风热感冒证

证候：发热重，恶风，有汗或少汗，头痛，鼻塞，流浊涕，喷嚏，咳嗽，痰稠色白或黄，咽红肿痛，口渴，舌质红，苔薄黄，脉浮数或指纹浮紫。

治法：辛凉解表，疏风清热。

代表方剂：银翘散。

111、患儿，出生后10天。口腔内出现白屑散在，周围红晕不著，形体瘦弱，颧红，手足心热，口干不渴，舌红，苔少，指纹紫。治疗应首选

- A、导赤散
- B、泻黄散
- C、竹叶石膏汤
- D、知柏地黄丸
- E、清热泻脾散

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 鹅口疮之虚火上浮证

证候：口腔内白屑散在，周围红晕不著，形体瘦弱，颧红，手足心热，口干不渴，舌红，苔少，脉细或指纹紫。

治法：滋阴降火

代表方剂：知柏地黄丸。

112、患儿，3岁。自入秋以来食欲不振，食量减少，食而不化，面色少华，倦怠乏力，大便偏稀，夹有不消化食物。应首先考虑的诊断是

- A、厌食
- B、积滞
- C、疳证
- D、口疮
- E、泄泻

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 厌食是小儿时期的一种常见病证，临床以较长时间厌恶进食、食量减少为特征。

厌食和积滞鉴别：厌食长期食欲不振，厌恶进食，一般无脘腹胀满、大便酸臭等症。

厌食、积滞、疳证鉴别：

(1) 厌食：以长期食欲不振、食量减少、厌恶进食为主证，无明显消瘦，精神尚好，病在

脾胃, 不涉及他脏, 一般预后良好。

(2) 积滞: 以不思乳食、食而不化、脘腹胀满、大便酸臭为特征, 与疳证以形体消瘦为特征有明显区别。但两者也有密切联系, 若积久不消, 影响水谷精微化生, 致形体日渐消瘦, 可转化为疳证。

### 三、B

1、A. 清热凉血, 解毒消斑

B. 清利湿热, 解毒通络

C. 养血滋阴, 润肤息风

D. 清热泻火, 凉血解毒

E. 活血化瘀, 解毒通络

<113>、治疗白疮湿毒蕴阻证, 采用的治疗方法为

A B C D E

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 白疮湿毒蕴阻证

证候: 皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位, 红斑糜烂, 痂屑黏厚, 瘙痒剧烈; 或掌跖红斑、脓疱、脱皮; 或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重; 舌质红, 苔黄腻, 脉滑。

治法: 清利湿热, 解毒通络。

方药: 萆薢渗湿汤加减。

<114>、治疗白疮火毒炽盛证, 采用的治疗方法为

A B C D E

#### 【隐藏答案】

【正确答案】 D

【答案解析】 白疮火毒炽盛证

证候: 全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛, 大量脱皮, 或有密集小脓疱; 伴壮热、口渴、头痛、畏寒, 大便干燥, 小便黄赤; 舌红绛, 苔黄腻, 脉弦滑数。

治法: 清热泻火, 凉血解毒。

方药: 清瘟败毒饮加减。

2、A. 肛裂

B. 肛痈

C. 肛痿

D. 肛窦炎

E. 息肉痔

<115>、肛管的皮肤全层纵行裂开并形成感染性溃疡者称为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 肛管的皮肤全层纵行裂开并形成感染性溃疡者称肛裂。

<116>、直肠或肛管与周围皮肤相通所形成的瘻管，称为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 肛漏是指直肠或肛管与周围皮肤相通所形成的瘻管，也称肛痿。

3、A. 活血化瘀，通络止痛

B. 清热解毒，养阴活血

C. 益气养阴，清热利湿

D. 清热利湿，解毒活血

E. 温阳散寒，活血通络

<117>、脱疽之寒湿阻络证的治法为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 脱疽之寒湿阻络证

证候：患趾（指）喜暖怕冷，麻木，酸胀疼痛，多走则疼痛加剧，稍歇痛减，皮肤苍白，触之发凉，趺阳脉搏动减弱；舌淡，苔白腻，脉沉细。

治法：温阳散寒，活血通络。

方药：阳和汤加减。

<118>、脱疽之湿热毒盛证的治法为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 脱疽之湿热毒盛证

证候：患肢剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，肉色不鲜；身热口干，便秘溲赤；舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，解毒活血。

方药：四妙勇安汤加减。

4、A. 血瘀证

B. 血虚证

C. 热入营血证

D. 感染邪毒证

E. 外感证

<119>、患者产后寒热时作，恶露不下，色紫暗有块，小腹疼痛拒按；舌质紫暗或有瘀点，脉弦涩。其证候是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 产后发热之血瘀证

主要证候：产后寒热时作，恶露不下或下亦甚少，色紫暗有块，小腹疼痛拒按；舌质紫暗或有瘀点，脉弦涩。

治法：活血化瘀，和营退热。

方药：生化汤加味或桃红消瘀汤。

<120>、患者产后低热不退，腹痛绵绵，喜按，恶露量多，色淡，头晕心悸，舌淡，苔薄，脉细数。其证候是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 产后发热之血虚证

主要证候：产后低热不退，腹痛绵绵，喜按，恶露量或多或少，色淡质稀，自汗，头晕心悸；舌质淡，苔薄白，脉细数。

治法：补血益气，和营退热。

方药：补中益气汤加地骨皮。

5、A. 小产肾阳亏虚证

B. 滑胎血热证

C. 小产肾气不足证

D. 滑胎气血虚弱证

E. 滑胎血瘀证

<121>、屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。辨证为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 滑胎气血虚弱证

主要证候：屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：益气养血，固冲安胎。

方药：泰山磐石散。

<122>、屡孕屡堕，孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。辨证为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 滑胎血热证

主要证候：屡孕屡堕，孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。

治法：清热养血，滋肾安胎。

方药：保阴煎和二至丸加白术。

6、A. 疏肝解郁，养血安胎

B. 养血安胎，活血止痛

C. 养血活血，补肾安胎

D. 暖宫止痛，养血安胎

E. 养血活血，健脾和胃

<123>、妊娠腹痛之血瘀证的治法为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 妊娠腹痛之血瘀证

主要证候：妊娠后小腹常感隐痛不适，或刺痛，痛处不移；或素有癥瘕；舌暗有瘀点，脉弦滑。

治法：养血活血，补肾安胎。

方药：桂枝茯苓丸合寿胎丸。

<124>、妊娠腹痛之虚寒证的治法为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 妊娠腹痛之虚寒证

主要证候：妊娠后小腹冷痛，绵绵不休，喜温喜按；面色（白光）白，形寒肢冷，纳少便溏；舌淡，苔白滑，脉沉细滑。

治法：暖宫止痛，养血安胎。

方药：胶艾汤加巴戟天、杜仲、补骨脂。

7、A. 经行感冒

B. 经行口糜

C. 癥瘕

D. 经行瘾疹

E. 胎动不安

<125>、七情内伤可导致妇科疾病，其中怒可致

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 七情内伤导致妇科病，以怒、思、恐为害尤甚。怒，抑郁忿怒，使气郁气逆，可致月经后期、闭经、痛经、不孕、癥瘕；思，忧思不解，每使气结，发为闭经、月经不调、痛经；恐，惊恐伤肾，每使气下，可致月经过多、闭经、崩漏、胎动不安、不孕。

<126>、七情内伤导致妇科疾病，其中恐可致

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 七情内伤导致妇科病，以怒、思、恐为害尤甚。怒，抑郁忿怒，使气郁气逆，可致月经后期、闭经、痛经、不孕、癥瘕；思，忧思不解，每使气结，发为闭经、月经不调、痛经；恐，惊恐伤肾，每使气下，可致月经过多、闭经、崩漏、胎动不安、不孕。

8、A. 补气摄血固冲

B. 养血益气调经

C. 补肾益气，调理冲任

D. 补气摄血，固冲调经

E. 补肾益精，养血调经

<127>、月经过少肾虚证的治法是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 月经过少之肾虚证

主要证候：经量少或渐少，色黯淡，质稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，或小腹冷，或夜尿多；舌淡，脉沉弱或沉迟。

治法：补肾益精，养血调经。

方药：归肾丸或当归地黄饮。

<128>、月经过少血虚证的治法是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 月经过少之血虚证

主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，

面色萎黄; 舌淡红, 脉细。

治法: 养血益气调经。

方药: 滋血汤或小营煎。

9、A. 3 岁

B. 4 岁

C. 5 岁

D. 6 岁

E. 7 岁

<129>、小儿视觉发育正常, 可区别各种颜色的年龄是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 视觉: 新生儿视觉不敏锐, 在 15~20cm 距离处最清晰, 可短暂地注视和反射地跟随近距离内缓慢移动的物体; 2 个月起可协调地注视物体, 初步有头眼协调; 3 个月时头眼协调好, 可追寻活动的物体或人; 4~5 个月开始能认识母亲, 见到奶瓶表示喜悦; 6 个月时能转动身体协调视觉; 9 个月时出现视深度感觉, 能看到小物体; 1 岁半时能区别各种形状; 2 岁时能区别垂直线与横线, 目光跟踪落地的物体; 5 岁时可区别各种颜色; 6 岁时视力才达到 1.0。

<130>、小儿正常听觉发育完善的年龄是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 听觉: 新生儿出生 3~7 天听觉已相当良好; 3 个月时可转头向声源; 4 个月时听到悦耳声音会有微笑; 5 个月时对母亲语声有反应; 8 个月能区别语声的意义; 9 个月时能寻找来自不同方向的声源; 1 岁时听懂自己的名字; 2 岁时听懂简单的吩咐; 4 岁时听觉发育完善。

10、A. 清热利湿, 泻肝止遗

B. 培元益气, 安神固腠

C. 清热利湿, 通利膀胱

D. 温补肾阳, 固涩膀胱

E. 温补脾肾, 升提固摄

<131>、小儿遗尿肝经湿热证的治法是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 遗尿之肝经湿热证

证候: 寐中遗尿, 小便量少色黄, 性情急躁, 夜梦纷纭或寐中齟齿, 性情急躁, 目睛红赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清热利湿, 泻肝止遗。

代表方剂: 龙胆泻肝汤。

<132>、小儿遗尿肾气不足证的治法是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 遗尿之肾气不足证

证候: 寐中多遗, 可达数次, 小便清长, 面白少华, 神疲乏力, 智力较同龄儿稍差, 肢冷畏寒, 舌质淡, 苔白滑, 脉沉无力。

治法: 温补肾阳, 固涩膀胱。

代表方剂: 菟丝子散。

11、A. 下腹部疼痛, 拒按

B. 腹痛绵绵喜按, 得温则舒

C. 发作性脐周腹痛

D. 剑突下、右上腹阵发性剧烈绞痛

E. 满腹疼痛, 拒按

<133>、蛔虫病肠虫证的腹痛特点是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 肠虫证, 虫踞肠腑, 多为实证, 以发作性脐周腹痛为主要症状。

<134>、蛔虫病蛔厥证的腹痛特征是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 蛔厥证蛔虫入膈, 窜入胆腑, 腹痛在剑突下、右上腹, 呈阵发性剧烈绞痛, 痛时肢冷汗出, 多有呕吐。

12、A. 清热解毒, 利湿化痰

B. 宣肺散邪, 清热化痰

C. 养阴润肺, 健脾益气

D. 泻肺清热, 涤痰镇咳

E. 疏风祛邪, 宣肺止咳

<135>、顿咳初咳期的治法是



A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 顿咳之初咳期

证候：一般不发热或伴低热，鼻塞流涕，喷嚏咳嗽，2~3 天后咳嗽日渐加重，并渐显日轻夜重，咳痰稀白，量不多或痰稠不易咯出，咳声不畅，苔薄白或薄黄，脉浮紧或浮数，指纹浮红或浮紫在风关。历时约 1 周左右。

治法：疏风祛邪，宣肺止咳。

方剂：三拗汤。

<136>、顿咳恢复期的治法是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 顿咳之恢复期

证候：痉咳缓解，咳嗽逐渐减轻，仍有干咳无痰，或痰少而稠，声音嘶哑，伴低热，午后颧红，烦躁，夜寐不宁，盗汗，口干，舌红，苔少或无苔，脉细数。或表现为咳声无力，痰白清稀，神倦乏力，气短懒言，纳差食少，自汗或盗汗，大便不实，舌淡，苔薄白，脉细弱。历时 2~4 周。

治法：养阴润肺，健脾益气。

代表方剂：肺阴亏虚者用沙参麦冬汤，肺脾气虚证用人参五味子汤。

13、A. 丘疹、疱疹、结痂同时存在

B. 暗红色斑丘疹

C. 玫瑰色细沙样斑丘疹

D. 疹色紫暗或紫黑，形成斑块

E. 全身布发猩红色皮疹，疹后脱屑脱皮

<137>、属于风疹的皮疹特点是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 风疹即风疹，是感受风疹时邪，以轻度发热，咳嗽，全身皮肤出现细沙样玫瑰色斑丘疹，耳后及枕部淋巴结（淋巴结）肿大为特征的一种急性出疹性传染病。

<138>、属于猩红热的皮疹特点是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

**【答案解析】** 丹痧是因感受痧毒疫疔之邪所引起的急性时行疾病。临床以发热，咽喉肿痛

或伴腐烂, 全身布发猩红色皮疹, 疹后脱屑脱皮为特征。

- 14、A. 热、烦、渴、饮, 疹稠色暗, 神昏抽搐
- B. 热、咳、喘、痰, 疹稠色暗
- C. 热、咳、涕、泪, 麻疹黏膜斑
- D. 热、烦、汗出, 皮疹透发
- E. 疹没脱屑, 低热不退

<139>、麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 麻疹之邪犯肺卫证（初热期）

证候：发热咳嗽，微恶风寒，喷嚏流涕，咽喉肿痛，两目红赤，泪水汪汪，畏光羞明，神烦哭闹，纳减口干，小便短少，大便不调。发热第 2~3 天，口腔两颊黏膜红赤，贴近白齿处可见麻疹黏膜斑，周围红晕。舌质偏红，苔薄白或薄黄，脉象浮数。

治法：辛凉透表，清宣肺卫。

代表方剂：宣毒发表汤。

<140>、麻疹邪入肺胃证的主要证候是

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 麻疹之邪入肺胃证（出疹期）

证候：壮热持续，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，咳嗽阵作，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之退色，大便干结，小便短少，舌质红赤，苔黄腻，脉数有力。

治法：清凉解毒，透疹达邪。

代表方剂：清解透表汤。

15、A. 复方磺胺甲噁唑

- B. 克拉霉素
- C. 长春新碱
- D. 乙胺丁醇
- E. 制霉菌素

<141>、AIDS 并发卡波西肉瘤时用药为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** C

<142>、AIDS 并发肺孢子菌肺炎时用药为

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** A

**【答案解析】** AIDS 各种机会性感染及肿瘤的治疗:

卡氏肺孢子菌肺炎: 用复方磺胺甲噁唑、喷他咪等治疗。

卡波西肉瘤: 抗病毒治疗同时联合  $\alpha$  干扰素治疗, 也可用博来霉素、长春新碱和阿霉素联合化疗等。

16、A. 氯霉素

B. 复方磺氨甲基异唑

C. 青霉素

D. 头孢曲松

E. 环丙沙星

<143>、伤寒病原治疗首选

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** E

<144>、小儿伤寒治疗首选

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 伤寒病原治疗: 1. 氟喹诺酮类是首选。抗菌谱广, 杀菌作用强, 能抑制细菌 DNA 旋转酶, 阻碍 DNA 复制, 口服吸收完全, 体内分布广, 胆囊浓度高, 副作用少, 不易产生耐药。目前常用的药物有氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星等。疗程 14 日。孕妇、儿童、哺乳期妇女慎用。2. 头孢菌素类 第三代头孢菌素在体外对伤寒杆菌有强大抗菌活性, 体内分布广, 胆汁浓度高, 不良反应少, 尤其适用于孕妇、儿童、哺乳期妇女等患者。常用的有头孢曲松、头孢噻肟、头孢哌酮等。

17、A. 母婴

B. 空气

C. 蚊虫

D. 土壤

E. 水、食物

<145>、可传播传染性非典型肺炎的是

A B C D E

**【隐藏答案】**

【正确答案】 B

【答案解析】 传染性非典型肺炎的传播途径为空气飞沫传播和接触传播。

<146>、可传播流行性脑脊髓膜炎的是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 B

【答案解析】 流行性脑脊髓膜炎的传播途径为呼吸道飞沫直接传播。

18、A. 鲍氏志贺菌

B. 舒氏痢疾杆菌

C. 宋内志贺菌

D. 痢疾志贺菌

E. 福氏志贺菌

<147>、抵抗力最强的痢疾杆菌是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

<148>、感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 E

【答案解析】 痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

19、A. 杯状病毒

B. 黄病毒

C. 拉沙病毒

D. 反转录病毒

E. 汉坦病毒

<149>、狂犬病毒属

A B C D E

【隐藏答案】

【正确答案】 C

【答案解析】 狂犬病毒属弹状病毒科拉沙病毒属。

<150>、流行性乙型脑炎病毒属

A B C D E

**【隐藏答案】**

**【正确答案】** B

**【答案解析】** 乙型脑炎病毒属虫媒病毒乙组的黄病毒科。

 www.med66.com

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com